



BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III


RACCOLTA
VILLAROSA


B

801

NAPOLI

11







B. de Grado Fec.

605670

Racc. Vill. B. 801

I S T O R I A
D E L L'
ACCADÉMIA
R E A L E
DELLE SCIENZE.

(2)

Dell' Anno M. DCC.

Con le Memorie di Matematica , e di
Fisica dello stesso Anno,

Ritratte da Registri di detta Accademia.

**Trasportate dalla Lingua Franzese
nell' Italiana.**



IN NAPOLI M. DCC. XXXIX.

A spese di Berardino Gessari.

Nella Stamperia di Felice-Carlo Mosca,
CON LICENZA DE' SUPERIORI.



All'Illustriss. e Reverendiss.

SIGNOR ABBATE

IL SIGNOR

D. GIUSEPPE

BRANCACCIO

*Protonotario Apostolico, e Priore della
SS. Trinità della Dola in Sicilia.*



IN un Secolo così rischiarato com'è 'l nostro riesce molto duro e malagevole di far ricredere il Mondo, che tal volta si dica il vero tra le mille, che adulando o l'alterato vero o lo sfrontato falso si scrive nelle Dedicatorie de' Libri, quali a Persone per alcun verso riguardevoli

si fanno ; come quelle che vengono riputate per una industriosa incetta de' Libraj intenti più al loro profitto e bene , che al vero & al merito . Ciò ha fatto , che in tutte le Opere da me finora ristampate abbia io cercato a bello studio di sempre metter loro nella fronte Uomini per sapere e per virtù sì conosciuti , che suspizione di me tale non cadesse negl' animi altrui . Quindi è che in uscendo alla luce le Storie e Memorie dell' Accademia Reale di Francia dell' Anno 1700., tenendo l' istesso istituto , le presento a V. S. Illustrissima , che nel verde de' suoi Anni mostra maraviglioso talento, tenera pietà cristiana , e quel buono e raffinato gusto delle scienze , che ha meritato in questa età ancora dalla Real Munificenza il Priorato della Santissima Trinità della Delia ; perche un tal onore aggiunga gloriosi stimoli alle belle doti della sua mente di avanzarsi a misura dell' andar degli Anni nelle più sublimi cognizioni , delle quali adorni gl' Illustri suoi Antenati furono l' onore della S. Porpora , della Miltia , e della Toga , & i primi che in questo Regno appresero la vera Religio.

piena, e tra 'l numero de' Santi nel
nagere di ella furono ascritti. Troppo
gl' Esemplj de' proprj Maggiori infor-
mano gli animi de' Nipoti; e ben mol-
to ha ella inanzi agli occhi de' chiaris-
simi suoi Antecessori, donde s'istruisca
a calcar quelle onoratissime orme, che
menaron essi nel più alto grado della
gloria, così celeste che terrena: Nè
durerà fatica alcuna ad esserne, come
foi, informato appieno, qualor voglia
aprire i libri delle Storie di tutta Europa,
che son pieni de' fatti immortali degli an-
tichissimi e valorosissimi Eroi di sua Fa-
miglia: o quando pur non le piac-
cia, col volger gli occhi a' magnifici &
ornati Mausolei alla di loro memoria
eretti, & a quella insigne Cappella, che
si ammira nella Chiesa di S. Domenico
Maggiore, e su di cui, come discen-
dente della Famiglia, ne gode V. S.
Illustrissima il dritto, rinverrà sempre
vividissimi esemplj da imitare. Ma poi-
ché a Vivi, e que' che sono sotto gli
occhi s'imprimono maggiormente nell'
animo; le sole eccelle doti del glorio-
sissimo Padre Soprantendente delle Ren-
de Reali, Segretario dell' Invittissimo
nostro Re, e gran Tesoriere dell' In-
signe

figue Ordine di San GENNAIO , fa-
rui sufficienti a farle premere con la
non incominciata collanza d'anno l'et-
to sentiere di quelle virtù , che all'Im-
mortalità tutti gl' Illustri suo' Predecessori
han consagrato . Contribuisce a que-
sto fare l'Opera che umilmente io le de-
dico e presento , poiche comprende el-
la tutto il più bello , e più sublime
che ha la naturale scienza ; ond' è che
la supplico a gradirne l'offerta con quel-
la generalità che l'è innata , & a pro-
teggere lei , e me , che , baciandole
umilmente la mano , sono

Di V. S. Illustrissima e Reverendissima

Umiliss., Devotiss., & Obligatiss. Servidor vero
Berardino Gellari

TA V O L A

P. E. R

L'ISTORIA.

FISICA GENERALE.

O sservazioni sopra il Barometro, Termometro, e Pioggie cadute nell'anno 1699. Pag. 1	
Sopra di alcune cose singolari della Francia. 3	
Sopra il Fosforo del Barometro. 6	
Diverse Osservazioni di Fisica Generale. 10	

N O T O M I A.

Sopra di una Idropisia latticinea. 14	
Della struttura della Midolla. 17	
Sopra un' Ernia particolare. 19	
Sopra la formazione della Voce. 21	
Di quel che avveggia all'aere entrato ne' Polmoni. 30	
De' Vasi Onfalomesenterici. 33	
Su l'azione del Ventricolo nel recere. 34	
Sulle parti destinate alla generazione. 36	
Diverse Osservazioni Notomiche. 43	

CHI.

TAVOLA.

C H I M I C A.

<i>Analisi della Ipecacuana.</i>	56
<i>Su la forza degli Alkali Terrei.</i>	58
<i>Paragone delle Analisi della Seta, del Sale Ammoniac, e del Corno di Cervo.</i>	61
<i>Su de' Fuochi sotterranei, Terremoti, Tuoni, &c. spiegati chimicamente.</i>	62
<i>Su le Soluzioni, e Fermentazioni fredde.</i>	64
<i>Sopra l'Acqua della Calcina.</i>	66
<i>De' Solventi, e Soluzioni del Mercurio.</i>	67
<i>Sopra l'Oli delle Pianta.</i>	69
<i>Sopra l'Acido dell'Antimonio.</i>	71
<i>Diverse Osservazioni Chimiche.</i>	72

B O T A N I C A.

<i>Su 'l Perpendicolo de' Tronchi delle Pianta riguardo all'Orizzonte.</i>	75
<i>Su la Fecondità delle Pianta.</i>	80
<i>Su le Pianta Marittime.</i>	82
<i>Diverse Osservazioni Botaniche.</i>	86

G E O M E T R I A.

<i>Su le Forze Centrifughe.</i>	96
<i>Su la Misura de' Triangoli.</i>	121
<i>Su la Quadratura del Circolo.</i>	122

ASTRO.

T A V O L A.

A S T R O N O M I A.

<i>Su l'Eclisse Solare de' 23. Settembre 1699.</i>	126
<i>Su l'Eclisse della Luna de' 5. Marzo.</i>	131
<i>Su le Refrazioni.</i>	134
<i>Su la Lunghezza del Pendolo.</i>	140
<i>Su di una Congiunzione di Venere col Sole.</i>	143
<i>Su le Macchie del Sole.</i>	145
<i>Su la Prolungazione della Meridiana di Parigi.</i>	148
<i>Su 'l Calendario.</i>	152

G E O G R A F I A.

<i>Alcune Latitudini e Longitudini.</i>	156
---	-----

D I O T T I C A.

<i>Sopra di un nuovo Cristallo di Telescopio.</i>	157
---	-----

A C U S T I C A.

<i>Su la Determinazione di un Suono fisso.</i>	161
--	-----

M E C A N I C A.

<i>Su la Fabbrica degli Orologj.</i>	173
<i>Su</i>	

T A V O L A:

<i>Su di un Istrumento Universale per lanciar le Bombe.</i>	172
<i>Sopra i Centri di Conversione, e su' Fregamenti.</i>	180
<i>Sopra i Corpi che nuotano ne' Liquori.</i>	186
<i>Machine, o Invenzioni approvate dall' Accademia nel 1700.</i>	195

<i>Elogio del fu Signor Tauvry.</i>	196
-------------------------------------	-----

I S T O R I A
D E L L'
A C C A D E M I A
R E A L E
D E L L E S C I E N Z E
Dell' Anno M. DCC.

F I S I C A.

FISICA GENERALE.
OSSERVAZIONI.

*Sopra il Barometro, Termometro, e Pioggie cadute.
nell' Anno 1699.*



L Signor *de la Hire*, avendosi preso l'incarico di far continue osservazioni sù le mutazioni del Barometro, e Termometro, e sù la quantità delle acque piovane che cadono, come ancora sù le variazioni dell'ago calamitato, in ogni principio di Anno rende conto all' Accademia delle osservazioni da lui fatte nell'Anno antecedente.

• *Vedi le Mem. pag. 6.
1700.*

A

Devo

Deve molto aggradare a coloro che amano la contemplazione della Natura, l'aver innanzi agli occhi l'Istoria Fisica di ciascun anno. Veggono in questa, quali Mesi siano stati secchi, e quali piovosi: come siasi distribuita la quantità dell'acqua caduta dal Cielo in detti differenti Mesi: qual ragione abbia insieme avuto il peso dell'aere, e la costituzion di questo, cioè il buono, e 'l mal tempo: sino a qual grado gli eccessivi calori sian montati, & i sommi freddi: e se ciascuno nella sua stagione sia stato uguale, o come l'uno abbia sopravanzato l'altro &c.

Sù di queste fondamenta con molta verisimilitudine può conghietturarsi quello che ha reso l'anno fertile, o sterile, sano, o sottoposto a certe malattie. Quello però, che mette tali conghietture in sodo, n'è il paragone di più anni, perciocchè maggior numero di fatti fornisce maggiori ragioni, & assicura di vantaggio le conseguenze.

Un lungo ordine di osservazioni rende, se in un istesso luogo cada sempre un' istessa quantità d'acqua, ovvero, se questa sia ineguale, fin dove giunga tal ineguaglianza: quali parimente siano i limiti del caldo, e del freddo: quali effetti possan produrre i loro maggiori eccessi, se uno siegua ordinariamente l'altro &c.

Spertissimi Fisici an creduto, che le pioggie, e le nevi disciolte possano somministrar tutta l'acqua a' Fiumi, qual questione, la più curiosa della Fisica, non può esser decisa senza l'esatto conoscimento della quantità di essa, che 'n tutti gli Anni venga dal Cielo.

E' si sà, che l'Ago calamitato non si rivolga per ordinario dritto a tramontana, ma talora dechini verso 'l Levante, e talora verso 'l Ponente, ora più,
& ora

& ora meno, qual variazione non sembra affatto irregolare. Qualunque ne siano le norme, non se ne verrà già a capo che in osservandolo continuamente, e farebbe una tale scoperta molto importante per rendere l'uso della bussola più sicuro: Si trarrebbero parimente nuovi lumi giovevoli al sistema della calamita, & al general sistema ancora del nostro girone, o vortice, giacche tutte le sperienze ne menano a credere che la Terra sia una gran calamita.

In fine può dirsi in generale, che, poicche ci si concede solamente e con pena alcuna volta dagli effetti rivenire alle cagioni, il travaglio delle continue osservazioni sia egli necessarissimo, & altrettanto più degno di loda, quanto è men chiaro, e quanto che coloro, i quali l'intraprendono, in certo modo si sacrificano alla gloria di que' che formeranno i Sistemi.

S O P R A

DI ALCUNE COSE SINGOLARI

NELLA FRANCIA.

Continuando nell' Accademia la cura di esaminare tutte le maraviglie dell' Istorie naturali della Francia, si fe parola della Montagna dell' *Aiguille* nel Delfinato, chiamata altrimenti la *Montagna inaccessibile*. La situazione di questa è capo volta, essendo ella piantata, per così dire, sù la di lei sommità, e sopra la sua punta; non avendo il piede di essa altro circuito, che di mille passi, e la sommità

due mila; donde vien detta *inaccessibile*. Allorache Carlo VIII. andò in Italia nel 1492 inviò gente molto ardita, e molto destra insieme, perche montassero sino al più alto di essa: quivi non vi ritrovaron altro che capre selvaggie; e pur questo non è così facile a comprendere, come detti Animali vi sian saliti, senza impiegarvi molta industria: Non vi osservarono alberi, ma solamente un Prato: E nella strada, che fecero, li convenne inarpicarsi per una mezza lega. Sù'l piano di detta Montagna si osserva una elevazione agura, donde se l'è dato il nome di Montagna dell' *Aiguille*, o dell' Ago.

L'altra singolar cosa nel Delfinato si è la Grotta di Nostra Signora *de la Balme* vicino a *Grenoble*: Nella sua imboccatura vi si vede una volta molto alta, donde vassì ad un Lago sotto la Montagna rinchiuso, qual sembra della larghezza di una lega. Ritrovandosi Francesco I. nel Delfinato v' inviò gente, che con un Battello lo camminassero, come fecero, per più di due leghe in dentro; ma un gran rumore, che cominciarono a sentire, li spaventò, nè s' inoltraron di vantaggio: posero questi sù le Tavole fiaccole accese, che in un tratto viddero smorzarfi in certo luogo, che apparentemente era una voragine. Un Piovano di quell'istesso luogo vi andò molti anni appresso, & o che egli avesse preso un altro cammino nella Grotta, o che non così facilmente s'intimorisse, o che avesse l'immaginativa meno ingombra dal portentoso, lasciò egli una relazione di tal viaggio molto differente, e molto più semplice. Vide egli delle cascate d'acque, & incontrò passi ne' quali rimaneva in secco, & altri ove la volta era sì bassa, che non poteva passarvi senza distendersi interamente sù 'l Battello. Quest' ultima circostanza reca veramente

pe-

pena, ma in fine il maraviglioso vò nella seconda relazione considerabilmente scemando.

Questo appunto è qualche rapportano i libri di tal Grotta, e della Montagna inaccessibile; ma 'l Signor *Dieulamant* si è preso il fastidio d'invviare all' Accademia una relazione di essa co' propriocchi veduta, la quale non contiene vestigio alcuno di dette antiche maraviglie. Ella è incavata irregolarmente nella Roccia, la bocca è quattro in cinque passi larga, e 5 in 8 alta, nel piano di questa entrata sorge un picciolo Ruscello, che scorre nel Rodano: Era questo quasi che asciutto nel Mese di Agosto, quando il Signor *Dieulamant* andò a veder la Grotta; il di lui letto però lo fa credere molto picciolo. Questa si divide, e nella parte destra vi si osservano molti congelamenti di acque, che dissillano per traverso della Roccia; nella sinistra gemono altre, che formano una parte di detto Ruscello, piombando prima in una molto grande natural conca, sotto della quale ve ne sono molte altre picciole, che rendono la cascata molto aggradevole. Nel fondo di detta Grotta si ravvisa una spezie di apertura incavata parimente nella Roccia, nel pian della quale si raccoglie l'acqua, che rifonde in gran parte al Ruscello; questo è quello, che dicono Lago, perciocche l'acqua vi ristagna nell'altezza di mezzo piede, o di un piede al più: L'ampiezza di questo credè il Signor *Dieulamant* non distendersi a più di 20 passi di lungo restringendosi di poco in larghezza, osservandone egli con le fiaccole dal principio, in cui era, il fondo: I Paesani l'assicurarono, che più in là non vi era altro: Et ecco in tanto la voragine nella quale le fiaccole furono spente.

Se 'l Signor *Dieulamant* avesse osservata la

Montagna Inaccessibile, forse che si farebbe rad-
drizzata.

L' Isole, che nuotano nel Lago vicino a S.
Omer, essendosi disaminate, non an recata mara-
viglia alcuna; non essendo propriamente altro, che
un accozzamento di radici di erbe mescolate con
un poco di terren grasso.

S O P R A

I L F O S F O R O

D E L B A R O M E T R O .

* **D** Al caso, primo Autore di quasi che tutte le
scoperte, apparè il Signor *Picard* 30
anni sono che 'l mercurio del suo Barometro scol-
so nell' oscuro facea lume: Tutti gli Osservatori
della Natura tosto fecero pruova de' loro Barome-
tri, ma pochissimi si rinvennero dotati di tal Pri-
vileggio, nè seppesi pensarè a chi dovesse risponderli,
perche alcuni rendessero il lume, e gli altri nò; e
si credè di non essere in istato di rendere sù di tal
materia ragione senza arditèzza, con esperienze
cotanto poche: si attendevano perciò dal caso, e dal
tempo i lumi che bisognavano: e sì la faccenda ri-
stette.

In quest' anno però il Signor *Bernoulli* Profes-
sor di Matematica a *Grœningue* sorpreso dalla lettu-
ra di questo straordinario fatto, si mise a disami-
narlo, cominciandone le pruove dal suo Barometro,
qua-

* Vedi le Mem. pag. 214.

quale agitato veramente con forza nell' oscuro rende un debole lampo.

E poicche' suspicò, che 'l lume, o almeno un gran lume, di rado si vedesse ne' Barometri, perche non avessero eglino un perfetto voto nell' alto del doccio, o perche 'l mercurio non fosse bene spogliato di aere: con la sperienza si accertò, che con queste due condizioni ancora i Barometri rendevano debolissimo lume, e 'n conseguenza, che non si erano queste allo 'ntutto, altro che pure condizioni, e che bisognava altronde indagarne la vera cagione.

Avea egli avvertito, che in iscuotendo il Barometro, e facendo con ciò rapidamente andare il mercurio or sopra or sotto al punto dell' equilibrio, che fa bilicarlo con l' aere, appariva solamente il lume nel calar del mercurio, qualche appiccato alla superficie superiore: Quindi e' conghietturò, che qualora per detta calata si formasse nel cannello un voto più grande di quello, che naturalmente vi era, dal mercurio scappasse fuori per riempir detto voto in qualche parte sottilissima materia compresa prima e dispersa tra strettissimi valichi di detto minerale; allo 'ncontro, che nello stesso momento per i pori del vetro, evidentemente più grandi di quelli del mercurio, entrassevi altra materia meno di quella, ma più sottile dell' aere istesso: Stando la materia uscita dal mercurio tutta raccolta al di sopra della sua superior superficie, urta e pigne con empito quella che vien di fuori, e produce così l' istesso effetto che fa il primo elemento di *Descartes* sù 'l secondo, cioè il moto della luce.

Ma perche tal Fenomeno non si avvisa in tutti i Barometri? questa è la gran difficoltà.

Immaginò il Sig. *Bernoulli*, che 'l meto della materia sottile, qual dal mercurio esce con empito quando egli cala, potesse essere distrutto, o debolito, & interrotto da parti non omogenee al mercurio, quali si fossero ammassate sù la di lui superficie superiore, spinte da detto minerale più di esse greve: e che da queste tal sorta di pellicella si formasse sempre sù'l mercurio, qualora e' non fosse estremamente puro; e che tutto netto e puro ch' ei fusse, il solo toccamento dell'aere colla falsuggine, che non mai si scompagna da esso, l'imbrattierebbe; per qual contrarre in un istante, non bisognasse altro, ch' e' si versasse all' aere da alto a basso, come per ordinario si fa, in fabricando i Barometri, donde egli raccoglie dall' aere più salì in un momento, di quel che non avrebbe fatto in più giorni, se fusse stato in riposo; che in fine, supposto ciò, il metodo più sicuro per tenere un Barometro luminoso, si fusse, di farlo col mercurio purissimo, e sopra tutto, che introducendolo nel cannellino non traversasse l' aere, e non vi s' imbrattasse.

Prevenne tutto questo ragionamento le spe-rienze, trattene alcune, che si attenevano alla formazione della pellicella sù la superficie dell'argento vivo; sicche tutto 'l rimanente fu un puro lavoro di mente.

Sentì 'l Signor *Bernoulli* il più vivo piacere, con cui la Filosofia possa mai ricompensar coloro, che la coltivano: Vidde egli la natura seguir il suo sistema, che immaginato avea; e molti Barometri, che fece, con l' avvertenza di non far passare il mercurio per l' aere, rendevano tutti, in agitando, un lume molto vivo.


Rifece ancora l'esperienza in altre guise, sempre sù l' istessi principj, e gli effetti corrisposero
sem.

sempre a quel che egli avea indovinato, o per lo meno si accordaron col primo suo pensiero.

Fù dunque egli certo di tener il segreto da rendere tutti i Barometri Luminosi, purch' e' fossero a suo modo fabricati: E questo sarebbe nella Natura una novella specie di Fosforo, altrettanto più bello, quanto che nommai si consumerebbe.

Diè parte di questa novella con lettere all' Accademia, ch' e' scrisse al Signor *Varignon*. Tutti furon mossi dal genio della scoperta, che riluceva in tutto 'l Sistema: e quantunque favorevole prevenzione piegasse gli animi, non si lasciò di mettere i fatti in severa difamina. Si fe subito riflessione che alcuni Barometri, come que' del *P. Sebastiano*, e de' Signori *Cassini*, e de la *Hire*, fabricati per altro secondo l' ordinarie maniere, e senza le cauzioni del Signor *Bernoulli*, erano luminosi. Se ne fabricaron di poi secondo il metodo del Signor *Bernoulli*, e di questi alcuni non resero lume alcuno, & altri ben poco.

Non bisognò altro all' Accademia, perche sospendesse il suo giudizio. Tosto che un poco si conosca la natura, si conosce ancora il pericolo che s' incontra nel voler prontamente decidere su' gli effetti naturali. Si continuò la difamina su' di tale scoperta, e nell' Anno appresso vi si fecero di più profonde riflessioni. Non potea veramente riceverli idea sì novella senza molta discussione, e senza tal discussione rifiutar sì bella idea.



D I V E R S E
O S S E R V A Z I O N I
DELLA FISICA GENERALE.

I.

E' sembra, che la grandezza apparente dell' obbietto dovrebbe unicamente dipendere da quella dell' immagine, ch' egli delinea nel fondo dell' occhio; talvolta però avviene il contrario, e la Luna, di cui il nostro occhio riceve una più picciola immagine nell' Orizzonte che nel Meridiano, essendo allora più distante da noi, si vede molto più grande nell' Orizzonte.

Questo Fenomeno ha molto imbarazzato i più rinomati Filosofi tra Moderni; e siccome spesso avviene, qualora un istessa cosa differentemente si spieghi, che niuna incontri al vero, il P. Gouye niente è soddisfatto di tutto ciò che finora s'è di tal soggetto si è immaginato e recato in mezzo. Dice *Descartes*, che nel levarsi, o tramontar la Luna, un lungo ordine d' obbietti tra noi e l'estremità dell' Orizzonte sensibile fraposti, la facciano credere più distante di quella, ch' ella è nel Meridiano, dove l'occhio non vede cosa tra essa, e noi; che tal idea di maggior dilungamento ne faccia immaginar la Luna più grande, perciocchè un obbietto, che si veda sotto di un certo angolo, e nell' istesso tempo si creda molto dilungato, naturalmente si giudichi, che debba essere molto grande

per

per apparire sì da lungi sotto di un tal angolo; e che così un puro giudizio della nostr' Anima, quantunque necessario e comune a tutti gli Uomini, ne faccia veder la Luna più grande all'Orizzonte, malgrado l'immagine più picciola dipinta nel fondo del nostro occhio. Ma il P. Gouye in un colpo abbatte questo ingegnoso ritrovato, assicurandoci, che quanto più l'Orizzonte è limitato, più la Luna n' appaja grande. Il Signor Gassendi pretende, che la pupilla, quale costantemente è più aperta nell' oscuro, lo sia di vantaggio nel mattino e nella sera, perche allora sono i vapori più densi sù la Terra; e convenendoli traversare un più lungo ordine di questi in volendo rimirar l'Orizzonte, l'immagine della Luna entri nell' occhio sotto un angolo maggiore, e realmente vi si dipinga più grande. Malgrado però detta dilatazion della pupilla cagionata dall' oscurità, se si riguardi la Luna con un picciolo doccio di carta, si vedrà più picciola nell'Orizzonte.

Per rinvenir dunque alcun' altra ragione di un Fenomeno così bizzarro, il P. Gouye conghietture, che qualora la Luna è nell'Orizzonte, la vicinanza della Terra, & i vapori più densi ne quali rispetto a noi allora ella è ravvolta, facciano l'istesso effetto, che fa un muro piantato dietro di una Colonna, quale apparisce allora più grossa di quella, che, stando sola e cinta di solo aere luminoso, apparirebbe. Inoltre, se una Colonna sia scanalata, ella sembra più grossa della schietta, perciocche in quella lo scanalato forma tanti particolari obbietti, che per la loro moltitudine dal luogo all'immaginare, che l'intero corpo, quale essi compongono, sia di una molto maggiore ampiezza; lo stesso quasi avviene per tutti gli obbietti di.

disperfi, sù la parte che all'Orizzonte spetta, per quali la Luna si vegga, quando l'è vicina; donde avviene, che apparisca ella molto più grande, qualora per dietro agli alberi sorge, gl'interstizj più stretti, e più osservabili de' quali, fan quali l'istesso effetto sù 'l diametro apparente di detto Pianeta, che 'l numero più grande de' scanalati sù 'l fuso di una Colonna.

II.

A 7 di Gennajo un ora prima di giorno dagli Abitanti della *Have* nella Bassa Normandia si vide un turbo di fuoco sì vivo, che oscurava il lume della Luna; sicche gli Abitanti di *S. Germano des Vaux*, e di *Auderville*, due grossi Villaggi situati sù le piaggie del Mare, credarono che fusse giorno, e molto si smarrirono per chiarezza sì prodigiosa. Era la di lui figura simile ad un arbore grande, e scorreva da Ponente Maestrale, a Greco: Era scorsa più di un ora del giorno, quando egli cadde con un rumor sì grande, che le case di questi due Villaggi ne tremarono. Fù creduto da que' di *Cherbourg* 12 leghe distanti, che fufs' egli caduto sopra di *Valognes*: e que' di *Valognes* pensarono, che lo fusse sopra di *Cherbourg*. Ma perche gli Abitanti de la *Have* furono soli a sentire lo scoppio, e 'l tremore, che la di lui caduta cagionò, sono i Testimonj di maggior credito sù di questo punto: Parve ad essi, che detta fiamma si fosse immersa nel Mare intorno alla picciola Isola d' *Origny*, e lo spettacolo fù quasi simile a quello, che dà un grosso Vascello incendiandosi. L'Accademia è tenuta per l'istruzion di questo Fenomeno al Signor di *Sevelley* Gentiluomo della Bassa Normandia,

III.

Comunemente credesi, che l'Ambra gialla, qual ritrovasi nel Mar di Danzica, sia una gomma, che certi alberi posti sù 'l lito di detto Mare producono, e da loro cade. Viene però scritto al Signor *Tournefort* da *Aix*, che nelle fessure delle Roccie di Provenza, le più sterili, e più ignude, vi si rinvenga dett' ambra gialla: locche farebbe credere essere ella minerale, e non già vegetabile; e che l'ambra del Mar di Danzica non venga già dagli alberi, ma che da Torrenti vi sia trasportata.

IV.

Molto ben si sà quanta forza abbia un moto interiore impresso a tutte le parti insensibili di un Corpo, per cambiarne la tessitura, e produrre in esso delle somme alterazioni; ma che un semplice moto esteriore, che sembra terminar nella massa intiera senza scuoterne le parti, produca l'istesso effetto, questo in alcun modo deve sorpendere almeno i Fisici. Hà riferito il Signor *Homborg*, che avendo attaccata una boccia di Vino a quella che dicono Battigliuola di Mulino, di aver osservato, che il solo moto di questa avea cambiato il vino in un ottimo aceto tra lo spazio di tre giorni; e che nell' istessa maniera una libra di Mercurio in tre mesi avea date 4 o 5 oncie di polvere nerliccia.



NOTOMIA.

S O P R A

D'UN IDROPISIA

LATTICINOSA.

NEl 1699 Il Signor *Vernage* Medico della facoltà di *Parigi* costretto a pugnere una Giovane *Zitella* Idropica, fù sorpreso al veder uscir fuori una materia latticinosa, in luogo di acqua, che naturalmente dovea venire. Portò all' *Accademia* detto liquore, che l' esaminò con diligenza. Ritrovò in fatti, che per lo colore, per la consistenza, e qualche poco ancora per lo sapore, qual' era un pò più salito, simigliava molto al latte. Avvisò inoltre, che 'n cadendo rendeva della spuma, e sù 'l fuoco sboglientava, come il latte: Differiva soltanto nella leggerezza, che era molto maggiore di quello, nè si rappigliava dagli acidi, ma col *Sal di Tartaro*.

In proseguimento di tempo si vidde, che la quantità di detto liquore era da ugualmente far sorprendere, che la di lui natura.

Bisognava di far l' operazione per ogni quindici giorni almeno, tirandone per volta 26, o 28 libbre di detto latte, e talvolta 30.

Sù le prime c' inducevamo a credere di esser
cno

esso un Chilo stravasato, e che alcun de'vasi latticinosi dovesse esser rotto, confermandoci in ciò il rapporto del Signor *Vernage*, qual riferiva, che detta Giovane di suo mestiere Giardiniera si fosse violentemente sforzata in molte fiate per sollevare un grosso peso, e che 'l di lei male poco tempo appresso fusse cominciato.

Ma il Chilo non si rappiglia col Sal di Tartaro, come in questo liquore avveniva; & allo 'ncontro essendo la quantità delle seccie, che rendeva, molto proporzionate agli alimenti, per quel che 'l Signor *Vernage* ne accertava, era molto verisimile che detto Chilo passasse nel suo sangue, quasi come per ordinario suole; e benchè ella fosse estremamente dimagrata, poteva perciò ella fare due libbre di Chilo inutile per giorno, oltre di quello che dovea essere impiegato al natural uso? Crederono dunque alcuni, che dovesse questa essere l'acqua ordinaria degl' Idropici tinta da poco Chilo stravasato, e che rendevasi detta Idropisia singolare per l'unione con la rottura di alcun Vaso latticinofo. Sembrava, che questi vasi potessero servire d'una sorgiva molto abbondante, perciocchè qualora il Chilo non vi scorreva, succedeva in di lui luogo la Linfa. Questa allo 'ncontro stravasata stagnante nel basso ventre poteva riempersi di sali urinosi, poicché dette parti ne son pregne, donde la falsuggine addiveniva, e le altre particolari qualità di detto falso latte composto di Chilo, e di siero salito.

Il Signor *Mery* accordando con gli altri intorno alla mescolanza, che dovea esservi in tal liquore, immaginò una tutt'altra maniera, per cui potesse scorrere nel basso ventre. Pretese, che non fosse impossibile, ch'egli si seltrasse per le membrane

ne dello stomaco, e delle intestina, supposto che per tal effetto si accoppiassero disposizioni particolari e straordinarie nella natura del liquore, e nella tessitura delle membrane.

Avea egli molte volte sperimentato, che l'acqua, di cui avea ripieno lo stomaco o le intestina ligate bene per li due capi, trapelasse per i pori delle loro membrane, donde l'aere istesso, tutto che sottile e' sia, non può valicare. Spesso avea osservato che 'l Chilo latticinoso scorreva per la sostanza della matrice, e per le cicatrici delle Donne sgravate di fresco. Riferiva ancora, che talvolta i purgativi remedj, o diareatici, spingano le acque disperse nel ventre degl' Idropici a ripigliar il corso dell' ordinarij scarichi, cioè a feltrarfi per le membrane delle intestina.

A tal proposito il Signor *Hombert* disse che l'acqua più agevolmente dell' aere trapela per alcune viscere, perciocche distempera essa il glutine, che invischia insieme i piccioli filamenti delle membrane; e che vie più penetrando dette fibre, le renda più molli, e più proprie ad ordinarsi, e dividerli. L'aere niuna di queste cose può fare; & in pruova di ciò, aggiung' egli, che avendo riempita una Vescica d' aere, con l'incarico sopra di una pietra, l'aere rinchiuso non ne uscì mai; avendola però così carica immersa nell' acqua, l'aere ne scappò via, perciocche l'acqua ne aveva aperta la prigione.

La Giovane Idropica dobo un anno di Malattia, e dopo le punture così spesse, come si è detto, se ne morì: Se ne fè l'apertura con molta sollecitudine; Sicche l' Accademia non potè con molta certezza sapere qualche si era ritrovato per tal sezione, non avendo rilevato altro, che si era veduto alcun vaso latticinoso rotto.

DEL-

D E L L A
S T R U T T U R A
D E L L A M I D O L L A .

N Egli Animali non vi è cosa che non abbia sua particolare & organica struttura ; e se a prima veduta questa non ci si scuopra , l' inchiesta per le sezioni , o l' Microscopio , ovvero la ragione istessa , ce l' apriranno : Tre maniere differenti di osservare , quali bisogna aggiungere alla semplice & ordinaria nostra veduta , sorpassandol' esse infinitamente .

La midolla , che sembrava una massa informe e senz' ordine , è composta da una infinità di piccioli sacchi membranosi , che gli uni imboccano negli altri , ripieni di un sottile e delicato olio estratto dal sangue .

Il Signor *Du Verney* dopo di aver disaminata sua struttura con molta minutezza , ne ricerca l' uso . Combatte egli il sentimento degli Antichi , quali crederono che nutrisse ella le ossa . E' ben vero che non si osservino vasi sanguigni distribuirsi per la parte calda dell' osso , per condurre a questa il sangue , nutrizione universale di tutte le membra , perche non si esaminano ordinariamente le ossa di un animal molto giovane, nelle quali i vasi sanguigni son pur troppo visibili , appunto come nelle penne de' giovani Uccelli . Fuor della prima età

^{*} Vedi le *Mém.* pag. 235.

Mem. 1700.

B.

queste

quest' istessi docci si restringono, e rendonsi impertettibili così nelle penne come nelle ossa, ma pur vi sono, quantunque estremamente ristretti; e queste istesse parti, che an suggerito un più abbondevole nutrimento sù 'l principio del vivere, non lasciano sempre di risponderlo fintanto che durano, non potendo le ossa riceverlo per altri canali, che per quelli primi donde avean cominciato ad averlo.

Detto Signore novera molte ossa, che assolutamente son senza midolla, e che pur ben si nutricano. Le Corna de' Cervi, le branche de' Granchi, come ogn' un sà; ne rendono chiari gli esempj.

Poicche dunque la midolla non nutrica le ossa, e sembra che serve ad inumidirle, e rammollarle sino ad un certo segno: Che però la cavità dell' osso non è formata solamente per render questo più leggiero, senza scemargli la durezza, ma per contenere ancora la midolla, quale nol fà essere così frangibile, come sarebbe per la sua sola durezza.

Hà la midolla cotanta agevolezza a spandersi per la sostanza dell' osso, & a penetrarla, che dopo morto l' animale ancora non lascia di trapelar per essa; sicche un osso, da cui perfettamente non sia tolta, a capo di alcun tempo si osserva che da bianco, qual' era, ingiallinisca; perciocche ad ogni minimo calore s' imbeve egli, per così dire, della midolla che racchiudeva.

L' esperienze, che 'l Signor *Verney* ha fatte in ripruova del suo sentimento intorno alla midolla, di cui vi era un forte dubbio, dimostrano quanto egli sia diligente & accorto.

S O P R A .
D I U N E R N I A
P A R T I C O L A R E .

LE stesse Malattie prendono forme sì differenti , che talvolta non più si ravvisano, quando nella Medicina non vi è cosa che tanto importi quanto il sapere esattamente la Istoria del loro divario . Bastantemente e' si sa cosa sia l' Ernia ordinaria : Ella è una porzion dell' intestino passato per l' Anelli che formano l' interstizj de' muscoli del basso ventre , & uscito dalla cavità di questo , entrato nello scroto , e piegato in forma d' arco ; qual cosa sovente non impedisce che le materie , quali dallo stomaco calano per le rivolture dell' intestini sino alla loro estremità , non facciano il lor corso naturale, passando esse ancora per quella porzion d'intestino , che fa l' Ernia . Ma perche l' anello , per cui detta porzione si è introdotta nello scroto , è stretto e doppio ancora , se la difficoltà del valico impedisca alle materie l' entrata libera o l'uscita , allora quelle, che non possono entrarvi , ringorgano verso lo stomaco e si vomitano , e quelle , che sono arrestate nel sacco dell' Ernia, ristagnano e cagionano la cangrena , a cui succede per pochi giorni appresso la morte , se non si ricorra alla volgare operazione de' Cerulici .

Il Signor *Littre* ha scoperto in alcuni Cadave-

B 2

si

* Vedi le *Mem.* pag. 363.

ri un' altra specie di Ernia finora sconosciuta; Introducendosi nell' anello porzion dell' intestino, non già l' intero, cioè una parte sola del canale, la di cui membrana, qual mai ne sia la cagione, s' immette nell' anello, & a poco a poco si slunga, e forma infine un doccio senza apertura, dritto, e semplice, simile ad un ramo che dal suo tronco sporga. Tale il Signor *Littre* l' ha osservata, come pure, che in quella parte dove tal produzione laterale si divide e forma l' Ernia, la membrana è molto più sottile, appunto perche non può ella dilungarsi senza che a proporzione scemisi la di lei grossezza.

Si conosce facilmente, che le materie, quali calano dallo stomaco, abbiano sempre un libero valico fino all' estremità degl' intestini, poicche una porzione di questi non mai ce l' impedisce: Quindi è, che l' Infermo non vomita. Ma quantunque dette materie senza travaglio scorrano pe' lati del sacco ernioso, quelle però che sono entrate in esso possono esser impedita ad uscire: Cosa che può avvenire così facilmente, come agevolmente può la membrana, che fa l' Ernia, molto dilungata, e snervata nella molla, non contrarsi, e pignere fuor di essa qualche contiene; tanto più, che i muscoli del basso ventre, da quali è lontana, non sono in istato di ajutarla: Quindi tosto la parte si cancrena, e bisogna adoprarvi l' *Cerulico*. Questa specie di Ernia è rara, e la *Mecanica* l' addita; quantunque sia meno pericolosa, è più difficile a riconoscersi per quella ch'è, perciocche l' tumor che produce è minore, e l' Malato o non rice o molto rado. L' istesso confessa, che non conoscendo egli queste sorti di Ernie, un Uomo che ne avea una, a cui egli non osò ordinare alcuna ope-

operazione, perciocchè 'l di lui male non dividevasi bene per un Ernia , morì tra le sue mani . Non la ravvisò neppure sicuramente nel Cadavere , forse perchè non la credè possibile ; giacchè in tali occasioni non ben si vede qualche non si attende a vedere . Avendola di poi per caso rincontrata in due altri soggetti, li assicurò, che'l Malato, siccome egli avea dubitato , ne fusse morto ; & istruisce il Pubblico, che tal spezie di malattia siavi in Natura . Sarebbe questo per lo meno un vantaggio al genere umano , se conoscesse tutti i suo' Nemici .

Riferisce egli tutti i segni , donde possa riconoscersi questa novella spezie di Ernia , o la nuova operazione , di cui ha bisogno , o almeno la variazione considerabile dalla comune operazione , istruendone con tutta la necessaria minutezza i Chirurghi .

S O P R A
LA FORMAZION
DELLA VOCE .

PEr produrre il suono , bisogna alle prime, che sia mosso l' aere con grandissima velocità ; perciocchè questo in un secondo scorre 1800 passi , che è quanto dire , che in un ora farebbe più di 287 leghe mezzane di Francia , se le cagioni esteriori non l' impedissero . Questo si ha per esperienza .

Tutte le conghietture & i Fisici ragionamenti , si drizzano a persuaderci che questo moto s' im-

B 3

2. Vedi le Mem. pag. 288.

pri-

prima all' aere per mezzo di vive sollecite vibrazioni delle picciole parti del corpo sonoro, le quali da tal causa sian scosse.

La diversità di tali vibrazioni tempera il suono, e fa li differenti tuoni. Un maggior numero di vibrazioni in un istesso tempo produce un tuono più aguto.

E' si sà allo 'ncontro, che una corda sempre ugualmente tesa faccia in un tempo uguale altrettante maggiori vibrazioni quanto ella è più corta; o, se la di lei lunghezza sia sempre la stessa, ne produca maggiori, quando è più tesa. Due corde di una ugual tensione, le di cui lunghezze sian come 1 a 2, suonano l'ottava l'una dell' altra; se poi sian come 2 a 3, o come 3 a 4 &c. suonano esse la quinta, la quarta &c, come le ragioni di 1 a 2, di 2 a 3, di 3 a 4; sicche tutte le proporzioni delle lunghezze delle corde, donde veugono gli accordi musici, possono essere chiamate *Proporzioni Armoniche*.

Poicche la ragione di 1 a 2 fa l'ottava, quella di 1 a 4 farà l'ottava doppia, quella di 1 a 8 l'ottava tripla &c, e così delle altre ragioni; e può dirli che queste ultime proporzioni armoniche, 1 a 4, per cagion di esempio, 1 a 8 &c. sian progressioni di 1 a 2. Due corde di ugual lunghezza far parimente differenti accordi, secondo la varia tensione; di tali accordi però, che per le tensioni nascono, nel presente trattato non si farà quistione; regolandosi quelle rispetto agli accordi musici per altre proporzioni, e non già dalle lunghezze.

Il suono che ferisce le nostre orecchie non è solamente quello, che viene direttamente da corpi sonori, ma quello ancora, che uscito da essi corpi v' a pignere tutti i corpi vicini, e di là alle nostre
orec-

orecchie riflette; perclocche, quantunque tal suono riflesso abbia avuto a fare maggior cammino per giugnere a noi, di qualche il diretto ha fatto, la differenza del tempo a noi è affatto insensibile in picciole distanze per l'estrema velocità di tal moto; e se la nostra sensazione è poco fina e delicata, sicche confonda i due suoni per qualche picciolo spazio di tempo ancor distanti, questa stessa imperfezione a lei profitta, perciocche i due suoni insieme uniti considerabilmente si rinforzano. La saggia Natura non ha curato un vantaggio che noi non giovava, per un altro che ci reca molto utile.

Il suono riflesso rinforza altrettanto più 'l diretto, quanto le vibrazioni de' corpi riflessivi anno con quelle de' corpi sonori nell' istesso tempo fatta una ragione armonica più prossima, come di 1 a 2, di 2 a 3 &c.

Può parimente avvenire, che i corpi, quali riflettono, essendo molto più propri a produrre il suono di qualche non è l' istesso corpo sonoro, il suono, che rendono, sia più forte di quello del corpo sonoro, & il tuono di quelli sopravvanzi questo, e lo renda insensibile all' orecchio; sicche unicamente sentirassi quello de' corpi che riflettono, da quali non è addivenuto propriamente il suono.

A sodamente ragionare, il tuono può esser composto dal suon del corpo sonoro, e de' corpi riflessivi.

Supposto tal sistema del suono, il Signor *Doddart* ricerca in qual maniera si formi la voce dell' Uomo, e suoi differenti tuoni.

Nella nostra gola, in cima all' aspera arteria, canale per dove entra l'aere ne' polmoni, vi è una picciola apertura *Ovale*, capace ad aprirsi più o meno, che dicesi *Glotta*.

Questo doccio della *Trachea* terminato nella

parte superiore dalla glotta, rassomiglia sì bene ad un Flauto, che gli Antichi sicuramente crederono che la Trachea producesse la voce, come appunto il corpo del Flauto rende il suono. Galeno il primo sbrighossi da un sì naturale errore, e credè che la glotta fusse il principal organo della voce, non togliendo frattanto alla Trachea una considerabil parte della produzione del suono. Così sempre avvenir suole a coloro, che primi si ricredono di una comune opinione, di non intieramente sgannarsi, rimanendoli per ordinario nello spirito alcune impressioni degli antichi errori.

Ma il Signor *Dodart* ave avvertito, che non si parli, nè si canti, senza render l'aere, e non già ricevendolo; che l'aere, qualor esce da polmoni, da più piccioli vasi di questa parte passi in altri più grandi, e di là in fine nella Trachea molto più grande e più larga; che divenendo in conseguenza l' di lui corso più libero e più placido, e più che in ogn'altro luogo, nella Trachea, bisogna, che quì l'aere possa sofferrir violenza, & acquistar la necessaria velocità per lo suono; ma perche l'apertura della glotta è molto picciola riguardo alla larghezza della Trachea, non può egli quindi uscire per la glotta senza accrescere estremamente la sua velocità, e sollecitare il corso; ond'è, che agita violentemente, in passando, le picciole parti delle due labbra della glotta, e la molla di esse, e faccia a queste far vibrazioni che cagionano l' suono.

Questo così formato va a rimbombare nella cavità della bocca, e delle narici; & osserva il Signor *Dodart* che tutta la dolcezza della voce dipenda da tal tintinnio; che qualora si parla turando le narici, divenga la voce spiacevolissima; e che l'idea comune, secondo la quale il *parlar per naso*
di-

dispiace, sia falsissima, poicche al contrario in tanto tal suono disgusta, quanto perche si rende dalla bocca sola senza le narici.

Perche la Trachea risonasse, bisognerebbe, che l'aere dalla glotta modificato per divenir suono, invece di continuare il suo cammino da dentro in fuori, si ripercuotesse da fuori in dentro, & andasse a pignere i pareti della Trachea; che non avviene mai, toltone a quelli, che da violente tosse son presi, o che, secondo l'espression comune, *parlano dal ventre*. Ne' primi, irregolar convulsione della glotta, chiudendola quando l'aere vuol uscire, fa questo ricorrere in dentro, donde rivenir fuori dopo l'rinforzo che le riflessioni nella cavità della Trachea sofferte l'aggiungono. Negli altri, è un puro abito da alcuna disposizione naturale formato, quale produce in essi, allorché vogliono, qualche altrove è un accidente involontario.

E' vero, che nella maggior parte degli Uccelli de' Fiumi dotati di fortissima voce risuoni la Trachea; ma questo avviene, perche la glotta è posta nel fondo della Trachea, e non già nel capo, come negl' Uomini.

Questo canale, che prima era tenuto per principal organo della voce, non sarà dunque né pur il secondo e l'accessorio, cioè quello che farà il tintinnio, ma unicamente sarà destinato a somministrar l'aere, come appunto il Mantice negl' Organi.

Rimane ora a rinvenir la cagione de' differenti tuoni; e poicche gli organi che formano la voce son simili all' Istrumenti da fiato, il Signor *Dodart* da questi v'è ispiando come i tuoni si facciano.

Egli

Egli è possibile, come abbiain detto, che 'l tuono nasca da corpo che risuona, e non da quello che suona. L' Oboè non renderebbe suono alcuno, se non avesse la linguetta, e se qualche lo suonasse pignendo l'aere per l'apertura di questa, non producesse de' tremori e vibrazioni nelle due picciole sottili mobilissime foglie, dalle quali è composta. Ma il tuono viene dalla lunghezza dell'Istrumento: E l'aere agitato dalla linguetta nella cavità di questo scuotendo l'interiori pareti, le fibre del legno disposte per lungo brandiscono vibrando, e sì producono un tuono più basso, quanto più son esse lunghe, e più alto, quando son più corte.

Non lascia la linguetta frattanto di aver il proprio tuono di per se, ma il suon diretto che essa rende viene di molto sopravanzato dal numero infinito delle riflessioni che nella cavità dell'Istrumento si fanno; ch'è quanto l'arte ha saputo perche 'l tuono di essa linguetta non faccia una dissonanza con quello dell' Oboè, cui si accorda secondo alcuna ragione armonica più lontana, poicche in tal caso non può averse ne altra, ajutandolo e rinforzandolo quanto possibil fia. I Sonatori di Oboè tentoni solamente san trovare tal proporzione: Negli Organi un pezzetto di stagno, che sù le canne si adatta, fa l'uffizio di linguetta, che le fa risuonare; ma 'l tuono faffi dalla sola lunghezza di esse.

Vi sono allo'ncontro due suoni d'organo, detti il Reale, e la Voce Umana, dove la linguetta sola con la lunghezza della sua molla fa il tuono, & e' bisogna, che la canna vi si accordi secondo qualche proporzion musicale lontana, quale gli Organisti non fanno ritrovare ancora con precise regole.

Ne

Ne' registri di esso , da Tromba, da Pive, e da Corni , il tuono formati ugualmente dalla misura delle canne , e da quella della linguetta .

Ma nell' Istrumento naturale che produce la voce , cosa rinverrem mai sì somigliante a ciò , che produce il tuono in tutti questi varj Istrumenti ?

Secondo questa analogia , il tuono deve risponderfi , o alla bocca , & alle narici che risuonano , ovvero alla glotta , che fa 'l suono ; e perche tutti differenti tuoni si producono nell' Uomo per mezzo di un istesso Istrumento, convien che la parte , qual li forma , sia capace di mutazioni corrispondenti .

Per un tuono basso vi bisogna più aere che per un tuono alto : La Trachea per dar luogo a questa maggior quantità d'aere si dilata , si accorcia , e tira con ciò il canale della bocca , e lo dilunga . Per un tuono alto allo 'ncontro ella si restringe , si distende , e lascia , che 'l canale della bocca si accorti .

Potrebbe dunque crederfi , che 'l canale della bocca più lungo per lo tuono grave e più corto per l'aguto, sia propriamente quel che bisogna per la produzion de' tuoni .

Osserva però il Signor *Dodart* , che nel suono dell'organo , detto Voce Umana , in cui la linguetta sola fa il tuono , il doccio più lungo fino a 6 dita non sia capace di dar tuono : La cavità della bocca di un Uomo, che nel basso è più profonda, giunge alla misura di 6 dita , dunque non sembra che possa dar il tuono .

Riman dunque la sola glotta : Formerà ella i tuoni , come i suoni produce , e non altrimenti che per le differenti mutazioni della sua apertura . E' questa ovale , capace a dilatarsi fino ad un certo punto :

punto , o restringersi, donde le fibre delle membrane, che la compongono, divengono più lunghe per lo tuono basso , e più corte per lo tuono alto .

Nell' istesso tempo la bocca, che si dilunga per lo tuono basso e raccorcia per l'alto, s'adatta a proporzione a tutti i differenti tuoni , almeno secondo qualche ragione musicale lontana ; La natura troppo savia a non trascurar cosa ha badato sino a questo tintinnio favorevole .

La fabrica de' Cannocchiali risomiglia molto a quella dell' occhio : Le Trombe parlanti sembrano fatte a un da presso sù l'istessa idea delle concavità dell'orecchio ; niun Istrumento però da fiato venuto dalle mani dell' arte , e formato come quello che rende la voce dell' Uomo , non ve n'essendo pur uno, che produca i tuoni per mezzo della mutazione d'un istessa apertura.

Sembra parimente che la Natura abbia voluto rendere questo istrumento inimitabile . Sù le prime sarebbe egli difficile all' arte l'aver a sua disposizione materie molto pieghevoli per fare in esse un' apertura , che in ogni momento variasse ; e dovendo queste mutazioni ancora per ciascun tuono esser giustissime e sommamente precise, ecco un' altra difficoltà insuperabile . Ma quando in oltre da un calcolo esatto del Signor *Dodart* si vedrà , che per tutti i tuoni e semituoni d'una voce ordinaria per tutte le picciole particelle del tuono , donde ella può alzare un ottava , senza forzarli , per la maggiore o minor forza , che può darli al suono senza cambiar tuono , e' bisogna necessariamente supporre , che il picciolo diametro della glotta , qual' è minor di una linea , e che cambia la sua lunghezza in tutte queste mutazioni, possa essere , e sia in fatti , diviso in 9632 parti , che
que

ste istesse non siano tutte uguali; e per conseguenza, che alcune sian più picciole della $\frac{1}{1000}$ parte di una linea: qual industria dell'arte umana giugnerà mai a divizioni sì minute e delicate, quando il ravvisar che la natura abbia potuto farle ne sorprende?

Per un' altro verso non minore è lo stupore, che l'orecchio abbia sì giusto sentimento per i toni, che avverta ad una differenza che nasce da $\frac{1}{1000}$ parte di una linea.

In tutto questo calcolo il Signor *Dodart* si è sempre attenuto al meno, e si è guardato di affectare il maraviglioso; e pure con tutta maniera di valutar ingrosso, il calcolo è montato a numero sì prodigioso.

Non bisogna pensare che le fibre della glotta per formar l'ottava alta di un tuono basso, per cagion di esempio, debbano scortarli per metà, & a proporzione ancora il picciolo diametro della sua apertura: Sarebbe quello, se ella formasse i tuoni con la differente lunghezza di sue fibre; ma ella fa questi parimente con la varia tensione, nella qual maniera suonano l'ottava alta, senza esser accortate per metà dette fibre, ch' nell' istesso tempo son più ristrette; e quel che manca alla precisa misura vien supplito in punto alla tensione. Ma in fine son esse più ristrette quante si accorciano, & a strignimenti del picciolo diametro della glotta sieguono tutte le mutazioni di queste: Il numero di 9632 di tal diametro sussiste, e la maraviglia della formazion de' tuoni si accresce perciocché la Meccanica, quale dipende dal giusto combinamento delle lunghezze e delle tensioni, delle quali ancora le proporzioni son varie, è più difficile, che se dipendesse ella da un solo di questi principj.

Ma qual maraviglia reherà questo, se ben si
con-

consideri , che l'Uomo sia un ammasso di maraviglie , o simili , o che a questa si uguagliano , il numero delle quali supera la division del diametro della Glotta ?

SU DI QUEL CHE AVVENGA

ALI' AERE

ENTRATO NE' POLMONI.

* **P**Er ciascuna respirazione entra nuovo aere ne' Polmoni, quale essendosi mischiato col sangue , che le vene polmonari riportano al cuore, esce quindi con l'istesso sangue , l'accompagna per tutte le arterie , a quali egli si scompartisce , e lui dà la spinta e la velocità necessarie per la circolazione.

Quest'aere però giunto all' estremità dell' arterie , & alla superficie interior della pelle , cosa diviene ? perciocchè deve egli in fine uscir dal corpo , giacchè ogni espirazione rifonde del nuovo, e farebbesi con cidun tal ammasso, che gonfierebbe molto i vasi , forzerebbe le loro molle , e le snerverebbe , il sangue s'arresterebbe, e per lo meno la circolazione renderebbesi molto penosa.

Non par che in questo vi sia molta difficoltà, perciocchè i pori della pelle dan luogo all' uscita de' sudori , e molto più alla materia dell' insensibil traspirazione , quale è sì copiosa , che quella
di

* Vedi le Mem. pag. 252.

di un sol giorno, secondo l'esatte sperienze, sorpassi le feccie grossolane di più giorni: Quindi facilmente comprendesi, che per questi stessi pori scappi via nell'istesso tempo una materia così sottile, quant'è l'aere.

Essendo questo pensamento naturalissimo, apparentemente ha sodisfatto a Fisici, quali non an'istimato che vi bisognassero inchieste più profonde da farsi su di tal soggetto. Ma questo è un troppo bello esempio di quelle difficoltà, che alle prime non ci si presentano, e che per mezzo di riflessioni si scuoprono, costando talvolta altrettanto per ritrovarle, quanto lo snodamento istesso di alcun'altra difficoltà.

Se l'aere potesse insieme col sudore e vapori trapassare i pori della pelle, il Signor *Mery* dimanda, perchè non i vapori egli quando vien rinchiuso in alcun grosso doccio di vena, o di arteria, in un cuore, o in uno stomaco?

Inoltre perchè gli animali si gonfiano nel voto? Fermamente ciò avviene dall'aere contenuto da loro corpi disbrigato dal peso dell'esteriore, che rarefacendosi li gonfia; e pure detto aere dovrebbe più liberamente uscirne allora per i pori della loro pelle.

Egli è vero, che vi siano alcuni animali, che risfondono aere nel voto, nega però il Signor *Mery*, che questo si faccia da' pori della pelle. I pesci vivi, per cagion di esempio dan l'aere; ma considerando attentamente il fatto, il Signor *Mery* ha ritrovato, che esca da sotto le loro squame, ove dovea egli avere picciole ritirate non ancora scoperte; & in fatti i corpi de' pesci non isgonfiano punto dopo di aver refo tutto quest'aere.

Dunque l'aere non esce da pori della pelle, e
bi-

bisogna che giunto col sangue all' estremità delle arterie, entri con lui nelle picciole bocche delle vene, e per tutta la rimanente circolazione l'accompagni, e vada nel ventricolo destro del cuore, donde ritorna a' polmoni per l'arteria, quando vi era entrato per le vene: Da dette arterie rientri nelle vescichette del polmone, & in fine esca per la Trachea, che l'avea recato. Questo giro non vien solamente provato per forza di raziocinio, ma con la speranza ancora, e col soffamento.

Se le cause finali si considerino, e si osi a divinare le intenzioni della Natura, l'aere non è men necessario al sangue delle vene, che a quel dell' arterie, anzi sembra che lo sia molto più. Le vene da per tutto non an molla a paragon dell' arteria, e contengono esse quasi che la metà più di sangue, ond'è, che tengono maggior bisogno di forza straniera che loro soccorra a spignerlo.

L'aere snervato, & in qualche modo usato per l'intiera circolazione, che egli ha fatto nel corpo, non li rimane altro, che ad uscir fuori, e dar luogo al nuovo più vivo.



DE' VASI ONFALOMESENTERICI.

2 **T**utti i Feti anno per lo meno due inviluppi, o membrane, l' Amnio, e l' Corio.

La maggior parte degli Animali ne anno una terza che dicefi Allantoide, ovvero Urinaria, perciocche ella conserva l' Urina del Feto.

Ma vi sono altri Animali, come il Cane, il Gatto, & i Conigli, che an la quarta. I Notomisti non ne fanno iscovrir l'uso, e può vederfi quel che ne ha detto il Signor *Tanvry* nel suo Trattato del Feto.

Questa quarta membrana ha de' vasi sanguigni, che si chiamano Onfalomesenterici, perciocche da questa membrana, lungo il Cordone, vanno sino all' Umbilico, e s' imboccano nel mesentero.

Il Signor *Du-Roi* descrive questi stessi, che pretende non essere stati ben ravvisati dal Signor *Tanvry*.



2 Vedi le Mem. pag. 204.
1700.

C

su

S U L' A Z I O N E
D E L V E N T R I C O L O
N E L R E C E R E .

IL Sig. *Chirac* Celebre Medico in *Montpellier* avendo il primo proposto che 'l vomito fusse prodotto dallo straordinario moto del Diafragma e de' Muscoli del basso ventre, e non già dalla contrazione delle fibre dello Stomaco, sicche in questa ipotesi egli spogliato intieramente da tal'azione, e solamente premuto, e da cagioni straniere schiacciato, rispingesse fuor di se le materie che contenea; l' Accademia ha voluto mettere in disamina un pensiero che per lo solo nome dell' Autore preveniva con infinito favore gli animi,

Il Signor *Du-Verney*, qual' era nell' istessa opinione, e che avea fatto, come il Signor *Chirac*, molte sperienze su di Animali vivi a' quali avea dati sì vomitivi, intraprese a rifarle nelle assemblee, e render così visibile tutta la Meccanica del vomitare, di cui si era egli convinto in particolare. Due sole sperienze però ch' e' fece non diedero bastante lume, e la Società costretta ad impiegare in altre cose quel tempo, che avrebbe dovuto spendere per ricominciarle, si rimise alle osservazioni che 'l Signor *Du-Verney* con maggior agio avrebbe fatte.

Alcuni Notomisti, e principalmente il Signor *Litre*, opposero a tal Sistema esservi persone, quali vomitano con molta facilità, senza apparir alcuno sforzo, almen bastante, nel Diafragma e ne' muscoli

scoli del basso ventre: Che certamente gli Animali ruminanti senza violenza alcuna richiaman sopra gli alimenti già presi: Che talvolta si rende per la bocca qualche è entrato per la parte deretana, & è stato in conseguenza in gran parte del suo corso fuori dell'azion del Diafragma e de' muscoli del basso ventre: Che infine essendo l'Esosago, il Ventricolo, e l'Intestina un istesso canale continuato e rivestito per tutto dalle medesime fibre carnose, & essendo allo 'ncontro fermo che le intestina, oltre al loro moto peristaltico e naturale per cui stringendosi succellivamente da alto a basso cacciano secondo questa direzione le materie che contengono, anno ancora il moto antiperistaltico straordinario, per cui da basso in alto stringendosi fan risalire dette materie, non è verisimile che l'istesso canale, cioè il Ventricolo e l'Esosago, non abbiano ancora alcune volte questo stesso moto antiperistaltico; e che così l'azion del ventricolo non produca il vomito.

Hà egli una grande apparenza, che disaminata a fondo ben la materia, tutte due opinioni si ritroveran vere, se non si pretenda che l'una escluda l'altra. L'istesso Ventricolo, che si suppone capace di oprare di per se, contraendo sue fibre a vero contrario, perche non puol egli esser ancora sì violentemente premuto da giù in sù che per questa sola cagione ne siegua l'istesso effetto? Inoltre queste due Mecaniche non essendo incompatibili, perche tal volta in un istesso tempo non potranno elleno operare? Niuna cosa impedisce che in alcuna specie non sian esse assolutamente separate, senza che vi sia luogo di dedurne conseguenze a favor di altre spezie. Sinora l'unico certo è il sospendere le Propolizioni generali.

S U

LE PARTI DESTINATE
ALLA GENERAZIONE.

* **I**L misterio della generazione da tanto tempo oscuro comincia ad aprirsi. Il Sistema generale di questa Meccanica apparentemente è scoperto, e deve si ad alcune importanti delicatezze di Notomia la sicurezza del rimanente.

Il Signor *Du-Verney*, che ha fatto molto inchiesta su di tal materia, cominciò a riferirle all' Accademia: Il Signor *Littre* vi aggiunse le sue, e la verità fu altrettanto più rischiarata, o per lo meno le cose dubbiose tanto meglio riconosciute per tali, quanto che questi due Notomisti non sempre furono di accordo.

Su le prime il Signor *Du-Verney* disaminò qualche riguardava a' malchi Animalij; poichè la Notomia comparata istruisce meglio, & è più curiosa, ebbe egli la cura di sempre far vedere l'istesse cose in molte spezie di Animali, nell' Uomo, nel Cavallo, nel Bue, nel Gatto, nella Capra, nel Topo, nel Coniglio, nel Sorcio d'India, & in alcuni altri.

La prima quistione fu su' l' Prepuzio. Il Signor *Du-Verney* dimostrò picciole glandule, quali, secondo le differenti spezie di Animali, erano appiccate, o al Prepuzio, ovvero alla Glande, o a tutt'edue.

La

* Vedi le Mem. pag. 375.

La fabbrica, e'l liquor che per quelle feltrasi destinato ad impannicciare & ugnere la Glande e'l Prepuzio, non erano meno differenti, che la loro situazione: Conghietturò egli che potevano esservi simili glandule, ma molto picciole, nel Prepuzio umano, donde sorgesse quel che per esperienza si sa che si raccoglie a poco a poco intorno alla Corona. Quella fù una semplice conghiettura, e confessò egli di non vi esser cosa che pienamente sù'di tal materia lo sodisfacesse. Il Signor *Littre* però stimò di non doverli quì rimanere; & accordando le glandule al Prepuzio di alcuni Animali, sostenne che nell' Uomo la Glande propria avesse intorno alla Corona alcuni corpi grossi quanto una setola fina di Porco, lunghi mezza linea, di figura cilindrica, allogati paralleli secondo la direzion della Glande, e gli uni distanti dagli altri per un terzo di linea, premendo i quali facea uscirne una materia bianca e densa, a foggia di filo, come quelli che si spremono dalle glandule delle palpebre. Se suspizion cadesse che queste pretese glandule potessero essere papille del' a pelle della Glande gonfiate, il Signor *Littre* replicherebbe, che contrastino a tal'idea la troppo esatta disposizione di esse sempre costante, il numero sempre uguale, e la molta delicatezza della pelle di cui dovrebbero esser papille, quale sorpasserebbero più di quattro volte in grossezza, e soprattutto la materia qual pretende egli che spremuta ne gema: condizioni tutte che si denno alle glandule, e non già alle papille.

Il liquor seminale, comunque egli vien fuori per l'uso destinato, è un mescolamento di più succhi, che si versano nell' istesso tempo nel canal comune dell' Uretra dalle glandule che l'an lavorato, o dalle conserve che l'an ritenuto. Il Signor *Du-Roi*

dimostrò che in differenti specie il numero e la fabbrica di questi organi etano differenti. Nell' Uomo, i principali sono le Vescichette seminali e le Prostate. Il Signor Cowper celebre Notomista Inglese ha scoperto in ciascun lato dell' Uretra, tra principj de' muscoli Erettori e degli Acceleratori, nuovi corpi glandulosi, che possono dirsi nuove Prostate, i docci escretorj delle quali vengono a sboccare nell' Uretra sù 'l nascere della Verga; e 'l Sig. Verney ha fatto vedere che nella maggior parte degli altri Animali ancor si ritrovino nell' istessa maniera siti. La questione è, se il liquore feltrato per dette nuove Prostate si mescoli col femminile, e sia perciò necessario alla generazione. Il Signor Du Verney crede di sì, perciocchè negli Animali castrati queste glandule, come tutte le altre che concorrono alla generazione, si ritrovano disseccate e vizze; che alcuni Ammalati per la parte, che disegnano, fan giudicare ch' il loro male sia in queste glandule; e qualche avviene ad alcune persone smoderatamente a' piaceri addette, quando rendono l' ultime gocce d' orina, debba rifonderli a queste glandule poste sotto al principio de' muscoli acceleratori, quali appunto fan per allora tal' azione. Il Signor Littré oppone a questo che le Prostate ordinarie, avendo molti piccioli sacchi ove il liquore feltrato si dispone, ben fa concepire che attenda egli alcun tempo necessario per uscire, ma che le nuove Prostate del Signor Cowper non abbiano simiglianti conserve; ond' è che 'l liquore deve scorrere nella cavità dell' Uretra come egli si feltra, & esser destinato ad un continuo uso e non già momentaneo: Inoltre che i condotti Escretorj di queste nuove Prostate travertino lo tessuto spugnoso dell' Uretra, serpendo per la lunghezza di due dita, prima di penetrare nel canale, e che nel

nel solo momento, in cui pretenderebbesi che tal liquore dovrebbe uscire, detta tessitura spugnosa si gonfia, le pareti sottilissime si comprimano, nè dian libero il passo a' liquori .

Tutti i Fisici fanno presentemente qual sia la struttura interiore della Verga, e di là conghietturano la Mekanica donde prende ella la figura necessaria per la sua funzione . Vien composta da due Corpi Cavernosi , quali altro non sono che un ammasso d' infinite picciole cellette membranose dell' Uretra , canal comune a due liquori che per detta parte escono, e da un Tessuto spugnoso che accompagna per tutto 'l suo corso l' Uretra , niente differendo da corpi cavernosi , se non se che le cellette son più picciole, onde questi è più stretto . Quelche diceli Glande non appartienfi a' corpi cavernosi, essendo ella una dilatazione o rallargamento della sostanza spugnosa dell' Uretra , ricurvata , e rivolta su le due punte coniche de' corpi cavernosi che qui vengono a finire, & ad appoggiarsi , senza altra comunicazione . L' Illustre Signor *Ruyfch d'Amsterdam* il primo ha pubblicata questa struttura della Glande ; ma per alcune poco accurate espressioni delle quali si è egli servito , essendo entrati alcuni della Compagnia in dubbio del vero lor senso , il Signor *Bourdelin* ebbe la cura di rivangare a fondo queste particolarità di fatti nel libro del cennato *Ruyfch*, e ritrovò che a ben intendere le di lui parole non potea negarseli la gloria di aver conosciuto tal verita .

Nella Verga vi son due sorti di vasi sanguigni, le arterie e le vene Ipogastriche, e le arterie e le vene Untuose . I primi di questi vasi dividonsi nell' interior della Verga , cioè tanto ne' Corpi Cavernosi, quanto nel Tessuto spugnoso dell' Uretra; i secondi
C 4 nell'

nell' esteriore, e van solamente nelle coperture & involuppi della Verga.

I Signori *Ruyfch, Du Verney, e Littre*, anno osservato che l' estremità delle vene Ipogastriche son forate con sensibili buche: Egli è chiaro che 'l sangue, qual deve passare dalle arterie nelli piccioli filetti dell' estremità delle vene, vi passerà più facilmente in virtù di tal Mekanica. Il Signor *Mery* più di 27 Anni sono la rinvenne nelle vene della Milza del Bue; e poicche la necessità di far rientrare il sangue nelle vene è uguale per tutto 'l corpo, e la difficoltà sempre è molto grande, quantunque in diversi luoghi ineguale, sospica egli che tutte le radici delle vene potrebbero ben essere così succhiate, con maniere però insensibili.

Secondo l' opinione la più comune presso de' Notomici d' oggi giorno, la Verga cambia di figura, perciocche i muscoli gonfi da' spiriti comprimono i tronchi delle vene Ipogastriche, quali riportano il sangue tanto de' Corpi Cavernosi quanto del Tessuto spugnoso dell' Uretra. Questo sangue, che non più ha 'l suo corso libero, ricorre per i forami che tengono queste nella loro estremità, e v' a diffonderfi nel numero infinito delle Cellette che prima eran vote e l' une sù l' altre compresse: Le riempie, le dilata, e di là nasce l' accrescimento di essa. Quando la Verga ripiglia la sua più ordinaria figura, cessa la compressione delle vene Ipogastriche, e ripiglia il sangue 'l suo corso, e tutto quello, ch' era disperso e stravasato nelle sostanze spugnose, riprende altrettanto più agevolmente il cammino delle vene quanto che ritrova egli da per tutto le grandi aperture anzidette.

Verisimile tutto che sia questa Mekanica, reca però pena alla mente l' interrompimento della cir-

colazione del sangue, al quale è necessario un continuo moto, poichè, s'egli mai si fermi, si rappiglia e si altera, e, secondo avverte il Sig. *Bourdelin* che molto ha disaminato questa materia, dovrebbero esservi delle malattie, nelle quali, per la lunghezza di tale interruzione che dura più ore, s'avviserebbe il sangue assolutamente fissarsi e divenir incapace di rientrare ne' vasi e ripigliar il suo corso finito lo stato violento: Siccome ancora tutte le *Cellette membranose*, le di cui picciole fibre sono apparentemente altrettanti piccioli muscoli, che 'n restringendosi pingono il sangue fuor di essi, quando bisogna, perderebbero per sì lunga e violenta tensione tutta la forza della lor molla, nè potrebbero con ciò far più urto al sangue. In fine bisognerebbe che le arterie *Ipogastriche*, certamente men compresse delle vene, rifondessero sempre un qualche poco di nuovo sangue: che mai farebbersi di questo, giacchè le vene no'l ripigliano? Romperebbe egli e distruggerebbe tutte le *Cellette* che no'l potrebbero contenere. Il Sig. *Du-Verney* per prevenir tali difficoltà, ha creduto che'l nuovo sangue portato sempre dalle arterie *Ipogastriche*, benchè in minor quantità, ritorni, non per le vene *Ipogastriche* che naturalmente lor corrispondono, ma per le vene *Untuose* che serpono sù la parte esterior della *Verga*, e son lontane da tal compressione. Per questa ingegnosa *Mecanica* la natura avrà mantenuta sempre una circolazione imperfetta, porgendo alle arterie *Ipogastriche* vasi da scaricarli, de' quali non farà uso che in tali operazioni.

Ma come il sangue dell'arterie *Ipogastriche* passa nelle vene *Untuose* che con esse non comunicano? e quali son le vie di tali Vasi?

Il Signor *Du-Verney* col soffio ha dimostrato
che

che una porzione delle vene Ipogastriche comuni-
chi con le vene Untuose: Così il nuovo sangue del-
le arterie Ipogastriche, che prende il dritto cammi-
no ordinario delle vene Ipogastriche, ritrovandole
ingorgate, vien costretto a rigogliare nelle vene
Untuose che con queste corrispondono.

Il Signor *Littre* non conviene intorno a questo
cambiamento del corso naturale della circolazione;
crederebbe egli che si facesse questa più lentamente
per la compression de' vasi, ma non già per altri gi-
ri. La compressione delle vene Ipogastriche, secon-
do lui, non è sì grande che intieramente possa ar-
restare il corso del sangue: Il tronco di questa vena
è allogato in una spezie d'incavo, o di scanalato,
quale par che la difenda dall'esser fortemente com-
pressa.

Nell'istesso tempo, o per mezzo del soffio, il
Signor *Du-Verney* sè vedere che le vene del Tessuto
spugnoso dell' Uretra comunicavano con quelle de'
Corpi Cavernosi e con le vene Untuose. Egli è vero
che la maniera, per cui pretendeva egli che si facesse
tal comunicazione, fù contestata da alcuni altri
Notomisti e specialmente dal Signor *Littre*: Il
Signor *Bourdolin* propòse diversi espedienti per di-
sfaminare a fondo questa Mekanica, giacchè 'l soffio
e le iniezioni e tutte le altre operazioni Notomiche
anno, secondo le differenti disposizioni delle parti,
de' varj incomodi che bisogna prevenire, o de' segni
equivoci che non rischiarano; sicche le scelte sole
delle operazioni, o la maniera di farle, richiedono
uno studio molto grande. Quando i Notomisti del-
la Società ripiglieranno questo argomento, dovrem
seguire le sole mite del Signor *Bourdolin*, giac-
chè tutti i Preliminari per lo meno sono incagliati.

DIVERSE
OSSERVAZIONI
NOTOMICHE.

I.

IL Signor *Poupart* facendo la sezione di una Fìgliuola di 7. Anni, ritrovò che nel lato manco ella non avea nè arteria, nè vena Emulgente, nè Rene, nè Uretere, nè arteria, nè vena Spermatica, e vidde parimente che non appariva vestigio alcuno di dette parti che prima vi fossero state, rese poi vizze, o distrutte da qualche indisposizione. Il Rene e l'Uretere del lato destro erano più grossi del naturale, perciocchè ciascun di essi dovea far solo la funzione di tutti due.

Avea essa un Ovajo dal lato manco, ma infcondo, mancando a questo la vena e l'arteria Spermatica. Allo 'ncontro la Tromba di quest'istesso vaso non avea Fimbrie, altro principio di sterilità per lo lato sinistro. Se l'altro avesse avuta l'istessa disposizione, e fosse detta Giovane vissuta, sarebbe stata infallibilmente sterile, & inesplicabile la sterilità.

II.

Il fù Signor *Tanury* lesse una lettera scritta dal Signor *Courtiat* Medico di Tolosa sù di una Donna di 21 in 22 Anni, che avendo avuta prima la fe-

bre,

bre, cominciò indi a soffrir gravi dolori per tutto 'l corpo, fino al non poterli reggere sù de' piedi, a contrafarsi, & a stremare tanto sensibilmente che in 18. o 19. mesi di malattia perdè un piè d'altezza. Non poteva ella essere mossa senza che le ossa non si piegassero, tutto 'l corpo se li gonfiò, e la pelle divenne considerabilmente più grossa e più dura, e frattanto molto mangiava. Morta ch'ella fù, si osservarono tutte le ossa più molli della cera, fuorchè i denti, quali avean conservata la lor natural durezza: Erano esse più facili a tagliarsi che la carne, sembrando alcune certa spezie di carne fungosa e molliccia, divise in più lobi d'irregolar figura, imbevute di Sieri sanguigni, senza cavità alcuna, nè apparenza di midolla. Tutte le altre parti del corpo erano nello stato lor naturale.

III.

Il Signor *Homborg* riferì che una Giovane Donna di 20 Anni segnata 20 volte in 6 mesi, essendosele fatto un lavativo con acquavita e canfora, sentì all'istante lo spirito di vino nella bocca, & inebriata affatto non rese il lavativo, & orind molto, che non faceva prima con tanta facilità.

IV.

Per qualche tempo corse uno scempiato rumore della gravidanza di un Uomo, ma tutto scempio ch'è fuisse, avea qualche fondamento; & in fatti, perchè si ebbe la curiosità d'indagarlo, seppe si un accidente molto singolare, di cui il Signor di *S. Donat* Chirurgo di *Sisteron* scrisse il rapporto al Signor *Renanque*. Un Giovane con l'occasione di
al.

alcuna dimessichezza permessali da una Donna tra certi limiti ristretta, sentì in un de' Testicoli vivissimo dolore, che sì due ore le durò, nè intieramente in tutto 'l rimanente del giorno rifinì. In qualche giorno appresso e' si avvidde che nell' itesla paste avea egli un tumore grosso quanto un nocciuolo: Sei Mesi appresso divenne più grosso come un ovo di Gallo d' India, senza che li cagionasse dolore; ma poicche ne' due Mesi appresso smisuratamente si avanzava, il Signor de *S. Donat* lo tagliò, dopo di averlo separato da tutte le Tuniche che formano lo Scroto. Entro di questo si ritrovò una massa di carne bianchissima, sodissima, e senza fibre, contenuta in una come secondina, e nuotante in una quantità d' acqua che avrebbe riempita una grande scodella.

Il Signor di *S. Donat* avendo aperta questa massa di carne, nel centro vidde un globo osseo, quale avea due cavità occupate da due picciole vesciche nere piene d' acqua e molto simili all' Uvea. Sotto di questo globo eravi una depressione, come quella del palato, e detto globo era solido, intiero, e senza cavità, sporgendo per dintorno alcuni come raggi offei in forma di Stella senza ordinanza regolare. La ferita dello Scroto, qual' era grandissima, guarì più prestamente di qualche sogliono altre piaghe. La falsa simiglianza alla testa, che tal globo avea, quella spezie di secondina, il tempo di 8 o 9 Mesi, avean dato luogo alla favola della gravidanza.

V.

Il Signor *Renoume* con lettere del Signor *Dapirier Medico di Tours* fu avvisato del fatto stragordic

ordinario osservato nella sezione del corpo di una *Sorella della Carità* di detta Città. Avea questa menata una vita molto regolare, & era di un temperamento malinconico, soggetta a gravi emicranie, senza che mai avesse avuto i suoi fiori. Essendo un giorno caduta con la testa in giù, ella vi sentì sempre dolore, & ebbe de' grandi insogni, senza però febre: Cadde in fine in un delirio malinconico serio, e dopo 6 Mesi di tal delirio, che sù la fine erasi accresciuto, in una notte battossi dalla finestra di sua Camera, e morì. Fù aperta: I ventricoli del cervello contenevano poco siero, ma niell' uno e nell' altro si ritrovarono tre escrescenze di bruno colore, grosse quanto una nocciuola, bislunghe, di consistenza solida e glandulosa, attaccate alla pia matre con un picciuolo lungo due o tre linee, e grosso quanto un crin di cavallo. Non potè distinguerli, come nelle altre glandule, nè arteria, nè vena, nè nervo, nè doccio linfatico. Nel ventre inferiore, l'Ovajo destro era grosso quanto un pugno, e'l sinistro dell'ampiezza e figura di un grosso uovo di Pollo. Il Chirurgo aprì il destro, che diè fuori molto marciume sciolto, senza odore, rimanendo una massa quanto una grossa pilotta di peli ammassati con una spezie di Sego. L'apertura della Tromba era chiusa, & inbrigata nell'Ovajo dilatato, e quasi che distrutto dalle materie dell' Ascesso, divenuta essa Tromba una spezie di fistola, per cui il marciume fieroso dell'Ovajo passava nell'Utero, e di là nella Vagina.

VI.

Riferì all' Assemblea un Chirurgo il fatto che siegue. Un Uomo mentr' era alla Caccia, s'oltacasi

taseli la testa dalla parte destra per uno sforzo violento, durò molta pena a rimetterla nella natural situazione: Da questo momento in poi ammalò sempre, non potendo senza molta difficoltà inghiottire e respirare. Sù l'finir di 15 Mesi morissene, e si osservò l'Aorta dilatata a dismisura, nella Socclavja destra un gran sacco Aneurismatico, l'Esofago e la Trachea infinitamente premuti da detto sacco, le Clavicole discostate, & un pezzetto d'osso, che mancava allo Sterno, rinchiuso nel sacco cennato. Non è sì facile il comprendere come detto Osso siavi entrato.

VII.

Il Signor *Littre* dimostrò una milza d' Uomo intieramente impietrita: Era questa a tutti i vasi o ligamenti attaccata, a' quali naturalmente la milza si appicca, sicche non potea dubbitarsi che non fusse ella tal parte. L' Uomo avea 60 Anni, & era morto per una caduta, nè fù sentito mai a lamentarsi della milza, nè di alcun male che a questa corrispondesse. Era parimente egli allegrissimo, quantunque tal parte non facesse in lui funzione alcuna, cioè, a comun credere, che purificando il sangue contribuiffe ella all' allegria. Pesava detta milza pietrificata un'oncia e mezza.

VIII.

L' istesso dimostrò una parte della membrana della milza d' Uomo divenuta osso.

IX.

IX.

Un della Compagnia cagionevole per ritenzione di Urina ha detto che un giorno, in cui veniva dal male travagliato, avendo il Chirurgo introdotta la tasta, questa non riportò seco altro che sangue, forse perche avea rotto alcun vaso sanguigno; l' Ammalato crudelmente doleasi, onde il Chirurgo si avvisò tosto di riempire la punta della tasta di butirro, dopo di che l' immettè fino alla Vescica, e se indi venir l' Urina, o perche forse nella Vescica il butirro fù riscaldato fino a sciogliersi, o perche diè luogo più facilmente all' Urina che al sangue, qual' è più grosso.

X.

Il Signor *Du-Verney* riferì che un Figliuolo di 7 Anni, che sempre lagnavasi di un acerbo dolore alla radice del naso, avendo sofferto per tre mesi lenta febre e 'n fine convulsioni grandi, se li ritrovò dopo morto nel seno longitudinale superiore del cervello un Verme lungo quasi quattro dita, simile a' que' di Terra, qual visse dalle 6 ore del mattino fino alle tre dopo mezzo giorno.

XI.

E nell' istesso tempo raccontò che una Giovane, qual facea il suo letto, avendo ingojata per caso una piuma, sentì un gran dolore, & indi se li fe un tumore a lato della Laringe, dal quale aperto, col ferro se ne trasse la piuma.

XII.

XII.]

Sù d' un Granocchio di frosco morto sè vedere che in prendendo nel ventre dell' Animale i nervi destinati alle Coscie , & alle Gambe , & irritandoli un poco con qualche punta , dette parti brandiscano , e soffrano una spezie di convulsione . Tagliò indi quest' istessi nervi nel ventre , e tenendoli un poco distesi con le mani , li sè fare l' istessi effetti per mezzo della punta medesima . Se 'l Granocchio fusse morto da più lungo tempo , questo non avveniva . Rimanevan forse ancora in detti nervi i liquori , l' ondolamento de' quali cagionava i movimenti delle parti corrispondenti ; & in conseguenza i nervi non farebbero altro che docci , nè quali tutto l' effetto dipenderebbe da quel liquido che contengono .

XIII.

Nel cuor di un Uomo di 20. o 22. Anni che si era annegato , Il Signor *Littre* sè vedere il doccio ovale aperto , o per lo meno la membrana , che 'l chiude , così leggiermente attaccata , che in maneggiando detto cuore se n' era distaccata senza avvedersene .

XIV.

L' Accademia vidde tra le mani del Signor *Lemery* una pietra ritrovata nella Vescica di un Cavallo , di 23. oncie e 7. dramme di peso : Il diametro di essa in una parte era di 4. dita $\frac{1}{2}$, e nell' altra di 4. $\frac{1}{2}$, la grossezza uguale ad un mediocre Meloné ,

Isfor. 1700.

D

loné,

lone, & era ricoperta da una spezie di pelle liscia e lucente: La sostanza dava al color di cenere, che s'indurò dopo che fù tirata dall'Animale, non lasciando però sempre di esser molto frangibile: In seccandosi perdè ella il grave odor d' Orina che prima avea.

XV.

Recò parimente il Signor *Lemery* all' Assemblea una picciola Lepre mostrosa, o per meglio dire, due Lepri unite insieme dalla testa sino al petto: Avevano esse una testa, & una faccia, quantunque avessero quattr'orecchie; in luogo della gola avevano una picciola cavità senza apertura alcuna per ricevere gli alimenti, e pur vissero fuori del ventre della Madre, poicché furono esse colte da un Cacciatore, camminando l' Animal doppio in un Bosco, mentre una delle picciole Lepri tirava per un verso e l' altra per un' altro, senza avvanzar punto. Fù detto al Signor *Lemery*, che essendosi aperte vi avean ritrovato un cuore per ciascheduna, un polmone, & uno stomaco molto sani.

XVI.

Il Signor *Mery* fe la descrizione di due Feti gemelli Maschi osservati pocanzi: Avean tutt' due una sola secondina, ma 'l funicolo ciascun per se, siccome le membrane ancora separate: L' Umbilico di detti due Figluoli formava al di fuori una spezie di cerchietto elevato sù la superficie del ventre per 3. o 4. linee, la cui apertura avea 7. o 8. linee di diametro, L' Intestino Colon metteva capo a questo rialto dell' Umbilico, forandolo con una

una buca 1. linea e $\frac{1}{2}$ larga, che serviva a' Figliuoli per ano . Il fondo della vescica era parimente aperto, & imboccava, come il Colon, nel tudetto rialto Umbilicare , di maniera che le orine immediatamente andavano nelle membrane della secondina: L'Uretra frattanto e la glande erano in tuttiedue i Figliuoli pertugiate , il Prepuzio però era aperto nell' uno e chiuso nell'altro . Uscirono essi vivi dal seno materno .

XVII.

Un' altro Figliuolo mostroso, che vidde il Signor *Mery*, avea la Spina del dosso in tal maniera contorta che la faccia, il petto, e'l ventre vedevansi per davanti ; le parti esteriori della generazione, le ginocchia , & i piedi erano rivolti dietro del corpo. I tre seni della testa, del petto, e del ventre, erano tutti aperti , mancando alla testa la volta del Cranio, lo Sterno e la cartilagine delle costole al petto, & al ventre tutti i suoi muscoli e'l Peritoneo. I polmoni erano piccioli, vizzi, e disseccati, e la struttura del Cuore era particolare, poicchè le auricole non formavano due cavità separate, come neppure i due vètricoli: Le vene del polmone, & i due tronchi della Cava imboccavano nella cavità, comune alle due auricole , quale per mezzo di una grande apertura, comunicava con la cavità che potea dirsi ventricolo destro, e per una molto picciola, col passaggio del ventricolo, destro al sinistro . L'arteria del polmone e l' Aorta sorgevano dal ventricolo sinistro , senza doccio ovale , quale per altro era inutile , come facilmente può conoscersi. Il sangue delle vene nella cavità comune alle due auricole raccolto la maggior parte dovea passare nel ventricolo destro , e

D 2

quin.

quindi , poicchè detto ventricolo non avea arteria, nel ventricolo sinistro, giacche comunicavano insieme. In tal situazione tutto quasi'l sangue si drizzava all'Aorta, & il polmone quasi che non ne ricevea dall'arteria polmonare,

XVIII,

Ad una Giovane di 20. in 22. Anni di buon temperamento , dopo di una febre intermittente con remedi ordinari curata, se li estinse la voce per un Anno e mezzo senza intermissione: Gli ordinari remedi per simigliante morbo nulla li conferirono, trátone quando ulava il mezzo bagno prescritti, dove alcune volte stando nell'acqua la recuperava, quantunque molto roca. Quando avea la febre, nel calor di essa parlava. Avendo il Signor *Lemery*, da cui si richiese consiglio sù di tal malattia per lettere, ordinati differenti remedi che la ragione Fisica lui suggeriva, questi ripararono a que'travagli che eran rimasti all'Inferma dopo la febre, ma non già all'estinzione della voce: Quasi per caso ne ordinò uno che fe un maraviglioso effetto. Fù questi la pozione a modo di Tè dell'Erbe vulnerarie: Sin da che la prima volta ella l'usò, rivenne la sua voce per mezz' ora, e di nuovo si estinse; continuando però l'uso di tal decozione, o calda o fredda, a poco a poco ritornò la voce, dimanierache solamente la sera la perdeva, principalmente se ella si sollevasse al fresco; ma in fine ripardò a quest'istesso, col prendere due cucchiaj di sua pozione. Si credè che la virtù della pozione dovesse risponderli all'acqua calda; ma l'esperienza dimostrò questa inutile: Le decozioni di altre erbe che abbondano di acido, come ancora il Caffè, il Cioccolato, l'infusa-

lata,

Lata, le frutta crude, il pesce, la Zuppa magra, il molto intervallo di tempo mentr' ella mangia, li fan perdere la voce; li Brodi, il Latte, e'l Vino non producono quest' effetto. Ha sempre ella seco un vasetto dell' infusione delle vulnerarie, per servirse- ne al bisogno, e dice ella di aver la sua voce nella sacca.

XIX.

Un Giovane essendo caduto da luogo molto alto, soffrì una ferita sù la Sutura saggittale un pò dietro alla testa: sù le prime comparve una fessura nella carne, lunga due dita trasverse, senza che fusse l'osso scoperto: La piaga in tutto l' proseguimento si distese fino a 4. dita per leggiera corruttele che li sopravvenne, e sembrava in fine poco considerabile per tutte le sue circostanze. Cominciò frattanto a scoprirsi l'osso ver la metà della piaga, e di poi si avvidero d' una picciola buca per dove sù la Sutura rendevasi abbondante marciune, quali fusse ella l'apertura del Trapano. Di volta in volta lo scolo per qualche giorno si fermava, e ricominciava di poi. Quando era egli arrestato, l'Infermo soffriva 4. o 5. volte per giorno per un quarto d' ora grandi convulsioni nel braccio destro e nella mascella dell' istesso lato, quali cessavano assolutamente quando quello ritornava. L'osso scoperto felicissimamente si sfogliò e ricoprì di carne molto vermiglia, e rammarginossi intieramente l'apertura; donde avvenne che 46. giorni dopo di esser cessato lo scolo, ricominciaron le convulsioni delle stesse parti e del medesimo lato; la febre che non si era mai veduta, comparve, & infiammossi in maniera che ne portò via l'Infermo nel 51. giorno.

D 3

Dopo

Dopo sua morte, il Signor *Poupart*, che avea osservato il corso della malattia, esaminò il Cranio, e vi trovò una screpolatura tutta saldata, aperta più di una linea, e lunga più di un mezzo piede; la Dura Madre però non era nè infiammata, nè alterata, e perciò gli occhi dell' Infermo non furono attaccati da dolori, nè gonfi: Il globo sinistro del Cervello era tutto un ascesso, e 'l destro molto sano, come ancora tutto il Cervelletto. Son questi soggetti degni di molta riflessione: menagion periodica, convulsioni che sopravvenivano all'arresto di questa e che affliggevano 'l lato destro, quando l'ascesso del Cervello era nel lato sinistro, la metà del Cervello corrotta senza quasi febre, se non se negli ultimi giorni, e senza infiammamento della Dura Madre, rottura del Cranio lunga più di un mezzo piede, e malgrado tutto ciò 51 giorni di vita.

Il Signor *Poupart* istesso ha riferito che 'l Signor *Chirat di Mont-pellier* avea veduto parimente un Uomo con un picciolo ascesso nella parte destra del Cervello soffrir delle convulsioni nel lato sinistro. Queste osservazioni potrebbero agevolar la via per lo sistema de' moti che dal Cervello traggono l'origine; osservandosi da ciò che 'l principio e l'estremità di due differenti moti s'incrocicchiano.

XX.

A tal proposito il Signor *Poupart* riferì ancora di una Donna, a cui era convenuto togliere la metà del Cranio, del quale si serviva per ricever l'elemolina; e poicché ella avea la metà della Dura Madre scoperta, un giorno leggermente uno con la punta del dito glie la toccò, alzò ella un gran gri-

grido, e disse che l' avea fatte vedere mille candele .

XXI.

Il Signor *Littre* ha fatto vedere un Feto Umano mostroso che avea dietro della testa una spezie di beretta , come i Lacchè che si chiamano Dragoni o Volanti . Egli non avea altro che la base del Cranio , le sette vertebre del collo, che dovevano esser chiuse e formare un canale, erano aperte, e la grandezza dell' apertura scemava sempre da alto a basso . Il picciolo cappello , qual era Conico , sminuiva ancora per lo stesso verso , addattandosi sopra di quelle aperture , e con figura proporzionata ad esse le chiudeva molto esattamente .

Il Signor *Du Hamel* continua la sua Istoria Notomica , o la comparazione della Notomia antica con la moderna . Molte volte ha fatta parola del Cervello, e degli sforzi per lo più inutili finora per isvilupparne la struttura , e scoprirne precisamente le funzioni. Siccome delle due parti che compongono l' Uomo , la più sconosciuta è l' anima, così di tutte le parti del corpo, quella che s'appartiene più all' Anima, è la più oscura.



CHIMICA.

ANALISI DELLA IPECACUANA:

* **L**A Medicina moderna ha molti remedij sconosciuti agli Antichi, altrettanto 'infallibili, quanto mai possono i remedij essere. Di alcuni questi, come dell' Antimonio, e del Mercurio, si è fatto apparentemente uso con l' ajuto di preveniente e divinante raziocinio; e di altri, come della China China, e dell' *Ipecacuana*, per puro favore della natura; avendoli noi ricevuti immediatamente dalle sue proprie mani, o piuttosto da quelle di un Popolo selvaggio che di essi solamente avea cognizione.

Ma un tal dono bisogna che si renda più utile con quello ajuto intiero, che l' arte e la riflessione può somministrarli. Questo appunto è quel che ha fatto il Signor *Boulduc* sù l' *Ipecacuana*, rimedio che primo se li è parato inanzi nell' intrapresa da lui fatta di esaminar chimicamente tutti i purgativi. L' *Ipecacuana* è una radice che vien dal Brasile, molto profittevole per le dissenterie. Di que-

* Vedi le Mem. pag. 1. e 90.

questa ve ne ha tre forti, la bianca, qual'è la più debole, la bruna ch'è più violenta, e la grigia mezzana tra le due.

Travagliò egli alle prime sù la grigia. In distillandola non ricevè gran lume; ma per quell'analisi, che dicono di estrazione, ha veduto che questo misto contenea parti saline e sulfuree, o resinose, le saline in maggior quantità. Con dissolventi proprij ha divise queste due spezie differenti di principj, li salini con l'acqua piovana distillata; i sulfurei, o resinosi, con lo spirito di vino ben rettificato. E poicche parimente in tal composto i sali dominano molto sopra de' solfi, giudicò il Signor *Boulduc* che non sarebbe impossibile che i sali disciolti nell'acqua penetrassero i solfi, ovvero agevolassero all'acqua il discioglimento, e così l'acqua sola verrebbe ad imbeverli di tutti i principj attivi del misto, come l'esperienza poi lo confermò.

Il Signor *Boulduc* sperimentò sopra differenti Ammalati con necessarij provvedimenti questi estratti d' *Ipecacuana* grigia; uno contenente le parti saline, e l'altro le resinose, e fa di questi fedelmente l'istoria. Ha egli ancora fatta pruova della posatura, o de' fondigliuoli della radice, spogliata per mezzo dell'acqua e dello spirito di vino dalle sue parti saline e resinose, la quale non è affatto senza virtù.

Dall' esperienze del Signor *Boulduc* potrà mettersi in agguaglio l'effetto delle parti saline con quello delle parti resinose, se non si voglia attendere maggior numero d'esperienze, quali non sarebbero effettivamente inutili per un più sicuro paragone.

Ha egli ancora tenuto l'istesso metodo nella distillazione dell' *Ipecacuana* bianca e bruna.

La bruna ha molto minori parti saline e resinose

nose della grigia, e pure ella è più violenta nell'azione. Ecco appunto luoghi ove l'esperienza drizza, o piuttosto smentisce i ragionamenti più verisimili. Bisogna che nell'*Ipecacuana* non la quantità de' principj attivi, ma una certa dose faccia la forza.

L'*Ipecacuana* bianca ha molto minor resina della grigia, e ne' sali v'è poco divario tra di esse. Ha ella dunque molto poche parti resinose a proporzione delle saline, e poichè ella è la più debole delle tre, può crederfi che sua debolezza nasca, o dalla poca quantità delle parti resinose che contiene, o dal poco che ne ha riguardo alla quantità delle saline.

S U L A F O R Z A D E G L I A L C A L I

T E R R E I.

SE la forza dell'Acido stà tutta riposta nello sciogliere, quella dell'Alcali consiste, per così dire, ad esser solubile, e quanto più essi lo sono, più son' perfetti nel loro genere. Nell'Istoria dell'Anno precedente si è veduta la misura dal Signor *Homborg* fatta della forza degli Acidi, ora ne dà egli quella della forza degli Alcali. Nella Fisica sol ben si divide quello ch'è ridotto a misure precise, e l'arte di misurare è altrettanto più ingegnosa quanto che si adatta sopra cose che non sembrano capaci di misura.

II

* Vedi le Mem. pag. 76.

Il Signor *Homberg* difamina solamente gli Alkali terrei , quali appunto sono gli Occhi de' Gamberi, il Corallo , le Perle , i Gulci d'ostrica , il Bezuarro, la Calcina viva, il Corno di Cervo calcinato, &c. Di questi si fa più spesso uso nella Medicina, e perciò son essi più necessarj ad esser conosciuti. Ecco la maniera come il Signor *Homberg* ha guidate le sue ricerche .

Due sono i principali acidi , l'Acqua Regia fatta dallo spirito di sale che solve l'oro, e l'Acqua Forte fatta dallo spirito di Nitro ch'è solvente dell'argento .

Poicche il disegno del Signor *Homberg* era di conoscere le differenti ragioni di questi due acidi agli stessi Alkali terrei, convenivali avere i due spiriti acidi sì fatti che in una mole uguale tenessero essi un' ugal forza: Perciò egli ne trasse tutta la flemma dall'uno e dall'altro , sinattantoche nell'istessa mole avessero ugal peso, e sì e' ritrovò col suo novello Areometro che in tale stato erano essi più gravi dell'acqua di Fiume di ugal mole in una quintesima . Concluse egli dunque che la flemma, in cui nuotano i sali de' due spiriti , essendo d'un' istessa natura e d'un medesimo peso con l'Acqua di Fiume , questa quintesima parte di più che i spiriti pesavano , nasceva da' sali, e che perciò questi, donde gli spiriti son forti , avevano in tuttiedue un peso uguale .

Fatto ciò , egli separatamente unì a tutti gli Alkali Terrei un oncia di spirito di sale, e dopo un oncia di spirito di nitro, e vidde le differenti quantità di detti Alkali che bisognavano per impregnarsi, quanto era possibile, e satollarsi, o di un' oncia di spirito di sale, o di un'oncia di spirito di nitro .

Le differenti quantità di ciascun Alkali, necessario

farie per assorbire l'istessa quantità dell'uno o dell'altro acido ridotto ad ugual forza, son le misure della forza passiva di ciascun Alcali; e per rendere questa misura precisa in tutto, vi bisogna aggiugnere ancora il maggiore o minor tempo impiegato in ciascun Alcali per assorbire gli acidi.

Lo spirito di nitro ha sempre sciolta maggior quantità di ciascun Alcali che lo spirito di Sale: Forse perche i sali acidi, quali formano il sal comune, son più gravi, e perciò men penetranti de' sali acidi del nitro. Dà forza a questa conghiettura l'essere i sali acidi uguali di peso nell' oncia dello spirito di sale e nell' oncia dello spirito di nitro; & in conseguenza potrebbe ben essere, ch'essendo gli uni più grossolani, passassero in minor quantità tanto quanto gli altri, e producessero minor effetto per la loro minor quantità.

Il paragon delle forze degli Alcali differenti menò il Signor *Homborg* ad una nuova scoperta, contraria molto all' opinion comune. Avvisò egli che la Calcina spenta, tutto che spogliata di molti attivissimi principj creduti alcali volatili, sia intanto un Alcali così grande come la Calcina viva. Questi principj attivi dunque da lei perduti non sono Alcali; & e' immagina che non possano altra cosa questi essere che particelle ignite introdotte dal fuoco nella calcina.

Egli è vero che sù le prime la mente dura fatica ad immaginare, come dette particelle ignite si fissino e divengano immobili tra pori di un corpo; ma il Regolo d' Antimonio calcinato con lo Specchio ardente, pur egli cresce di peso, in cui non può suspicarsi che materia d' altro genere si tramischi, se non se quella che forma i raggi del Sole. Bisogna perciò confessare di essere questa ipotesi difficile
ugual-

ugualmente a riceverli e rigettarli:

Rende infine il Sig. *Hornberg* ragione con le sue sperienze perche la polvere de' gusci d'Ostrica sì profittevole riesca a rimettere lo stomaco guasto dagli acidi. Dà egli ancora il modo di prepararla, & a questi usi devon drizzarsi tutte le scoperte chimiche.

PARAGONE

DELLE ANALISI

Della Seta, del Sale Ammoniac, e del Corno di Cervo.

* **L**A composizione delle famose Goccie d'Inghilterra, di cui ancora si fa misterio, è nota solamente ad alcuni Inglesi che la nascondono alle altre Nazioni. Il Signor *Listar* però Celebre Medico di Londra, persuaso che questa gelosia della Nazione sia nimica al genere umano, ha svelato il Misterio al Signor *Tournefort*, che ora lo discopre al Pubblico. Le Goccie d'Inghilterra sono lo spirito volatile della Seta cruda, rettificato con l'olio di Cannella, o con alcun altro Olio essenziale.

Poiche il Sig. *Tournefort* ha per esperienza conosciuto che le dette Goccie siano di ugual valore con le preparate dal Corno di Cervo e dal Sale Ammoniac, fuorchè nell'odore, dà egli l'Analisi Chimica di tali materie, e la mette in agguaglio con quella della Seta cruda, perche sin da suo' principj possa dividersi cosa sian dette Goccie, e qual ragione abbiano con quelle della stessa specie. Questo divisa-

men-

2 Vedi lo Mem. pag. 34.

mento forse unito alla speranza farà perdere la gloria alle stesse di esser un Remedio unico .

S U

DE' FUOCHI SOTTERRANEI,
TERREMOTI, TUONI, &c.
SPIEGATI CHIMICAMENTE.

* **I**L mezzo migliore per ispiegar la Natura, se questo potesse tenerli sempre, sarebbe di contrattarla, riproducendo l'istessi effetti con quegli argomenti che sono in nostra conoscenza, e da noi si adoprassero: non si andrebbe allora divinando, ma cogli Occhi propri vedrebbe, e si rimarrebbe nella sicurezza che i Fenomeni, naturali dall'istesse cagioni, o da simiglianti almeno, si produrrebbero, come gli artificiali.

Così il Signor *Lemery* nella State ha fatta un Etna, o un Vesuvio, avendo nel terreno seppellito nella profondità di un piede 50. libre di una mescolanza di parti uguali di limatura di ferro e di solfo polverizzato ammassate con acqua. Tra lo spazio di 8. o 9. ore il terreno si gonfiò, screpolando in alcuni luoghi, pe'quali venivan fuori vapori solforosi e caldi, & indi ancora fiamme.

Egli è ben facile a comprendere che una maggior quantità di questa mescolanza di ferro e di solfo, in una più gran profondità di terreno posta, fusse appunto quello che mancherebbe per fare un

Mon-

* *Vedi le Memoire pag. 124.]*

Monte Etna veritiero; poicche allora i vapori solforosi, studiandosi a scappar fuori, avrebbero cagionato un Terremoto più o meno violento, secondo la lor forza, e gli ostacoli, che per cammino se li fossero parati d'avanti; qual rincontrato, & a viva forza, aperto avrebbe fatto slanciar essi con empito che verrebbe a cagionare un turbinio; e se detto cammino fusse per un terreno, cui soprastasse il Mare, innalzerebbero essi quelle colonne d'acqua che sono a' Vascelli sì formidabili; e se in fine detti vapori solforosi montassero sino alle nugole, introducendosi in esse, produrrebbero il tuono.

Non deve parere strano che tal solfo immerso, nelle acque delle nugole possa pur accendersi; poicche le materie solforose naturalmente non si mischiano con l'acqua, e le esse son molto esaltate, vi ardonno in quella, come ne' Fuochi Greci si avvisa. E vero però che una porzione di detto solfo vi si estingua, e ciò facciasi con fragore.

Per un altro verso, la parte, che arde nell'acqua, cerca a tutto potere disbrigarsene per elevarsi, e questo sforzo produce ancora un fragor violento. Con una sperienza nuova il Signor *Lemery* dimostra tutto ciò, facendo vedere che un vapor solforoso, qual s'innalza dal fondo d'un Matraccio, venendo acceso da una fiaccola che se li avvicini quando esce, la fiamma si comunica di più in più a tutto 'l vapore che riempie il vano del vaso, occupa il fondo, e v'ad appigliarsi in una materia solforosa che contiene l'acqua; & allora questa materia accesa in essa violentemente la scuote per disbrigarsene, e produce un picciolo colpo di tuono. Se la fiamma non penetra fin al fondo del Matraccio; ove nell'acqua stà la materia solforosa, il vapore infiammato, che non ha 'l contrasto dell'acqua, non produce fulminazione.

SU

S U L E
S O L U Z I O N I ,

E F O R M E N T A Z I O N I F R E D D E .

• **N** On recherebbe maraviglia che una semplice soluzione fusse fredda, cioè che l'acqua comune, per cagion d' esempio, in cui si metta il Sal marino, o l'Ammoniaco, o 'l Vetriuolo, &c. divenga più fredda con la mescolanza de' sali ch' ella discioglie; perciocche ben tosto si comprende, come questi sali di per loro privi di moto dividano quello che la fluidezza dà all' acqua, & in conseguenza lo scemino, tosto che sian interamente uniti a lei per la soluzione; & egli è fermo presso a' Fisici, che 'l calore sia un moto, e 'l freddo un cessamento o diminuzione di questo.

Nè parimente ci sorprenderebbe, malgrado un tal principio generale, che tutte le soluzioni non fossero fredde, come pur son quelle di tutti gli Alcali volatili nell' acqua comune, e che ve ne fossero delle calde, come quelle di tutti gli Alcali fissi. Potrebbe conghiettuarsi che addivenisse tal differenza dall' essere stati tutti gli Alcali fissi calcinati in un gran fuoco, da cui ne abbian tratte & imprigionate ne' loro pori le sue particelle infocate già sopra dette, che possono essere ammesse nella Fisica.

Egli però sorprende che dissoluzioni accoppiate con formentazioni, cioè, dove le materie sbo-
glien-

• *Vedi le Memorie pag. 135.*

glientano e si gonfiano , anche con fragore , fian
trattanto fredde, e faccian calare il Termometro che
vi s' immerge . Come può accordarsi raffreddamen-
to con moto sì notabilmente accresciuto , e sì vi-
sibile ?

Vi è di più . Da queste fermentazioni fredde
forgon talvolta vapori caldi , come quando si è mi-
schiato il Sale Ammoniaco con l'Olio di Vetriuolo,
se si tenga un Termometro immerso nella materia,
& un altro sù di questa cotanto elevato quanto so-
lamente senta il vapor che n' esce , si vede nell' istesso
tempo il primo prontissimamente per la freddezza
della fermentazione andar giù, e'l secondo montare
con ugual prestezza per lo calor del fumino che n'
esala .

Reca il Signor *Geoffroy* tutte le sperienze da lui
fatte per isquittinar fin fondo questa materia delle
fermentazioni fredde , e ne rende le ragioni Fisiche.
Non vi ha forse cosa sì bizzarra , e sì in apparenza
contradittoria, che non possano produrre le differen-
ti combinazioni de' moti , sempre però all' istesse
leggi sottoposte . Chi crederebbe che per rendere l'
acqua fredda ancor più fredda per alcuni momenti,
bisognasse gettarvi prontamente una gran quantità
di bracia accesa ? Nella Memoria del Signor *Geoffroy*
si vedrà il fatto, e la possibilità.



S O P R A

L' ACQUA DELLA CALCINA .

L' Antimonio e 'l Mercurio servono di bastante pruova che la Medicina nommai si ridurrebbe a perfezione, se non avesse ella l'ardimento di adoperar remedi, di cui gli Antichi non avean conoscenza alcuna, o il coraggio di metterli in uso.

L'Acqua di calcina ripiena, com'ella è, di particelle di fuoco, disecante, consuntiva, e caustica, dovea recare spavento a prendersi interiormente, e con molta ragione veniva riputata un Veneno; in questi ultimi tempi però il timore e la prevenzione si son dismessi, essendosi conosciuta dett'Acqua per remedio eccellente, & anche è divenuta familiare a' Popoli Settentrionali.

Non lasciò di ben istruirsi di ciò il Signor *Burzet* in un viaggio ch'è fece in Olanda, dove scoprì (giacche questo ancora è una spezie di misterio) la preparazione, e gli usi di tal remedio.

Poicche l'Acqua di calcina opera principalmente per mezzo d'una materia alcalina, terrestre, delicatissima, e propriissima ad assorbire gli acidi, convien'ella alle malattie da questi prodotte, cioè a quelle che addivengono da un sangue poco fluido, & in conseguenza da alcune ostruzioni.

L'uso di tal'Acqua riesce più profittevole agli Olandesi sottoposti più di noi a queste malattie per
l'acre

* Vedi le Memorie pag. 148.

l'aere grossolano ch' essi respirano, e per gli ordinarij loro alimenti ; ma poicche non rimangon di affliggerci molte malattie , quali si producono dagli acidi del sangue , tutta l' industria dee riporsi a render il remedio proporzionato a' temperamenti un pò differentise questo è appunto l'avviso del Signor *Burlet*, che con molta esattezza ci dà, aggiugnendovi un sincero racconto delle sue sperienze .

DE' SOLVENTI,
E SOLUZIONI
DEL MERCURIO.

* **Q**uantunque il Mercurio sia stato l'obbietto d' infinite ricerche , & i Chimici l'abbiano in mille guise tormentato per conoscerlo , sua natura però sinora è loro scappata via di mano , nè si è lasciata divisare sù di cose molto essenziali .

Ann' essi creduto ch' egli non potea da altri sciogliersi che dall'Acqua forte , quale ancora è solvente dell' Argento .

Si son persuasi ch' e' fusse d' una sostanza perfettamente omogenea , o che per lo meno Parte non sapesse tirar dal Mercurio altro che Mercurio .

Il Signor *Homborg* per lungo ordine di sperienze ha conosciuto l' errore di queste due opinioni .

1. Ha ritrovato che 'l Mercurio dopo certa preparazione si discioglie nell' Acqua regia più prontamente che nell' Acqua forte; e se egli non si prepari,

E 2

cho

* *Vedi le Memorie pag. 229.*

che pur l'Acqua Regia no'l lasci di solverlo, abben-
che nel molto lungo tempo di cinque Mesi. Ond' è
che 'l Mercurio deve esser posto nell' istesso ordine
del Ferro e del Rame, che così dall' una come dall'
altr' Acqua vengon disciolti.

2. Ritrasse egli dal Mercurio con lunghissima e
penosissima operazione una polvere, o terra grigia
e leggiera. Egli è vero che per aver tal polvere mi-
schid col Mercurio differenti materie; dimostra però
ch' ella senza verun dubbio si produca dal sol Mer-
curio, essendo talmente fissa che a violentissimo fuo-
co non si fonde, se non se riducendosi in vetro: Ella
non si mischia con metallo alcuno, e se con questi
sia fonduta, ella divien vetro, e sovrannota, senza ren-
derlo frangibile; qualità tutte differentissime da
quelle del Mercurio, quali sono l' essere estraamente
volatile, il facilmente attaccarsi alla superficie di
tutt' i metalli, trattone il ferro, e mischiandosi con
essi renderli frangibili. Da tre libre di Mercurio
egli ebbe tre dramme e mezza di detta polvere; e
quando si sentirà la maniera di ritrarla, niuno sarà
sorpreso ch' ella sì lungo tempo siasi imbolata dalla
conoscenza de' Chimici.



S O P R A

L'OLJ DELLE PIANTE.

• **N** El fin della distillazione rendon le Piante un Olio fetido, o putente; le Piante Aromatiche però dan di più un Olio, che monta dopo la flemma, e sù'l principio della distillazione: Lo dicono Essenziale, come quello che conserva l'odor della pianta; quando che l'Olio fetido, tuttocchè d' una Pianta Aromatica, ave un odor insoffribile.

Avendo osservato il Signor *Homborg* che tutti due questi Olj rendevansi più o meno abbondevolmente, secondo le differenti maniere di operare, s' avvisò che vi fosse alcun modo d' accrescerne la quantità, che quì cerca.

Fece e' riflessione che le Piante, quali dan più dell'acido, rendan parimente più Olio; dond' e' conchiuse che l'acido potrebbe agevolare a disbrigare l'Olio dal Misto, e ad elevarlo nella distillazione.

Fece egli alcune Mixture artificiali, composte d' Olio fetido di pianta molto denso, di Spirito acido, e di sabbia, e sù le distillò.

Quelle in cui era entrato lo Spirito acido vegetabile, come di Aceto distillato, renderono il loro Olio affatto simile all'adoprato, quanto alla consistenza; ma l'Olio che venne fuori da' Misti, ove s'era posto lo Spirito acido minerale, come quello del Sale, era un certo Olio molto più chiaro e più sciolto; donde credè il Signor *Homborg*,

E 3

, che

• Vedi le Memorie pag. 247.

che gli acidi minerali aveſſero maggior forza de've-
getabili ſù l' Olio delle Piantè , ſciogliendolo, ſtem-
perandolo, e riducendolo in guiſa ch' e' più facil-
mente poteſſe elevarſi in maggior quantità con l'
azione del fuoco .

• L'esperienza perfettamente corriſponde a que-
ſta idea. I Profumieri duran molta fatica a ricavar
l' Olio eſſenziale dalle Roſe, non avendone altro che
un' oncia da 100. libre di detto fiore . Il Signor
Homborg guidato da ſuo' principj ha ritrovata l'
arte di far creſcere d' un terzo queſt' Olio sì prezio-
ſo . Vuol'egli che prima di diſtillar le Roſe ſ'infon-
dano per 15. giorni nell' acqua inagrita dallo Spi-
rito di Vetriuolo : Queſt' acido minerale por-
ge , per coſì dire , le ale a dett' Olio, e fa levarlo ſù
più copioſamente. Coſì i Filici minutamente ſpian-
do la natura, ſe ne rendono in alcun modo padroni,
e la fan ſoggiacere a' loro diſegni.

Dà il Signor *Homborg* nell' iſteſſo tempo la fi-
gura de' vali, di cui ſogliono ſervirſi i Profumieri
per diſtillar l'Acqua roſa, e non perdere picciola
ſtilla del poco Olio che ne ritraggono. Fann'eſſi mi-
ſterio di queſta invenzione, meritandolo per altro, ma
ſempre egli è migliore che ſia conta al Pubblico .



S O P R A
L' A C I D O
D E L L' A N T I M O N I O.

• **U**N dotto Inglese sorpreso di leggere nell'*Istoria dell' Accademia* scritta dal Sig. *Du Hamel*, che l'fù *Sig. Charas* avea un modo di estrarre un liquor acido dall' Antimonio, avendone dimandato per lettere il detto *Sig. Du Hamel* per informarsi di questa spezie di Paradosso Chimico, questa materia fù trattata nell' Accademia, e l' *Sig. Homberg* recò le sue osservazioni, & i suoi pensamenti.

In genere, vi son molti Minerali, da' quali non è sì facile di ritrarne principio alcuno, essendo questi molto ben mischiati, e la tessitura molto stretta e ferma. Intorno al liquor acido che sembrava rendersi dall' Antimonio, si v'è errato, non dandone esso nè punto nè poco quando è ben puro, e producendosi quello da una terra argillosa, da cui non è mai scompagnato.

Non è frattanto che l' Antimonio scevero da detta terra argillosa non renda un poco di acido per mezzo di un' operazione difficilissima, e sì delicata che l' evento dipende dal tempo; ma quest' acido altro non è che quello del di lui solfo acceso, e tutto simile al solfo comune, di cui l' Antimonio abbonda: Il *Signor Homberg* ha ritrovato che suoi effetti, e quelli dello Spirito Acido del solfo comune, era-

E 4

no.

• Vedi le Memorie pag. 26a.

no perfettamente. I' istessi . Così non è la parte metallica dell' Antimonio che rende l' acido , ma quel solfo ch' entra nella composizione di tal minerale: Svanisce perciò la maraviglia .

D I V E R S E
O S S E R V A Z I O N I
C H I M I C H E .

I.

IN *Clermont* nell' *Auvergne* vi è un Fonte che im-
pietra, e 'l Signor *Lemery* disaminò alcuni fia-
schi delle di lui acque donatili dal Signor *Tourne-
fort* . E' questa chiara come quella d' *Arcueil* , &
ugualmente greve , e depone nel fondo de' fiaschi
un poco di sabbia grigia, & alcune pietre bianchic-
cie che sembravano esservi formate . Da' saggi che
se ne son fatti, e dalle operazioni Chimiche, si ravvi-
sa in lei un certo acido , quale facilmente ha potuto
solvere alcuna sostanza pietrosa de' luoghi, per ove
ella è scorsa . La parte più greve di detta sostanza si
depone nel fondo dell' acqua , quando ella è intrat-
tenuta ne' vasi , o mentre il moto suo è minore ; la
parte più leggiera però non se ne distacca così facil-
mente, e questa è appunto quella che pietrifica le so-
stanze . Ella non è dannosa a bersi riguardo alle pie-
tre che possan formarli nelle Reni, poicché si sà per
cotidiana sperienza de' *Præfari* , e per le Operazioni
Chimiche fatte dal Signor *Lemery* , che 'l Sal dell'
origina impedisca a deporli la sostanza pietrosa di
dett'.

dett' acqua . In fatti le Pietre , e quelle che diconfi Pietre nel corpo umano , non an cosa di comune .

II.

Un Uomo, a cui il Signor *Burlet* avea ordinate le Acque minérali d' *Aix la Chapelle* , fù sorpreso al vedere che nel finir di tre giorni , ne' quali egli le avea bevute in una istessa Tazza d' Argento , ritrovò questa dorata ugualmente come l' avrebbe fatta un Orefice . Sù di ciò disse il Sig. *Homborg* che tale indoratura faceasi da solfi di dette Acque , e 'l Signor *Du Hamel*, che lungamente si era trattenuto in detto Paese, lo confermò, riferendo che le cennate Acque son fermamente solforosissime, e ch'egli stesso vi avea ritrovato de' pezzetti di solfo galleggianti , e che ne' contorni d' *Aix* vi erano quantità di miniere di *Pietra Cadmia* , o *Calaminare* . Aggiunse il Signor *Taury* che 'l marciume , che viene dagli Ascessi del petto, indori l' istrumenti de' Cerufici .

III.

Il Signor *Geoffroy* ha comunicate alcune Osservazioni sù le acque di *Bourbonne* e di *Plombières* fatte ivi dal Signor suo Padre , che per cagion di sua salute era passato in detti luoghi. Noi ne recheremo quì le principali .

Ritrovafi in *Bourbonne* una sorgente d' acqua chiarissima e senza mal gusto , ma solamente molto falsa , quale ha nel fondo un limo assai nero e di molto mal sentore. Gli orli del Bacino sono giallicci, e qualche vi si attacca non vi s'indura, e sente un poco del solfo ; l' acqua è sì calda che non vi si può
per

per lungo tempo tener la mano senza scottarsi, i volatili vi si spiumano, e le uova si cuocono perfettamente, le Foglie dell' Acetosa considerabilmente vi vengono alterate, e pur si beve senza scottatura. Nel mattino sulla superficie dell' acqua si osservano delle Iridi, poco arrossa colla soluzione del Girasole, e non fa cambiamento alcuno col solimato corrosivo, colla galla, coll'acqua di calcina, e col vetriuolo. Mischiata col sal di Tartaro si congela.

Le acque di *Plombieres* non vengono alterate da tutto ciò che non altera quelle di *Bourbonne*, anzi neppure dal sal di Tartaro.

In *Plombieres* vi sono delle sorgenti d' acque fredde, che dan del sapone, e vi si ritrovano pietre che a questo simigliano, ed altre, che ridotte in polvere e buttate su de' carboni accesi, ardono come il solfo senza averne l' odore. Dette acque son profittevoli molto al Fegato, locche non si ha dalle altre sorgenti calde o fredde. I Cappuccini di *Plombieres* nel loro Giardino anno una picciola fontana tiepida, donde raccolgono delle scagliuole d' oro o dorate.

IV.

Essendo lo Scorbuto reso in Francia più comune di quel che non era, il Figlio del Signor *Lemery* ne ha fatta la descrizione, e date differenti distillazioni della Coclearia valoroso remedio per questa malattia. I spiriti di detta pianta sono ancora buoni per i mali della milza, per la melanconia, per le scrofole, e per l' icterizia. Può avvalorarsi la virtù di essi con l'aggiunta del Sal volatile Ammoniaco, che li rende più alcalini e più penetranti.

Il Signor *Lenzery* in quest'Anno ha continuato il suo gran Trattato dell'Antimonio, e nell'Assemblea ha dimostrato varie sperienze che recherà nel suo Libro.

BOTANICA.

su 'L

PERPENDICOLO DE' TRONCHI DELLE PIANTE RIGUARDO ALL' ORIZZONTE.

IN materia di Fisica non può farsi a meno di ripeter sovente, che gli obbietti i più comuni si cambiano in altrettanti miracoli, qualora per certo verso son riguardati.

Che i Tronchi di tutte le Piante sian perpendicolari all' Orizzonte, non reca maraviglia, nè vi si pone mente; poichè sembra che ciò altrimenti non possa avvenire. Frattanto se taluno sia molto Fisico, e sappia qualche una Planta sia, e come ella si formi, incomincia a veder questo fatto maraviglioso, e quindi

Vedi la Mens. pag. 59.

■ *Rupire* , come il Signor *Dodart* ha sperimentato .

Ciascun seme contiene una picciola Pianta tutta formata , qual non deve altro fare che svilupparsi. Hà ella sua picciola radice, e la polpa, o carne del seme, divisa per ordinario in due globi , è il fondo del primo nutrimento che la Piantuccia sugge con la sua radice fin da quando comincia a germogliare .

Se un seme entro 'l terreno fusse piantato in maniera che la radice della picciola Pianta, qual'egli rinchiude, fusse rivolta in giù , e'l gambo in sù perpendicolarmente, facilmente comprenderebbesi che in isviluppandosi detta Pianta , la sua radice e'l suo gambo altro non farebbero che seguir le direzioni che tenevano , e quindi tutti i gambi senza veruna difficoltà farebbero perpendicolari all'Orizzonte .

Ma i semi , o che di per se cadano, ch'è più comune , o che siano per mano dell' Uomo seminati, devono al caso ogni loro positura ; e tra un infinito numero di situazioni , che possono prendere in riguardo al gambo della lor picciola Pianta , quella, in cui sarebbe detto gambo allogato perpendicolarmente in sù , è unica , & in conseguenza molto rara. Può ancora spesso avvenire che sia egli posto perpendicolarmente in giù , e molto più spesso che abbia altre situazioni mezzane , sempre però molto differenti da quella che li starebbe meglio e più acconcia .

Egli è dunque necessario in tutti questi casi, quando il gambo della Piantuccia è rivolto in giù, ch' e' si raddrizzi per tener la superficie superiore della terra . Qual forza però lo raddrizza, che fermamente dee farlo con violenza ?

E' forse perche ha detto gambo minor terreno a' forare per la parte di sopra, e naturalmente ver là si drizza, ove ritrova minor ostacolo?

Dunque conoscerebbe egli di aver terreno minore a rompere in sù, quantunque infino a tanto che sia giunto alla superficie della terra non possa sentir egli questa ineguaglianza di ostacolo.

E se il picciolo gambo si raddrizza perche ha minor terreno a forare, con maggior ragione la picciola radice, che allora è rivolta in sù, seguirebbe ella sua direzion naturale; locche però non fa la radice, anzi per lo contrario questa si profonda tanto, quanto il gambo si raddrizza.

E' convenuto perciò al *Signor Dodart* di ricorrere ad altro spiegamento di queste due sì differenti azioni.

Suppone egli che le fibre del gambo sian di tal natura, che al calor del Sole si accortino, & all'umido della Terra si dilunghino; & allo'ncontro quelle delle radici con l'umido della Terra si scortino, e col calor del Sole si distendano.

Secondo questa ipotesi, qualora la Piantuccia è rivolta, e che in conseguenza la sua radice sia in sù, le fibre dell'istessa barba, che forma un de' rami della radice, non sono ugualmente esposte all'umidità della terra, essendovi quelle che riguardano in giù, o le inferiori, maggiormente esposte delle superiori. Queste inferiori fibre dunque devono più raccortarsi, e tal raccorcimento viene ancora agevolato dall'allungamento delle superiori, sù le quali il Sole ha maggior forza: Per conseguenza questo ramo intiero di radice si profonda ver la terra, e poicche non vi è cosa sì delicata quanto una radice nascente, non incontra difficoltà ad insinuarsi ne' pori d'un terreno tutto che molto sodo, tanto più ch'ella può rivolgerli

gerfi per tutti versi ad incontrar i pori che si accostano più alla perpendicolare.

Rivolgendo tal' idea, il *Signor Dodart* spiega perche allo 'ncontro il gambo si raddrizzi.

In una parola, può immaginarsi che 'l terreno tragga a se la radice, e che 'l Sole contibruisca a ciò; allo 'ncontro tira il Sole a se il gambo, e la Terra in qualche maniera l' agevola ad andar verso lui.

Perciò quasi che tutti i gambi nascono piegati sotterra, e frattanto n' escono dritti.

Le Piante, che trasversalmente e con una direzione Orizzontale forano un suolo erto come un Muro, si raddrizzano tosto che senton l'aere, e si adattano di poi contra 'l suolo donde sono uscite: tanto le piante costantemente si studiano di esser perpendicolari all'Orizzonte. Così vediam fare alla *Parietaria*, all' *Antirrino*, alla *Matricaria*, &c; se frattanto nell' uscir dal Muro il di loro gambo non sia ben fermo, il peso fa che ver la terra calino curvandosi; ma indi a poco, malgrado del peso divenuto maggiore, si rialzano, e fanno una seconda piegatura, per adattarsi e mettersi contra 'l muro.

E' sembrerebbe che in queste Piante, quali escono Orizzontali dal muro, e poi divengono verticali, molto si ravvivi l'azione del Sole. Egli è quello che accorta le fibre a lui rivolte, e fa rivivere in sù la Pianta, e se talvolta non cagiona tali impressioni sù di essa in uscendo all' aere, ciò avviene perche allora le fibre sono ancora molto acquazose, molli, e poco capaci di sufficiente contrazione.

Lo stesso chiaramente avviene a tutti rami per i medesimi principj; perciocche nascendo essi dal tronco quasi trasversalmente, si raddrizzano per lo meno verso l' estremità, e presentano così i loro
fiori

fiori e le frutta al sugo dell' aere in una situazione più propria a ben ticeverlo.

Non v'è cosa che meglio pruovi come le Piantes si ostinino, per così dire, alla perpendicolare, quanto qualche il *Signor Dodart* osservò un giorno nel calare da *Mendon* a *Chaville*. Avendo una tempesta abbattuti molti giovani Pini sopra 'l pendio, quali in differenti luoghi erano differentemente inchinati all'Orizzonte, tutte le sommità di detti Alberi si erano rilevate in maniera che intiere erano perpendicolari all' Orizzonte, facendo in conseguenza differenti angoli con la linea de' loro tronchi, secondo che quelli eran distesi sù de' piani più o menò inchinati.

Questa disposizione sì geometrica ne sorprende; frattanto egli è molto naturale che il raddrizzamento termini nella perpendicolare, perciocchè allora il Sole, & altre cagioni estrinseche ancora, operano ugualmente per tutti, versì sù la Pianta.

Dà' principj del *Sig. Dodart* e' sembra che gli Alberi dovrebbero esser più inchinati ver Mezzo giorno, poicche 'l Sole per questo verso fa maggiori azioni, che ver Settentrione; Questa ineguaglianza però d' azione riparasi dal corso del sugo, quale sempre si dirige a scorrere per la perpendicolare, e con ciò rimette l' Albero.



S U

LA FECONDITÀ

DELLE PIANTE.

* **L**A fecondità della Piante non solamente naturale di quelle che si lasciano a lor bell'agio, ma ancora artificiale procurata per mezzo del taglio o delle potature di alcuna delle loro parti, è una maraviglia troppo esposta agli occhi di tutti, e poco avvertita. Detta fecondità artificiale nel fondo è pur naturale, perciocche l'arte del Giardiniero non dà in fine alle Piante qualche esse non avevano, ma solo porge loro ajuto a sviluppare e produrre ciò che contenevano. Il Signor *Dodart* esaminando tal materia, non ancora ne dà alcun Sistema fisico, ma raccorda i fatti; bisogna però, per istabilir questi, ragionamento e calcolo, perciocche non tanto si fa quistione di qualche una Pianta dia, quanto di qualche ella renderebbe, se producesse tutto ciò ch' ella contiene. Ecco un esempio della fecondità d' un Albero riguardo a' soli semi, che son gli ultimi termini, e l'obbietto di tutte le produzioni di esso.

E' si sa, che tutt' i rami dell' Olmo non sono altro che mazzocchi di semi premuti estremamente l'un contro l'altro. Avendo il Signor *Dodart* preso a caso un' Olmo di 6 dita di diametro, e 29 pie-

* Vedi le Mem. pag. 165.

piedi alto fino al principio de' suo' rami , qual potea essere di 12. Anni , con un' falcetto sè troncava un ramo 8. piedi lungo , e non curando i semi caduti per la forza de' colpi raddoppiati , e per la caduta istessa del ramo , sè contare que' che vi eran rimasti .

Su di questo ramo si ritrovarono 16450. semi.

Su di un Olmo di 6. dita di diametro , vi son più di 10. rami di 8. piedi ; supposto però che non vi sian altri che questi 10. , i semi in essi ascendevano a

164500.

Tutt' i rami, che non son di 8. piedi, presi insieme fanno una superficie maggiore della doppia superficie di 10. rami di 8. piedi. Ma facendola doppia , perciocchè puol essere che questi rami minori sian meno fecondi, i semi dunque di tutt' i rami presi insieme ascendono a

329000.

Un Olmo facilmente può vivere 100. Anni , e l'età in cui ha egli la sua fecondità mezzana non è certamente quella di 12. Anni . Può dunque farli conto per un' Anno di fecondità mezzana, che i semi forpassino i 329000. ; a questo num. non vi aggiungeremo altro che 1000. (ch' è ben poco) e faremo 330000. semi . Bisogna però moltiplicare questi 330000. per 100. Anni ch' è la vita dell' Olmo . Sarran dunque essi 33 milioni i Semi che un' Olmo produce in tutta la sua vita , ristriggendoci sempre al minor conto ; e pure questi 33 milioni son venuti da un solo seme . Non è questa però tutta la fecondità naturale contenuta nell' Albero .

Se fusse scapezzato, rigermoglierebbe egli dal suo tronco con altrettanti rami quanti prima ne avea nel suo stato naturale, e questi nuovi getti pullulerebbero tra lo spazio di circa 6. linee di altezza

d/for. 1700.

E

nell'

nell'estremità del tronco scapezzato.

In qualunque parte, & in qualunque altezza e' fusse scapezzato, sempre avrebbe riprodotti ugualmente gli stessi rami, locche si avvisa costantemente negli Alberi pani tagliati quasi che rasente la terra.

Tutto 'l tronco dalla terra sino al luogo donde escono i rami è dunque pieno intieramente di principj, o di picciole Embrioni di rami, quali invero non possono mai venir fuori tutti in una fiata, ma essendo concepiti come divisi in piccioli anelli circolari dell' altezza di 6 linee, formano altrettanti anelli, ciascun de' quali in particolare è pronto a comparire, e 'n fatti comparirà tosto che il taglio sarà fatto precisamente sopra di lui.

Tutti questi rami invisibili e nascosti esistono ugualmente che que' che si vedono; e se essi germogliassero, avrebbero un ugual numero di Semi, quali in conseguenza bisogna che in fatti contengano in ristretto.

Proseguendo dunque il proposto esempio, sono nell' Olmo altrettanti 33000000 di semi, quante 6. linee son contenute nell' altezza di 20. piedi, cioè 15840000000. Semi; se quest' Albero attualmente contiene in se stesso cosa donde si moltiplichì, e si riproduca in un numero di volte cotanto sorprendente. Si smarrisce l'Immaginazione nel vederli guidata sin là dalla Ragione.

Che farà ella, se si venga a pensare, che ciascun seme d'un Albero contiene un secondo Albero che tiene ugual numero di Semi; che non può mai giungersi nè ad un Seme che non contenga più Alberi, nè ad un' Albero che contenga più semi, o che ne contenga meno che 'l precedente; e che in conseguenza si faccia una progression geometrica.

trica crescente, il di cui primo termino è 1., il secondo 15840000000., il terzo è il Quadrato di 15840000000., il quarto è un Cubo di detto numero, e così all' infinito? La Ragione e l'Immaginazione ugualmente si smarriscono e nabissano in questo immenso calcolo, ch' è in certo modo più che immenso.

Si vedrà che 'l Signor *Dodart* per non affettare il maraviglioso, o forse più ingegnosamente affettandolo, sù di alcuni articoli ha valutata la fecondità col tenerli sempre al meno, quantunque tal differenza poco monta. Un calcolo che sarebbe a tutto rigore molto grande per l'Olmo, sarebbe assai minore nella Felce, seconda incomparabilmente più di Semi; & in fine per molto che si vada con risparmio, sempre si giugnerà a numeri prodigiosi, & a' portentosi della Fisica.

S U

L E P I A N T E

M A R I T T I M E.

SE il Mare ha suoi Animali affatto differenti da que' della Terra costrutti in alcun modo su di altri principj, e su di altre idee meccaniche, ha egli ancora le sue Piante nella maggior parte differenti da quelle che la Terra produce, le quali son riconosciute per Piante da' soli occhi della Fisica. Il Corallo, per cagion di esempio,

F 2

non

• Vedi le Mem. pag. 35.

non è stato mai riputato per una d'esse, le Spugne non ne anno la simiglianza, e molte altre Piante marittime più tosto an la forma di Pietre. Sicche la Botanica del Mare niente quasi ha di comune con quella della Terra.

Il Sig. de *Tournefort*, che molto istruito della Botanica terrestre non ha per colmo di sua cognizione trascurata ancor quella, osserva che le Piante, quali nascono nel fondo del Mare, non anno per lo più radici, o almeno che le parti, quali fanno la funziòn di esse, non ne tengono la figura. Si attaccano dette Piante ad alcun corpo sodo, e l'aggavignano con certa spezie di piastrette pulitissime, che non menano fibre da loro; & allo 'ncontrò il corpo che sostiene dette Piante, essendo per lo più scoglio ovvero selce, non sembra proprio a nutricarle; bisogna dunque che in alcuna maniera loro particolare si alimentino, e che per i pori della superficie esteriore di dette piastrucce si ricevano un sugo, che loro può somministrare il denso limo & olioso del fondo del Mare; Cosa più singolare ancora ella è, che nella maggior parte delle spezie di esse non si osservano semi, durandosi ben molta fatica ad immaginare ove potrebbero essi nascondersi, principalmente nelle Piante pietrose, come sono i Coralli, & i Fonghi marini, quali an simiglianza piuttosto di vere Pietre che di Piante, la di cui durissima e molto uniforme sostanza non par che permetta, nè che si formino semi nel dentro di esse, nè che n'escano per seminarli. Frattanto sono esse corpi organizzati, e sì costantemente disposti, che la lor generazione deve essere l'istessa che quella di tutti gli altri corpi simiglianti.

Questa legge d'uniformità è sì necessaria, e sì inviolabilmente osservata dalla Natura, che non v'ha

v'ha cosa più legittima a supporfi per rinvenire i semi nelle Pianta marittime . Se talvolta si vede gemere dall' estremità de' rami de' Coralli una spezie di latte acre e vischioso, possiam credere che questo cada nel fondo del Mare senza mescolarsi con le sue acque , e seco porti un seme finissimo e delicatissimo ch' e' contiene, e che per mezzo di detto liquore s'incolli nel primo corpo sodo che incontra . Così il Signor *Tournefort* ha dimostrato all' Accademia Coralli di tutte età, cominciando da una picciola punta rossa quasi ch' impercettibile, sino all' ultima loro grandezza, appiccati su di Conche o di Selci, sopra le quali essi avean vegetato.

La conghiettura che propone il Sig. *de Tournefort* su la generazione de' Coralli puole adattarsi a tutte le altre Pianta pietrose marittime , e credo egli ancora che alle vere Pietre si convenga . An queste una struttura organica e costante , come lo dimostrano le loro vene , le quali rendon esse più facili a tagliarsi per un certo verso . Potrebbero ancora in limigliante guisa esser formate da una materia liquida , e 'l Signor *de Tournefort* ha recate all' Accademia delle Pietre focaje , e pezzetti di Matita formate nelle Chiocciolae , la di cui apertura era stata sempre picciolissima , per dove in conseguenza dette Pietre non avean potuto assolutamente entrare se non se in forma di liquore, dopo di che si erano indurite , e forse vegetate . Dea rimettersi al tempo & alla sperienza il render questa idea più matura , quantunque abbia la Natura per costume di seguir quell' istituto che una volta ha preso ; e poicche vi sonò delle Pianta pietrose, egli può ammetterfi in Filica che le Pietre possano essere Pianta.

DIVERSE
OSSERVAZIONI
BOTANICHE.

I.

* **P**ifone, primiero Autore che abbia parlato dell' Ipecacuana, ne conosceva solamente due sorti, la bianca, e la bruna, la prima delle quali avea minor vigore della seconda. Pà egli menzione ancora della Caa-apia, ch' è un' altra Pianta del Brasile, qual e' dice che quasi produca l'istessi effetti dell' Ipecacuana con minor violenza, donde alcuni mossi fuor di proposito la confondano con questa; e che que' del Brasile se ne servano per gli stessi uli, per le ferite delle frecce venenate, e per le morcicature de' Serpenti. Oltre all' Ipecacuana bianca e bruna di *Pifone*, conosciam noi la grigia, o se mai abbia egli detta bianca quella che noi chiamiam grigia, locche è facile, conosciam la bianca, che non era in sua conoscenza. Per ischivar la confusione delle differenti sorti d' Ipecacuana con la Caa-apia, il Signor *de la Hire* dà quì le Figure di queste Pianta, come appunto *Pifone* l'ha conosciute, e delle radici delle tre Ipecacuane, così come noi le sappiamo; e 'l Signor *Geoffroy* fa la descrizione della Caa-apia.

II.

• Vedi le Memorie pag. 163.

II.

Il Signor *Renaune* ha ritrovata in *Bérri* una nuova specie di Noce non ancora conosciuta da' Botanici. Egli la chiama, *Nux juglans folio eleganter dissecto*, ovvero *Acanthi folio*.

Il Signor *Marcband*, come suole, ha fatte molte Descrizioni di Piante, quall' e' riferba per un' Opera particolare.

In quest' Anno il Signor *de Tournefort* ha dato al Pubblico le sue *Institutiones Rei Herbariae* impresse in tre volumi in quarto nel *Louvre*, traduzione molto accresciuta de' suo' *Elementi di Botanica* pubblicati in Franzele nel 1694.

La cognizion delle Piante sempre è stata in tutti Secoli, e presso tutte le Nazioni tenuta in conto, essendo comunemente gli Uomini molto persuasi che ne' Semplici si contenga quasi che tutta la Medicina; e siccome la Natura a certi Animali ha dato l'istinto che loro fa scuoprire in alcune Piante i remedj di cui an bisogno, così sembra che abbia data agli Uomini una inchinazione per le Piante in generale, & un' estrema fidanza per que' remedj che indi si traggono. Ha però ella lasciato alla nostra Ragione lo scuoprimento dell'utile di ciascheduna Pianta in particolare; ond' è che la Ragione dura molta fatica ad uguagliarsi all' istinto di alcuni Animali.

Le Opere di *Teofrasto*, di *Dioscoride*, di *Plinio*, e di *Galeno* fan ben vedere che gli Antichi abbiano avuta qualche cognizione delle Piante, quantunque

ristretta e molto superfiziale. *Dioscoride*, che più particolarmente vi si è applicato, e si è reso celebre su di tal materia, appena ha fatto parola di circa 600. Piante, descrivendole in maniera, che sovente è difficile, e talvolta impossibile a riconoscerle.

I secoli appresso non aggiunsero cosa alcuna alla Botanica; la quale in fine con le Scienze tutte s'ecclisò, nè ricomparvero se non se nel xv. secolo, quando non si attese ad altro che ad intendere gli Antichi per tirarne lumi sì lungamente sepolti: I Botanici facean ricerca delle Piante ne' Libri Greci e Latini, e *Mattiolo* celebre Interprete di *Dioscoride* non si studiava a comparar le Piante prodotte dalla Natura con le Descrizioni del suo Autore, ma su di dette Descrizioni immaginava Piante che la Natura avrebbe dovuto produrre, o che a torto non avea prodotto.

Non era possibile che la Ragione non ritornasse nel Mondo dopo le Scienze; quindi fù che si diedero a studiar la Natura così bene come i Libri, & a cercare per le Campagne le Piante, perlocche la Botanica si rese più ampia, e crebbe di giorno in giorno.

Ma per un' altro verso questa immensa quantità di Piante affatto differenti le une dalle altre cominciò ad opprimere i Botanici. Qual memoria mai poteva esser sufficiente per tanti nomi? o ad apparare tutt' i novelli che bisognavano?

Si studiaron perciò i Botanici ad inventare un Metodo che li sollevasse; ma bisogna confessare che pochi vi si diedero a pensarlo, o ben tardi, e che alcuni altri contrastarono o la possibilità o l' utile di tal Metodo: cotanto egli è proprio che i progressi delle Scienze sian lenti e contrastati dagli stessi Savj.

Il solo Metodo, che o immaginare o desiderar si potesse, consisterebbe nel distribuire, sotto certi generi tutte le Piante conosciute in maniera, che il conoscimento di ciascun genere contenesse in ristretto quello di tutte le Piante ch'è comprenderebbe; e che nell'istesso tempo tutte, per quanto fusse possibile, tenessero un'istesso nome comune a tutto'l genere, per cui si risparmiasse un molto gran numero di particolari nomi differenti. Questo appunto è quello che l'uso comune di per se ha fatto su de' Ranunculi, per cagion di esempio, ma la difficoltà è maggiore su d'infinite altre Piante, le di cui differenti spezie non così facilmente presentano agli occhi, quelle che ann' esse di comune, e ciò che può servire per istabilire il loro genere.

Per conservare nel Sistema delle Piante l'uniformità sì necessaria ad ogni Metodo, bisogna che l'istessa idea regni nello stabilimento di differenti generi, e che quelli sian dedotti dall'istessi principj. Una Pianta, secondo la diffinizione del Sig. *Tournefort*, è un Corpo organizzato che ha sempre una Radice, sempre verisimilmente un Frutto o Seme, quasi che sempre un Gambo, Foglia, e Fiori. Ecco cinque parti o essenziali ovvero ordinarie alle Piante. Egli è chiaro che la somiglianza tra alcune di queste parti formerà i generi, ma ella deve esser sempre tra le stesse parti, e la quistion si aggira a sapere quali di esse debban preferirsi alle altre.

Dopo molti ragionamenti, che siam costretti a passar sotto silenzio perche noti al Pubblico, il Signor *De Tournefort* si appigliò a' Fiori & a' Frutti presi insieme.

Gesnero e *Colonna*, due addestratissimi Botanici, ann'avuta l'istessa idea, poicche l'intenzion della Natura guida noi a riguardare queste parti come
prin.

principali ; giacche tutta la Pianta e tutto l'apparato de' suo'Organi , maggiore senz'alcun paragone di quel che comunemente s'immagina , non sembrano fatti con altra mira che per la produzione del Seme,o, ch'è lo stesso, del Frutto,il quale altro non è che l'inviluppo e 'l nutrimento del seme ; e per quel che si attiene al Fiore , egli non vien ad altro destinato, che a dare per alcun tempo molto breve al nascente frutto più dilicato un nutrimento più ben preparato, e più convenevole di quello che suggeriva dalle foglia .

Tutte le Piante , i di cui fiori e frutta avranno l'istessa figura e la medesima disposizione, saranno dunque nel Sistema del Signor *De Tournefort* dell'istesso genere . Le Radici , i Gambi , e le Foglia non son poste in conto per allora ; ma quando si tratta dopo a divisare un genere nelle sue Spezie, le Radici , i Gambi , e le Foglia son considerate , e son prese per differenti spezie quelle,che o in tutte quelle tre parti differiscono , o solamente in alcune.

Poicche qui non si tratta di seguire , o d'imitar la Natura , qual non sembra di essersi affannata per un Sistema , ma solamente di stabilire un ordine arbitrario che agevola il conoscimento delle Piante; non par che debba la Ragione tanto avvacciarli a provare la bontà d' un Metodo , quanto al comodo e chiarezza, e forse ancora ad un certo piacere che vi s' incontrerà ; e su di questi principj il Pubblico può far giudizio di quello del Signor *De Tournefort*.

E' vero ch'egli non è universale , essendovi Piante che non anno nè fiori , nè frutta , o semi , o che almeno questi ultimi senza il soccorso del Microscopio non son visibili , e col Microscopio stesso son difficili a scoprirsi , e per vigor di

raziocinio si suppongono senza vederli. Ma in questa materia bisogna che i segni sian sensibili e manifesti agli occhi senza l'ajuto del Microscopio, e molto meno dell' Ipotesi le più sode: Ond' è che il Signor *De Tournefort* si ridusse a fare generi a parte di queste sorti di Piante, ch' e' guida su le loro parti più osservabili; e poicche questi generi sono in picciol numero, poco offendono all' universalità del suo Metodo, quale si sperimenta più universale di qualche mai altro fusse stato.

Alcune volte ancora, quando i fiori e le frutta insieme non li sian sufficienti per ben regolare i generi, chiama in ajuto non solamente le Radici, i Gambi, o le Foglia, ma pur, se assolutamente bisogna, alcune proprietà sensibili, com'è la lor maniera di crescere, o qualche i Botanici chiamano il Portamento della Pianta, cioè la sua general conformazione, e qualche nasce dalla prima veduta. Non vi essendo in fine Sistema naturale, le di cui regole sarebbero senza eccezione, bisogna contentarsi d'un artificiale men al possibile difettoso.

La distribuzione delle Piante sotto a' loro generi agevola molto il nominarle. Ann' esse alle prime il nome generico e comune, al quale si aggiunge quello che le specifica, in maniere che il loro nome è una definizione. Egli è vero che per non avere i Botanici antecedenti badato o a' generi, o a' medesimi generi, il Sig. *De Tournefort* è stato spesso obbligato a cambiare i nomi imposti da essi, aggiugnendo però con diligenza i nomi antichi secondo i differenti Botanici più rinomati; e se si avesse a' nuovi nomi ch' e' propone, vi si farà guadagno della conoscenza più pronta de' generi e delle spezie delle Piante, in un Sistema, che sembra dover essere molto vantaggioso alla Botanica.

Son

Son venute, per così dire, Piante nuovamente scoperte a porsi in ordine di per se sotto a certi generi già stabiliti dal Signor *Tournefort*; e quando saran discoperte altre Piante, che per i loro fiori e frutta richiederanno nuovi generi, non occorrerà altro che formarli.

Il Sig. *De Tournefort* nelle sue Istituzioni ha formato circa 673. generi, quali comprendono più di 8846 spezie di Piante così terrestri che marittime finora conosciute; & a buon conto oggi giorno si fanno più generi di Piante, che *Dioscoride* non ne conobbe spezie.

Ma perche la Memoria verrebbe a soffrire estremo incarico con 673. generi, di cui converrebbe conoscere i differenti caratteri, senza metter in conto che fermamente il numero avanzerà di molto, il Signor *De Tournefort* ha ritrovato il segreto di far men penoso il travaglio col ridurre i Generi a Classi; & egli è 'l primo Botanico, cui sia caduto in mente quello pensiero. Per stabilir queste Classi si serve egli de' fiori delle Piante, supposto ch'esse abbiano un fiore, come quasi che tutte l'hanno. Determina tutte le figure conosciute de' fiori delle Piante, e ne ritrova 14., le quali in conseguenza formerebbero 14. Classi, se il numero non fusse accresciuto dalle Piante che non an fiore, e dalla distinzione che l'è convenuto fare tra l'Erbe, o Frutici, & Arbuscelli, o Alberi, quali la differenza della grandezza non ha permesso di ordinare sotto l'istessa Classe, quantunque il loro fiore fusse l'istesso: E pure con questi accrescimenti le Classi non montano se non se a 22., nelle quali è diviso tutto il Libro delle *Istituzioni Botaniche*.

Basta dunque l'aver nella Memoria 14. figure di fiori, e tosto che si vedrà il fior d'una Pianta non
 cono-

conosciuta , si rinverrà nelle *Istituzioni* in qual Classe debba riporsi : Alcun giorno dopo'l fiore apparirà il frutto , & allora si avrà il Genere , e tutte le altre parti della Pianta ne dimostreranno la Specie . Se detta Pianta sconosciuta si abbia in tempi che non tien fiori , bisogna attender questi per sicuramente diffinirla .

Ha regolate il Signor *De Tournesfort* le sue Classi piuttosto per i fiori che per i frutti , perciocchè quando si vede il fiore, poco tempo deve attenderti per vedere il frutto e' d'eterminare il genere; allo'ncontro regolandole per lo frutto , veduto questo, bisogna aspettare fino all'Anno appresso per vedere il fiore .

Ecco tutte le difficoltà della Botanica appianate , quanto mai si possa sperar bene , e conosciuto il numero prodigioso delle Pianta, che cuoprono la superficie della Terra , e 'l fondo del Mare ancora, ristretto fra limiti molto brevi , da lasciarsi facilmente abbracciare dalla nostra Memoria e dalla immaginazione. Queste non son altro che le *Istituzioni della Botanica* . Dopo di ciò la conoscenza delle virtù delle Pianta, ch' è il fondo della Scienza, apre un altro campo d' immensa ampiezza, e più immensa ancora , se alla virtù ch' esse anno si aggiungano quelle che loro sono attribuite .

Il Signor *De Tournesfort* nella sua *Istoria delle Pianta nelle vicinanze di Parigi* ha dato un saggio della maniera di spiegar le virtù, e gli usi delle Pianta, & ha proposto nuovi lumi fondati su li più sodi principj della Fisica .

Arricchiscono di molto le *Istituzioni* del Signor *De Tournesfort* le figure di tutt' i generi delle Pianta, intagliate in maggior numero , e con maggior diligenza & esattezza , che figura di Pianta sia

Rata

stata mai . Formano esse due Volumi delli tre che compongono le sue *Istituzioni* .

In quest' istesso Anno l' Accademia per avanzamento della Botanica ha concepito un disegno molto nobile favorito dal Re con la sua ordinaria magnificenza .

Converrebbe molto il conoscer le Piante delle quali an parlato gli Antichi , o per aver que' remedi cotanto da essi celebrati , o per ridurli a perfezione, se mai fusse possibile, o per disingannarsene, se bisognasse. Ma di queste non ne conosciam la maggior parte , o perche quelle che tengono l'istesso nome presso noi non son le stesse degli Antichi , o perche la differenza de' Climi non fa ben ravvisare le loro figure o le virtù di esse . Bisognerebbe dunque studiare *Teofrasto* , e *Dioscoride* , in *Grecia* , in *Asia* , in *Egitto* , in *Africa* , & in fine in que' luoghi dove vissero , o che furono più da essi frequentati . Allo 'ncontro apparandosi la Botanica con l'andare scorrendo le Campagne, il profitto tanto sarà maggiore , quanti più Paesi saran veduti , & indipendentemente dalla Botanica degli Antichi , i Viaggi in luoghi riposti e lontani devon recar sempre utile a questa Scienza . Ma che penosa maniera è questa da perfezionarla ! E qual Botanico sì appassionato si delibererà per tal' impresa ? Il Signor *De Tournefort* è desso . Aveva egli già scorsa tutta la Spagna su di tal pensiero, e si risolvè francamente ad intraprender Viaggio più lungo e più pieno di pericoli .

Il Signor *Co: di Pontchartrain* , che per la sua Carica di Segretario di Stato tien cura dell' Accademia, e per un felice istinto, il piacer delle Lettere, con somma bontà propose al Re il Viaggio di Levante del *Sig. De Tournefort* , e S. M. da Re glie 'l per-

permise , ordinando che seco il Signor *De Tournesfort* avesse un Disegnatore intendente di Botanica scelto dall' Accademia , e che nel ritorno dal Tesoro Reale lui si rifaceessero tutte le spese a tenore delle semplici note , pagandoli di soprapìù 3000. lire; & oltre ciò , che le pensioni dell' Accademia continuassero a regolarmente darseli anche nella sua assenza . Aggiunse ancora , ch' e' con ciò si farebbe merito per l' accrescimento delle pensioni , e per altre straordinarie graziose ricompense destinate dal Re agli Accademici: Ordinando nell'istesso tempo le spedizioni di tutt' i Passaporti e Lettere commendatizie , necessarij per la sicurezza e comodo del suo Viaggio.

Le Scienze in buon conto protette da un sì gran Principe non avrebbero scusa da recare se oggi languissero . Il Signor *De Tournesfort* se ne partì nel mese di Marzo con tutto quel vivo desiderio che l'amor delle Scienze può ispirare , e molto più con quello di rendersi degno della bontà del Re: Egli seco menò il Signor *Gundelsheimer* nominato dall' Accademia per Compagno del suo Viaggio.

Il Signor *De Tournesfort* non pensava di restringersi nelle sole Piante ; nelle sue idee vi erano i Metalli , i Minerali, le Malattie particolari a' Paesi ove egli giugnesse , gli Animali rari , in fine tutto ciò che riguarda l' Istoria Naturale.

Appena giunto in *Marseille* , che attendendo il tempo favorevole ad imbarcarsi, fe le Descrizioni di alcune Piante , e di alcuni Pesci di *Provence* poco conosciuti, che inviò all' Accademia con i Disegni . Da tutt' i luoghi dell' Arcipelago , ove in quest' Anno egli approdò , e donde poté scrivere, se ricapitarci gran quantità di Descrizioni e Disegni; & il Re li richiedeva , e dimostrava piacere in veder-

dendoli : Che appunto è l'Elogio , e la ricompensa delle sue fatiche.

GEOMETRIA.

s u

LE FORZE

CENTRIFUGHE.

IL Signor Bernoulli Professor di Matematica in Groningue avea proposto questo Problema. *Ritrovare in un piano verticale una tal linea Curva, che un Corpo, il quale la descriverebbe, discendendo liberamente, e col suo proprio peso, la premesse sempre in ciascun de' suoi punti con una forza uguale alla sua gravità assoluta.*

Se in questo corpo non si considerasse altro che la sua gravità, il Problema sarebbe insolubile; perciocchè essendo la Curva un'accozzamento d' infinite linee rette infinitamente picciole, facentino tutte alcuni angoli l'une con le altre; & essendo supposta la Curva, di cui è quistione, in un piano verticale, ciascun de' suo' punti, toltone forse il primo e l'ultimo, sarebbe come un picciolo piano inchinato all'Orizzonte. Or ogn' un sà, che

un

• Vedi le Mem. pag. II. 28. 190. e 260.

un corpo su di un piano inclinato all' Orizzonte non vi fa una impressione uguale all' intiera sua gravità, essendo detto piano inclinato tanto men premuto quanto egli è meno inclinato; e che quando egli è infinitamente poco inclinato, cioè quando è verticale, non sostiene parte alcuna della gravità del peso, & allo'ncontro allora la sostiene intiera, quando è infinitamente inclinato, cioè orizzontale. Così la Curva che si cerca non potrebbe sostenere tutta la carica del peso, se non se ne' punti, le di cui Tangenti fossero orizzontali, se mai avesse ella simiglianti punti; ma in tutti gli altri, che sarebbero picciole rette sempre differentemente inclinate all' Orizzonte, ella sostenrebbe una porzion della gravità, differente, secondo la varia inclinazione delle Tangenti di tali punti: Ond' è che'l Problema non potrebbe essere sciolto.

Un Corpo però, che col suo moto descrive una Curva, ha egli ancora un'altra forza differente dalla sua gravità.

Tutti i Corpi che si muovono cercano farlo per linea retta, per esser questa la determinazione più semplice: se, per cagion d'esempio, si muovano in giro, bisogna che siavi una cagione che ve li costringa, e distornandoli dalla linea retta in ogni momento, e pignendoli verso un centro, li tenga sempre da questo ugualmente discostati. Se tal costringimento cessasse, tosto scapperebbero essi per quella linea che sarebbe tangente della Curva in quel punto donde son posti essi in libertà, e secondo questa linea retta si dilungherebbero essi sempre più dal centro, intorno a cui prima si aggiravano. Questa resistenza ch' e' fanno a tal forza Attrattiva, e questo perpetuo loro conato a discostarsi

stati dal centro del loro moto, è quella che si dice *Forza Centrifuga*.

L'effetto della forza Centrifuga è tale, che un Corpo obbligato a descrivere un Circolo, lo descrive il più grande ch' e' può ; perciocche un circolo più grande è , per così dire , meno circolo , e differisce meno da una linea retta , che un più picciolo . Un Corpo dunque soffre maggior violenza, & esercita maggior forza centrifuga , quando e' descrive un picciolo Circolo, che quando ne descrive un grande .

Le altre Curve van di pari col Circolo; perciocche una qualunque Curva puol'esser riguardata come composta da una infinità d'archi di circolo infinitamente piccioli, tutti descritti su differēti raggi, in maniera che ne' luoghi, ove la Curva ha maggior curvatura , i piccioli archi del circolo son porzioni de' più piccioli circoli , e sono stati descritti sopra de' più piccioli raggi.

Un Corpo dunque, che descrive una Curva, in ciascun istante cerca con la sua forza centrifuga discostarsi dal punto ch' è centro dell' arco del circolo infinitamente picciolo, qual e' allora descrive; e questo sforzo è altrettanto maggiore , quanto detto arco di circolo infinitamente picciolo è porzione d'un più picciolo circolo.

Perciò in una istessa Curva la forza centrifuga d'un Corpo, che la descrive, varia secondo i differenti punti ov' e' si trova .

Potrebbe dunque farsi, che in una Curva , in cui l'impressione della gravità del Corpo che la descriverebbe variasse sempre, la forza centrifuga ancora suls' ella sempre varia in maniera tale , che supplendo sempre l'una a' difetti dell'altra, o corrigendo il suo eccesso, l'effetto unito di tutte due
susc-

fusse sempre uguale alla gravità assoluta del Corpo.

Qui si dirizza il Problema del Signor *Bernoulli*, che niun Geometra avea sciolto.

Dipendeva egli da una esatta Teorica delle forze centrifughe non ancora ben conosciuta; sebbene quella delle gravità, che pur eran necessarie a saperli, bastantemente a fondo fusse conta.

Sapevasi solamente che la forza centrifuga d' un corpo è altrettanto maggiore, quanto descrive egli un circolo più picciolo, quanto è più grave, e quanto gira con maggior Velocità; ma nè le misure, nè le regole di queste ragioni si conoscevano.

Egli è vero che 'l Signor *Huygens* nel fine del suo Trattato de *Horologio Oscillatorio* avea dati molti Teoremi, ne' quali precisamente avea determinate queste ragioni, ma egli ce li lasciò senza dimostrazione: Si era contentato di far conoscere, che sapeva il segreto delle forze centrifughe, ma non l'avea voluto scoprire: Era questi una spezie d'Enigma proposto da lui a più abili Geometri, porzion del quale l'illustre Signor *Newton* avea indovinata, lasciando il rimanente agli altri.

In fine con tutta la Teorica delle forze centrifughe, il Problema del Signor *Bernoulli* pur sarebbe stato difficilissimo. Se Problemi, ne' quali altro non bisognava che adattare alla Geometria la semplice Teorica ordinaria della Gravità, an cotanto esercitato, e talvolta inutilmente, i più grandi Geometri, con molto maggior ragione un Problema complicato di due Teoriche differenti doveva recare imbarazzo.

Il Signor *Marcbese dell' Hopital* intraprese a vincere tutte queste difficoltà con l'ajuto del suo Metodo dell' *Infinitamente piccioli*; & ci sembra

di essersi diffidato con tutti altri Metodi di poterne venire a capo.

Scoprì alle prime per questo mezzo la Teorica delle forze centrifughe nel circolo; & eccone la Proposizion fondamentale.

La Velocità d'un Corpo, qualunque ella sia, potrebbe essere stata acquistata da detto corpo coll'esser' egli caduto da una certa altezza secondo il comun Sistema dell'Acceleramento. Che un corpo d'una determinata gravità si muova uniformemente intorno ad un centro con una certa velocità, bisogna vedere da quale altezza avrebbe egli dovuto cadere per acquistare tal velocità, & indi

Come il Raggio del circolo ch'egli descrive è al doppio di questa Altezza, così la sua Gravità è alla sua forza Centrifuga.

Questo solo svela tutto il misterio del Signor *Huygens*, e dà al Pubblico le soluzioni da lui occultate.

Di là è facile a conchiudere, per poco che un sia Geometra,

Che bisogna, affinché la forza centrifuga d'un Corpo sia uguale alla sua gravità, che la velocità con la quale descrive egli il suo circolo sia uguale a quella che averebbe acquistata in cadendo da un'altezza, che fusse la metà del raggio di detto circolo.

Che se due Corpi uguali descrivono differenti circoli con velocità uguali, le loro forze centrifughe sono in ragion inversa de' raggi de' circoli, cioè, più grandi nell'istessa ragione quanto i circoli sono più piccioli.

Che se due Corpi uguali descrivono circoli uguali con velocità ineguali, le loro forze centrifughe sono come i Quadrati delle loro velocità.

Che

Che se due Corpi ineguali descrivono circoli uguali con velocità uguali, le forze centrifughe sono come i gravità, &c.

Supposto, che le gravità de' Corpi terrestri faccianfi da una materia fluida che gira intorno alla Terra, e con essa, qual cercando a slontanarsi dal centro del suo moto, ch'è centro della Terra ancora, rispinge verso detto punto i Corpi men propri di essa a' movimenti rapidi; è chiaro, che la gravità d'una massa di piombo, per cagion d'esempio, sarà precisamente uguale alla forza centrifuga di una simigliante ampiezza di questa materia fluida presa immediatamente su la superficie della Terra. Bisognerà dunque che la Velocità, con cui questa materia gira intorno alla Terra, sia la stessa con quella che avrebbe acquistata la massa del piombo in cadendo dall' altezza di 750. leghe, perciocche la metà del raggio della terra è a un dappresso di tal grandezza. Questa Velocità, ch'è facilissima a calcolarsi, sarebbe 17. volte più grande di quella d'un punto dell'Equator della Terra, che fa quasi 9000. leghe per giorno. Ecco che la prodigiosa rapidità della materia sottile, qual sembrava di essere stata supposta per lo comodo d'un Sistema, viene a geometricamente esser dimerminata dalla Teorica delle forze centrifughe.

Poicche per la disposizione dell'Universo, i moti per linea retta, quantunque i più semplici, sono i più rari; & allo'ncontro la violenza, che soffrono i Corpi mossi in giro, è un principio d'azione sovente impiegato dalla Natura così come la Molla, la quale non opera se non se quando se li fa violenza; egli è facile a giudicare che 'l conoscimento delle forze centrifughe debba essere nella Filica d'un uso molto ampio.

Il Sig. Marchese dell'Hopital dà quivi tutto quel che può desiderarsi su di tal materia, e la sua considerabil fatica destinata solamente ad agevolare la soluzione del Problema del Sig. Bernoulli può tenerli in maggior conto della soluzione istessa, che n'era il primo oggetto; nè potea venirli meno il ritrovamento dopo sì felici apparecchi.

La Curva ricercata è tale, che bisogna che un Corpo, prima di cominciare a descriverla, sia caduto per linea retta da una certa altezza d'eterminata, o, ch'è lo stesso, ch'è cominci a descriverla con una certa velocità.

Si d'eterminano due parti in questa Curva riguardo all'Orizzonte; l'una è superiore, nella quale la forza Centrifuga del Corpo, essendo maggiore della sua gravità assoluta, vien distrutta, precisamente tanto quanto bisogna, dalla porzione del peso che fa impression su la Curva, e che tira per un verso contrario alla forza centrifuga. Nella parte inferiore, la forza Centrifuga è minore della gravità, & ha bisogno d'essere ajutata da una porzion del peso che opera per lo medesimo verso come essa, e concorre all'istesso effetto. In questa guisa, si ritrova tra la gravità assoluta del Corpo, e l'impressione ch'è su di tutt' i punti della Curva, una perpetua uguaglianza, donde l'essere di tal linea dipende.

La parte inferiore della Curva, prolungata all' infinito verso l'Orizzonte, non vi può mai giugnere, in maniere che ha ella una direzione, o, ch'è lo stesso, una Tangente orizzontale; perciocchè allora il Corpo premerebbe questo punto della Curva con tutta la sua gravità, bisognerebbe dunque, per conservare l'essenziale uguaglianza, che la forza centrifuga assolutamente fosse nulla: or questo è quello che non si può, perciocchè in qualunque parte

parte che si fia della Curva, il Corpo descrive sempre un picciol'arco di circolo: allo 'ncontro la forza centrifuga è molto lungi dal ridursi al niente, che anzi ella sempre cresce per l'accrescimento continuo della velocità del Corpo, che cade sempre lungo la Curva.

Se si volesse che l'impression del Corpo su la Curva, composta di sua forza centrifuga, e d'una parte della sua gravità, in luogo di esser sempre uguale alla sua gravità intiera, lo fusse sempre a qualche altra gravità data, qualunque mai si volesse; il Sig. Marchese dell'*Hopital* con gli stessi principi e facilità solve tal quistione, e dimostra i cambiamenti che avverrebbero nella sua Curva.

S'è ancor si volesse, che 'l Corpo non facesse impression alcuna su la Curva, e che la sua forza centrifuga, e la porzion del suo peso che opera, si distruggessero perpetuamente, perciocchè farebbero esse uguali, & avrebbero direzioni opposte; cioè in una parola, se nel Corpo non si considerasse altro che la sua gravità assoluta, qual farebbe lui cader sempre per linea retta, e che per farli descrivere una Curva se li desse nell'istesso tempo una certa velocità orizzontale, vedrebbe si tosto la Curva del Sig. Marchese dell'*Hopital* trasformarsi in una Parabola ordinaria, quell'istessa appunto che *Galileo* fa descrivere ad una Palla di Cannone, qual' egli considera precisamente ne' medesimi termini che noi usiamo.

Una Curva trovata una volta per soddisfare a certe condizioni d'un Problema, si cambia indi in differenti altre Curve, per ogni cambiamento che si faccia nelle condizioni. Queste trasformazioni sono i più aggradevoli spettacoli che la Geometria speculativa possa porgere allo Spirito;

& in oltre quando per loro mezzo si rivenga alla cognizione di verità altrove conosciute, e si rivega, per così dire, in Paesi noti, questo è un sopra più di sicuranza di essersi ben'incaminato.

Nel tempo che si agitava la quistion delle forze centrifughe, il Sig. *Varignon* aggiunse cosa considerabile alla Teorica, ch' egli avea data nel 1698. de' *Moti Variati*, cioè, accelerati o ritardati secondo qualunque proporzione.

La Velocità è una Ragione dello Spazio al Tempo, ovvero, il Quoziente d'una Divisione fatta dello Spazio per lo Tempo. Quanto più lo Spazio è grande, e' l Tempo è picciolo, più il Quoziente della Divisione, o la Velocità, è grande: Quanto più lo Spazio è picciolo riguardo alla grandezza del Tempo, più la Velocità è minore.

E' dunque chiaro, che 'l Tempo moltiplicato per la Velocità debba produrre lo Spazio, e lo Spazio diviso per la Velocità debba produrre il Tempo, e che in fine venendo date due di queste tre cose, si abbia la terza senza difficoltà.

Ma tutto ciò allora egli è vero, quando i Moti sono Uniformi, cioè quando i Spazj scorti in Tempi uguali sono uguali, o, ch' è lo stesso, quando i Spazj son sempre proporzionali a' Tempi.

Ma se i Moti sono accelerati, come quello d'un Corpo grave che cade nell' aere, o ritardati, come quello dell'Acqua che vien fuori da una Conserva per picciola buca, allora la Velocità sempre cambia; quella d'un Minuto non è già quella d'un'altro Minuto, e dall'aver un Corpo che cade, per cagion d'esempio, corso un Passo in un Minuto, non potrebbe si conchiudere, come si farebbe in un movimento uniforme, che la sua Velocità consiste nella ragione di un Passo ad un Mi-

Minuto, e che in 60 Minuti o in un' Ora scorrerebbe egli 60 Passi; perciocche è certo, che per l'accelerazione del suo moto e' ne scorrerebbe 3600. Molto meno si può conchiudere, dall'aver scorsò il Corpo un Passo nel primo Minuto, secondo qual proporzione la Velocità si sia aumentata, potendosi supporre un'infinità di accrescimenti varj di Velocità, che tutti daranno questa ragione di un Passo ad un Minuto.

Frattanto il Sig. *Varignon* non ha lasciato di trattare i Moti Varj come gli Uniformi, e tirar dagli uni l'istesse conseguenze che dagli altri.

In un Moto uniforme, la ragione dello Spazio al Tempo può esser rappresentata da un Triangolo, la di cui altezza sarà divisa in quante parti mai si vorrà per altrettante basi parallele. Le differenti parti dell'altezza rappresenteranno i differenti spazj scorsj; le differenti basi, i differenti tempi; e come in detto Triangolo le Basi sono nell'istessa proporzione che le Altezze corrispondenti, così ne' Moti uniformi i Tempi son come i Spazj:
In un tempo doppio, lo spazio è doppio, &c.

Ma un Moto variato, ove, per cagion di esempio, in un tempo doppio lo spazio è quadruplo, non può esser rappresentato da un Triangolo, ma si bene bisogna che lo sia da una Curva; perciocche in questa le differenti Ordinate non son tra di loro nell'istessa proporzione delle Ascisse corrispondenti, come in un Triangolo le basi parallele sono alle altezze, ma le Ordinate seguono sempre una certa proporzione, mentre che le Ascisse ne sieguono un'altra; quindi è che le Ordinate d'una Curva son proprie a sprimere i Tempi d'un Moto variato, le quali cresceranno o scemeranno sempre secondo una certa proporzione, mentre che le Ascisse regolate
su

su di un' altra proporzione esprimeranno i Spazj. Così nell' Ipotesi di *Galileo*, in cui i Spazj scorti dal Corpo grave crescono secondo i quadrati de' tempi, una Parabola ordinaria rappresenta questa ragione; perciocche essendo prese le sue Ordinate per i Tempi, e le sue Ascisse per gli Spazj, un' Ordinata doppia d'un' altra corrisponde ad una Ascissa quadrupla, un' Ordinata tre volte maggiore, ad un' Ascissa 9. volte più grande, &c. Non occorre quì avvertire che ciò non dinota farsi il Moto variato secondo una Parabola, o secondo altra Curva, e che il Corpo la descriva; ma solamente che la Parabola, o alcun' altra Curva rappresenti per la ragione delle sue Ascisse e delle sue Ordinate quella de' Spazj e de' Tempi d' un Moto variato: & in fatti, supposta la Terra immobile, un Corpo che cade non si muove che per linea retta, e frattanto la Parabola non lascia di rappresentar il suo moto accelerato.

Se una Curva rappresenta la ragione de' Spazj a' Tempi in un Moto variato, un' altra rappresenterà parimente con le sue Ascisse e sue Ordinate la ragione de' Tempi alle Velocità, o delle Velocità a' Spazj.

Ciò supposto, il Signor *Varignon* con la Geometria degl' Infiniti Piccioli ridusse i Moti variati all' istessa Regola che gli Uniformi; nè sembrava che per mezzo di tutti altri Metodi avrebbe potuto giugnervi.

La Velocità accelerata d'un Corpo sempre è accelerata in qualunque picciolo Spazio, & in qualunque picciolo Tempo che si consideri, purché tale Spazio e Tempo sian d' una picciolezza finita e determinata; ma se sian essi riguardati come infinitamente piccioli, la Velocità diviene uniforme, quan-

tun-

tunque allora ella pur cresca ; & ecco la pruova di tal Paradoſſo .

L'infinitamente Piccioli an tra di loro l'istefſe ragioni che le Grandezze finite , l'uno puol'eſſer doppio, triplo, &c. d'un altro. La ragione di un infinitamente picciolo ad un altro, ch'è doppio, triplo, &c., è $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, &c. Queſte ragioni $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, &c. ſono grandezze finite e d'eterminate , & in conſeſenza le ragioni dell' infinitamente Piccioli non ſono Grandezze infinitamente picciole , ma Grandezze finite.

La Velocità d'un Corpo, che in un tempo infinitamente picciolo ſi ſuppone ſcorrere uno Spazio infinitamente picciolo ; non è dunque infinitamente picciola , ma una grandezza finita ; poichè è ragione di due infinitamente Piccioli dell' iſteſſo genere : Et in fatti allorchè lo Spazio e 'l Tempo proporzionalmente mancano , la Velocità perciò non iſcema, & un Corpo che ſcorre con un moto uniforme un Paſſo in un Minuto , ha l'istefſa Velocità che quando egli in un' ora corre 60. Paſſi.

Ma non può dirſi dell' accreſcimento della Velocità qualche ſi dice della Velocità iſteſſa ; perciocchè una Velocità , che riceva in ciaſcun momento accreſcimenti dell' iſteſſo genere ſempre da un' iſteſſa cauſa dipendentino, creſce meno in un Tempo più breve che in uno più lungo ; & in conſeſenza in un Tempo infinitamente picciolo il ſuo accreſcimento non puol'eſſere che infinitamente picciolo.

La Velocità, con cui ſi ſcorra uno Spazio infinitamente picciolo in un Tempo infinitamente picciolo, è dunque una Grandezza finita , il di cui accreſcimento in tal' iſtante è infinitamente picciolo. Ma una Grandezza finita è infinitamente grande ſiguardo ad un infinitamente picciolo , & ella non è nè

è nè accresciuta nè scemata, qualora detto infinitamente Picciolo se l'aggiunge o se li toglie, & in conseguenza la Velocità d'un istante dee esser riputata uniforme per detto istante, perciocchè il suo accrescimento dee tenersi per nulla riguardo ad essa.

Con l'ajuto di questa uniformità sì sottilmente ritrovata, rientrano nell'istessa Regola degli altri i Moti Variati, purchè se ne riducano i Spazj & i Tempi all'infinitamente piccioli.

Poicchè le Grandezze infinitamente picciole si prendono più naturalmente e più ordinariamente nelle Curve, an voluto che le Ascisse, e le Ordinate d'una Curva rappresentino i Spazj, & i Tempi.

La ragione de' Spazj a' Tempi, supposta sempre l'uniformità nel moto prodotto per l'infinitamente Piccioli, dà la Velocità; e la proporzione di tal Velocità col Tempo già noto, è la proporzione secondo la quale la Velocità cresce o manca.

Così senza affanno rinverrassi la Curva, che con le sue Ascisse & Ordinate esprimerà la Velocità & i Tempi, o la Velocità & i Spazj.

Egli è molto chiaro che ritorcendo questo ragionamento, & impiegando l'istess' arte dell'infinitamente Piccioli, si ritroverà per mezzo della Curva delle Velocità e de' Tempi quella de' Spazj e de' Tempi, e così delle altre combinazioni; e che infine, essendo date due di queste tre cose, Spazio, Tempo, e Velocità, se ne dedurrà la terza, così ne' Moti Variati come negli Uniformi.

Questo è quanto il Signor *Varignon* fin da due Anni avea presentato all'Accademia: Rese però egli questa Teorica più generale e più bella, in facendovi entrare le Forze Centrali, cioè le Forze, che
sem-

sempre applicate menano per linea retta verso un certo punto, o ne dilungano un Corpo in moto. Questa è l'idea che comunemente si tiene della Gravità, e della Leggerezza. Le Velocità, gli Spazj, & i Tempi combinati insieme non possono formar altro che tre ragioni, ma aggiuntavi la Forza centrale, possono rilultarne sei.

Dilpose il Signor *Varignon* si felicemente il suo nuovo Metodo, che non bisognava altro che una delle sei ragioni per ritrovar le cinque rimanenti; o, ch'è lo stesso, venendo ciascuna di queste ragioni espressa dalle Ascisse & Ordinate di alcuna Curva, se una sola delle sei Curve se li desse, ne dedurrebbe senza fatica le cinque altre.

Perciò egli è chiaro, che bisognava esprimere la Forza Centrale in maniera, che non entrassero nella sua espressione se non le Velocità, o Tempi, o Spazj, per cui mezzo il numero delle cose, che dovean conoscerli secondo il Metodo precedente, non si accrescesse, e 'l numero di quelle che se ne poteano dedurre si accrescesse dalla Forza Centrale.

Quando la Velocità d'un Corpo si accelera, come per cagion di esempio, quella d'un Corpo che cade, qualche cagiona questo acceleramento è quell' istessa forza che fa la gravità, qualunque ella sia; & essendo sempre applicata a detto Corpo, in ciascun istante accresce l'effetto prodotto da lei nell' istante precedente; e per contrario ella l'accresce sempre ugualmente, se ella è sempre l'istessa, e non mai cambia, come quivi può supponersi.

Su di questo fondamento ha provato *Galileo*, che gli Spazj scorsi da un Corpo che cade son sempre tra di loro, a prenderli dal principio della caduta, come i Quadrati de' Tempi impiegati a scorrer-

rerli : Nè qui bisogna replicar la di lui pruova .

L'istesso avverrà di tutte altre Forze costanti e continuamente applicate .

Per un altro verso, poicche gli Effetti son sempre proporzionali alle Cause , nè trattandosi qui che di proporzioni , l'Effetto della Forza Centrale , ch'è lo Spazio che questa fa scorrere , diviso per lo Quadrato del Tempo , può tener suo luogo, & esprimerla geometricamente . Non si tratta di altro che d'eterminare qual sia lo Spazio scorso in virtù della Forza Centrale .

Il Signor *Varignon* nella Teorica presente considera separatamente la Velocità e la Forza centrale, che in fatti possono l'una dall'altra esser divise. Una Pietra scagliata perpendicolarmente da alto a basso tien sua Velocità dal Braccio che l'ha scagliata, ma dalla sua sola Gravità tiene l'acceleramento di detta Velocità ; nè bisogna dar precisamente alla Forza centrale altro che lo Spazio scorso per detto acceleramento .

Avendo la Dimostrazion precedente fatto ricorrere il Signor *Varignon* necessariamente agl' Infiniti Piccioli, quella, ch'è un proseguimento di questa, fa tenere l'istesso istituto, e cercare negl' istessi Infiniti piccioli lo Spazio richiesto .

Abbiain di già veduto che lo Spazio scorso in virtù della Velocità in un Tempo infinitamente picciolo è infinitamente picciolo, e che in questo medesimo istante l'accrescimento della Velocità è ancora infinitamente picciolo riguardo alla Velocità ch'è finita ; ne siegue dunque, che 'l nuovo picciolo Spazio scorso in virtù dell'accrescimento della Velocità sarà infinitamente picciolo riguardo allo Spazio infinitamente picciolo scorso nell'istesso Tempo per virtù d'una Velocità finita, cioè, che
que

questo sarà un'infinitamente Picciolo del secondo genere; perciocche, secondo questa Geometria, vi ha un' infinità d' Ordini d'infinitamente Piccioli, i Superiori de' quali sono infinitamente Grandi riguardo all'Inferiori.

Così lo Spazio infinitamente picciolo del secondo genere diviso per lo Quadrato de' Tempi esprimerà la Forza Centrale qualunque ella sia; & in detta espressione non vi entra altro che i Spazj, & i Tempi, da' quali è facile passare alle Velocità, o reciprocamente Tempi e Spazj, o Spazj e Velocità, &c. alla Forza Centrale.

Per cagion d'esempio, se suppongasi che un Corpo mosso per linea retta con una Forza Centrale descriva Spazj che sono tra di loro come i Quadrati de' Tempi, o, ch'è lo stesso, che la Parabola comune rappresenti per mezzo delle sue Ascisse e delle sue Ordinate gli Spazj & i Tempi, con le Regole del Signor *Varignon* si conchiuderà che la Forza Centrale è sempre la stessa, e non soffre cambiamento alcuno nella sua azione; & in fatti questa non è altro che la Gravità.

In tal caso bisogna osservare, che essendo la Forza Centrale sempre la stessa, le linee rette, che la rappresentano in ciascun istante, son sempre uguali, e per conseguenza non potrebbero essere Ordinate di Curva; e però è bene di cominciare sempre col supporre che le Grandezze, di cui si cercano le ragioni, formano Curve, perciocche questa è una supposizione generale, e facilmente si vedrà appresso se dette Curve si cambieranno in rette; quando che supponendosi dette linee Rette, non si cambierebbero in Curve.

Tutti questi Metodi potrebbero suggerirci riflessioni favorevoli alla Geometria dell' Infinita-

men-

mente Piccioli, giacche tutta la Geometria altro non è che un'Arte di scoprir le ragioni delle Grandezze, e di dedurre le une dalle altre, qual'Arte è altrettanto più perfetta quanto da un minor numero di ragioni conosciute ne sappia ella dedurre un maggiore d'incognite. Or e'sembrerebbe molto l'esserli detto (benché per cagion d'esempio) che vi sian ragioni che non si possion tenere, se per lo meno non si dividan le Grandezze sino alle loro parti Infinitamente Picciole, e ne' primi Elementi, e talvolta ancora sino agli Elementi infinitamente piccioli di questi primi Elementi, & oltre ancora, se mai bisogna. Si è veduto, che dato lo Spazio, e 'l Tempo del Moto variato, è convenuto, per dedurne la Velocità, andare a rinvenire negli Elementi Infinitamente Piccioli di queste due Grandezze questa ragione, qual non era tra quelle istesse Grandezze considerate nell' Estension loro finita e naturale. Per la Forza Centrale è bisognato penetrare sino all' Infinitamente Piccioli degl' Infinitamente Piccioli, e la ragion che cercavali non era ne' soli Infinitamente Piccioli del primo genere. In una parola, dalle stesse Grandezze date la Geometria dell' Infinitamente Piccioli ne trae più che altri, perciocché ella moltiplica le Ragioni, e ne riproduce delle nuove.

Sin quì il Signor *Varignon* non avea considerato altro che i Moti fatti per linea retta: ma poicché tutto 'l difficile delle cose stà nel rinvenir la buona strada, qual ritrovata non si dura molta fatica a seguitarla; l'è riuscito facile di applicar la sua Teorica anche a' Moti fatti secondo le linee Curve, e Variati, come i precedenti.

Per la riduzione all'Uniformità che si ha dalla Geometria dell' Infinitamente Piccioli, la Velocità di questi Moti è la ragione d'una porzione infinita-
men-

mente picciolà della Curva, ch' essi descrivono, ad un Tempo infinitamente picciolo; siccome la Velocità de' Moti fatti per linea retta era la ragione d' una porzione infinitamente picciola della Linea Retta ad un Tempo infinitamente picciolo. Si deducono di là le stesse conseguenze che per i moti in Linea Retta si son dedotte.

Perche si comprenda l'uso di questa nuova Regola, suppone il Signor *Varignon*, che un Corpo, la di cui gravità, secondo l' idea comune, è costante & ha direzioni sempre parallele, cade lungo una Cicloide rivolta, e la trascorre da un punto preso a piacere sino al punto più infimo, che può chiamarsi il suo fondo. Cerca di poi qual Curva rappresenterà con le sue Ordinate i Tempi che questo Corpo impiegherà a cadere da differenti punti di tal Cicloide, più o meno elevati, sino a quest' istesso fondo. Applicata la Regola, i tempi da per tutto si ritrovano l' istessi; locche altronde già sapevasi.

Se si supponesse che in una Cicloide rivolta tutte le cadute terminate nel suo fondo si facessero in tempi uguali, da qualunque altezza mai avessero cominciato, e si ricercasse qual' ipotesi d' accelerazione di Velocità fusse stata necessaria per dar questa proprietà alla Cicloide, con l' istessa facilità si troverebbe essere stata questa l' ipotesi di *Galileo*; nella quale le velocità son come le radici delle altezze. Essendo però tutto ciò molto limitato, s' innalza più oltre il Signor *Varignon*, e dalla sua Regola per i Moti Curvilinei deduce l' equazion generale d' una Curva, lungo la quale le cadute terminate nel fondo, da qualunque punto mai abbian cominciato, si faranno secondo quella proporzione di tempi che si vorrà; e ciò in qualunque ipotesi,

1 flor. 1700.

H

che

che si tenga intorno all' acceleramento della Velocità . Se in tale equazione indeteterminata si voglia che i tempi siano uguali , l' indeteterminato comincia a restringersi , e si ha solamente una Curva in generale , ove le cadute facendosi sempre in tempi uguali , l' ipotesi dell' accelerazione potrà esserè qual si vorrà . Se indi si determini questa ipotesi ad essere ipotesi comune , si vede rinascere tolto la Cicloide .

Ripigliando il Signor *Varignon* detta Curva , vi determina gli archi che in un' istessa caduta sarebbero scorsi in tempi uguali , qual cosa distende & accresce ancora questa conoscenza dell' egualità de' tempi . Fà egli di più . Dopo aver determinato qual ragione vi è tra i tempi d' una caduta per un qualunque Arco della Cicloide , & i tempi d' una caduta per la Corda dell' Arco corrispondente del Circolo generatore , si serve di questa scoperta per istabilire una linea retta costante , che misurerebbe i tempi di tutte le cadute fatte per gli Archi ineguali d' una infinità di differenti Cicloidi che tutte si segassero in un punto di detta retta , donde comincierebbero le cadute . Di là nascerebbe una nuova Curva , che passerebbe per tutt' i punti di questa infinità di Cicloidi , ove si terminerebbero le cadute fatte in tempi uguali .

Questo a sufficienza per far comprendere l' estrema fecondità della Regola de' Moti Curvilinei presa nella sua prima semplicità : Il Signor *Varignon* però l' ha fatta molto più ampia con aggiugnervi la considerazione delle forze centrali che tendono ad un punto .

La forza centrale , quale sempre si suppone , come ne' Moti rettilinei , costante in ciascuno istante e continuamente applicata , opera secondo una

una linea retta tirata al Corpo, che si muovo, dal Centro dove esso tende. Quando egli si muove per linea retta, la linea del suo moto è l'istessa con quella per la quale opera la forza centrale e per conseguenza detta forza è sempre applicata nell' istessa maniera: Quando però il Corpo si muove per una Curva, questa linea ch'è quella del suo moto è differente dalla linea retta, secondo la quale tende ad un centro, e riceve l'impressione dalla forza centrale. Detta forza, quantunque costante in ciascun momento e sempre applicata, opera più o meno, secondo ch'ella è più o meno vantaggiosamente applicata al Corpo su di cui opera. Il più e 'l meno in tal' azione si regola come in tutte le altre. Se la forza centrale opera per una linea perpendicolare alla Curva descritta dal Corpo in moto, opera ella con quanto vigor mai può operare; fuor di là ella opera altrettanto più debolmente, quanto la linea della sua azione è più obliqua al picciolo Arco della Curva, ove si trova il Corpo in ciascun momento. Quindi egli è chiaro, che se un Corpo si muova circolarmente, e che vi sia una forza che lo pinga al Centro del suo Circolo, o, ch'è lo stesso, lo meni a dilungarsene; questa forza opererà sempre tutta intiera & ugualmente, perciocchè tutte le linee tirate dal centro alla circonferenza d'un Circolo sono a questa perpendicolari & uguali. Qualunque altra Curva però un Corpo descriva, giacchè la forza centrale che lo menerà ad un punto preso dentro o fuori di detta Curva, non può oprare per linee perpendicolari alla Curva se non se in alcuni punti, e fuor di questi, operando sempre per linee inchinate, e differentemente inchinate secondo la natura della Curva, la sua azione sarà ineguale.

Il Signor Marchese dell' *Hopital* nel suo Problema da noi riferito non avea considerata la forza centrale se non se nel Circolo , o , che nel fondo è l' istesso, l'avea considerata come operante sempre per una linea perpendicolare alla Curva del moto , nel qualcaso bisognava , perche quella Curva non fusse un Circolo, che 'l Centro, dove la forza centrale tendeva , cambiasse sempre .

Ma 'l Signor *Varignon* rese la Teorica generale quanto mai potesse farli , applicando la forza centrale a tutte le possibili Curve , e dirigendola ad un punto che si vorrà stabilire per centro e dentro o fuori di dette Curve . Determinò egli sempre col Metodo dell' Infiniti piccioli , e necessariamente con detto Metodo , quale sia l'ineguaglianza dell' azione della forza centrale in ciascun punto di una qualunque Curva , ove si ritrovi il Corpo in moto .

L'espression geometrica , ch' e' dà della forza centrale così specificata & accompagnata da ineguaglianza della sua azione , non contiene ancora altro che Velocità, e Tempi ; & in conseguenza il numero delle Cose , che se ne possono dedurre , non à men grande , che quando si considerasse tutta semplice , & operante di continuo per una linea retta . Reciprocamente, non bisogna conoscere un maggior numero di Cose per aver la forza centrale con le ineguaglianze della sua azione , che per averla tutta semplice .

Per questo mezzo il Signor *Varignon* incontra le proposizioni principali della dotta Opera del Signor *Newton* ; quello però che rende più nobile la sua inchiesta , son le conseguenze ch' e' deduce per l'Astronomia, e per i differenti Sistemi de' Cieli .

Il Signor *Descartes* il primo scoprì che tutto
ciò

ciò che gira intorno ad un centro cerca slontanarsene, sù 'l qual principio fondò egli l'ipotesi de' *Gironi*, o *Vortici*. Tutt' i Pianeti compresi nel *Vortice* del Sole girano intorno a questo Astro, e cercano in conseguenza slontanarsene: La Materia eterea però, nella quale essi nuotano, più sottile e più disposta a discostarsi da questo comun centro, continuamente ve li respigne, o piuttosto reprime i loro sforzi, e li tien sempre nella circonferenza dell' istessa Curva ch' essi descrivono intorno al Sole. Questo è quello che può chiamarsi *Gravità* de' Pianeti riguardo al Sole, perciocchè apparentemente ella risomiglia al Principio che respigne i Corpi terrestri verso la Terra.

Si ha somma inclinazione a credere che qualche gira si muove circolarmente, poichè gli Occhi di loro natura son disposti per lo Circolo, almeno se chiaramente non veggano bene il contrario, e per detta ragione si è creduto che i Corpi Celesti si muovessero circolarmente. Allo 'ncontro loro si è attribuita non sò qual' Eccellenza, cui si è creduto che 'l moto circolare convenisse meglio, come quello ch' è uguale & uniforme. E *Copernico* stesso, così ardito com' egli era, e sgannato intieramente delle idee comuni, ha conservato questo pregiudizio.

Quando però le Osservazioni Astronomiche divennero più esatte di quello ch' erano state, la supposizione de' moti circolari non vi si trovò tanto acconcia.

Kepler il primo ha osato cambiar in *Ellissi* i Circoli che si facean descrivere a' Pianeti intorno al Sole. Dette *Ellissi* tutte anno un fuoco comune, in cui si è posto il Sole, che prima era nel centro di tutti detti Circoli. Si spiegano molto natural-

mente con ciò le differenti distanze de' Pianeti dal Sole.

L'Astronomia dopo *Kepler* si è di vantaggio perfezionata; e non essendosi intieramente la sua Ipotesi ben incontrata con l'Osservazioni, il Sig. *Cassini* vi fe' un cambiamento. L'Ellisse di *Kepler* era ordinaria, in cui la somma di due linee tirate da due fuochi ad un istesso punto della Circonferenza è sempre uguale: ma il Sig. *Cassini* suppone un'altra spezie d'Ellisse, dove, in luogo della somma di queste due Linee, il lor prodotto è quello ch'è sempre uguale.

In fine qualunque spezie di Curva si faccia descrivere da' Pianeti intorno al Sole, purch' ella non sia un Circolo, è certo che la forza centrale, che li spigne verso 'l Sole, opera sempre inegualmente da un momento all' altro, & in conseguenza la loro Velocità deve esser sempre ineguale, crescere quando l'azione della forza centrale si accoppia con la direzione del moto del Pianeta per la Curva, scemare, quando l'è contraria. Così il moto de' Pianeti, malgrado della loro pretesa dignità, sarà realmente ineguale: Se ne vede una ragion geometrica, nè più vi sarà obbligo di ricorrere ad ipotesi forzate per salvar dette inegualità, sempre dure a riceverli. Questa idea s'accorda molto meglio con tutto ciò che noi altronde conosciamo nella Natura, nella quale non vi è cosa cotanto esattamente regolare, che non abbia sempre qualche irregolarità e qualche variazione, ristretta per altro tra certi limiti.

Il Signor *Newton* e Signor *Leibnitz* sono stati i primi e soli che an ricercate le differenti gravità d' un Pianeta verso 'l Sole in differenti punti della sua Orbita; essi però l'an ricercate nell'ipotesi dell'

Et

Ellisse di *Kepler*, e passando da questa Ellisse alle altre Sezioni Coniche, an ritrovato in generale che l'azioni d'un' istessa forza centrale, tendente ad'un fuoco di qualunque seziion conica, sono tra di loro in ragion inversa de' quadrati delle distanze da detto fuoco al Corpo che descrive la seziion conica.

Questa Teorica, ristretta sin oggi nelle seziioni coniche, il Signor *Varignon* col suo Metodo distende in tutte le Curve possibili, qualunque ragione mai si voglia supporre fra i Tempi impiegati a scorrere differenti Archi.

Quindi siegue, che se conoscesi la Curva quale descrive un Pianeta, & i Tempi che corrispondono agli Archi differenti, in ciascun momento del suo Corso si può determinare la maggiore o minor forza della Gravità che lo pigne verso il Sole; e come più o meno rapidamente anderebbe verso quest' Astro in un momento più che in un altro, se fusse egli in un tratto libero da straniero costringimento che l'impedisce di andarvi, e lo tiene appiccato alla circonferenza d'una Curva. Sarebbe mai creduto che la Geometria avesse potuto giugnere lino a misurare nel Corpo di Saturno i differenti gradi d'una segreta e nascosta tendenza ch'egli ha verso il Sole, che l'è infinitamente distante?

Ne siegue ancora che se i Pianeti tendono verso il Sole, e che secondo le Osservazioni il loro moto sia realmente ineguale; egli è assolutamente impossibile ch'essi descrivano Circoli; e che per dar loro un moto uguale su di alcun' altra Curva, converrebbe supporre che in ciascuno istante del loro Corso tendessero essi ad un differente Centro, loche sembrerebbe dover esser impossibile secondo la Meccanica de' Cieli.

Non riman dunque altro che fare esatte Os-

servazioni su 'l corso de' Pianeti , poiche la Geometria ha fatto qualche dipendeva da se: Pronta ella porge tutte le desiderabili Curve , e l'Astronomia non dee farne altro che la scelta .

Quando anche (cosa molto verisimile) questi gran Corpi , che nuotano in un immenso fluido , non si attenessero mai esattamente alla circonferenza di una Curva ; e che 'l loro Corso non fusse più regolare di quel d' una Palla lasciata in abbandono in mezzo d'un rapido Fiume , dove ella sempre ora a dritta & ora a manca dichina ; per lo meno si avrebbe la Curva , che terrebbe il mezzo tra i maggiori discostamenti irregolari de' Pianeti , e che naturalmente sarebbe quella , a qual descrivere erano destinati .

Noi finora abbiain supposte le forze centrali che tendono ad un sol punto , ove in conseguenza concorrono le di loro direzioni ; e tali apparentemente son quelle de' Corpi Celesti nell' ampiezza di tutto il Vortice del Sole ; ma poicche possono supponerli in alcune forze centrali direzioni parallele , o ch' elle realmente le siano , lo che sarebbe difficile a rinvenir in Natura , o che possan tenersi per tali a cagione della gran distanza dal punto ove esse concorrono , come le direzioni de' Corpi gravi che tendono al Centro della Terra ; sarebbe mancata qualche cosa a questa Teorica , se non si fusse dato luogo a quelle forze centrali , che operano per linee parallele . Il Signor *Varignon* ben volentieri è venuto a considerarle , perciocche , dopo ch' egli ha discorso su di due linee che formano insieme un angolo acuto , non ha dovuto far altro che supporre detto angolo infinitamente acuto , perche le linee divenissero parallele , e d' una lunghezza infinita ; e li cambiamenti , che indi vengono , tosto si presentano sotto gli Occhi .

S U

L A M I S U R A

D E' T R I A N G O L I .

• **P**ER ritrovare la misura della superficie d' un Triangolo, bisogna conoscere alcuni angoli, & alcuni lati, donde si vengono a sapere gli angoli, & i lati sconosciuti. Se si sapessero i soli tre Angoli, non si potrebbe venire in cognizione d' altro che della proporzion de' lati tra loro, e non già della loro grandezza assoluta, che farebbe necessaria per la conoscenza della superficie del Triangolo. Se si conoscessero solamente i tre Lati, non sembrerebbe alle prime che potessero questi menare al conoscimento della superficie: *Theon* intanto, e molti altri Geometri dopo lui, anno sciolto questo Problema, in una maniera però confusa; e poiche egli è utile nella Geometria pratica, il Signor *De la Hire* ne fa la soluzione più semplice e più chiara.



su

• Vedi le Memorie pag. 88.

S U

LA QUADRATURA DEL CIRCOLO.

IL Signor *De la Motte*, Matematico, che aveà fatta imprimere una Quadratura del Circolo ritrovata dal Signor *Giuliano Potier* Cavalier' di *Malta*, alla quale egli avea aggiunta una spezie di Commentario secondo il suo gusto, avendo scritto all' Accademia per richiederle il sentimento su di tali dimostrazioni, le fe ella disaminare da' Signori *De la Hire* e *Varignon*, i quali non l'approvarono.

Il Signor *Varignon* dimostrò ancora l'errore di una Duplicazione di Cubo che detto Autore credeva di aver ritrovata.

In quest' Anno il Signor *Carrè* ha dato al Pubblico un Libro intitolato, *Metodo per la misura delle Superficie, e de' Solidi, loro Centri di Gravità, di Percussione, e di Dondolo, o Oscillamento, con l'applicazione del Calcolo Integrale*.

Il Calcolo Integrale è opposto al Calcolo Differenziale, e da lui procede. Poicche nella nuova Geometria, quale impiega questi due Calcoli, si concepisce che tutte le Grandezze finite si risolvono in Grandezze infinitamente picciole, che ne sonò o gli Elementi o le Differenze; l'arte di ritrovare queste Grandezze infinitamente picciole, di operar su di esse, e per loro mezzo scuoprire altre Grandezze finite, si chiama *Calcolo Differenziale*: E quel che rende la conoscenza dell' Infinitamente Piccio-
li sà

li sì utile e sì feconda, si è, che anno tra loro delle ragioni, ch'è le Grandezze finite, di cui son essi gl' Infinitamente Piccioli, non anno, e che per quelle stesse ragioni guidano allo scuoprimento di altre Grandezze finite. Per cagion di esempio, in una qualunque Curva le Differenze infinitamente picciole dell' Ordinata e delle Ascissa, anno tra loro la ragione non dell' Ordinata e dell' Ascissa, ma dell' Ordinata e della Sottangente; & in conseguenza l' Ascissa e l' Ordinata sole conosciute danno la Sottangente sconosciuta, o, ch' è lo stesso, la Tangente, purchè si passi per gl' Infinitamente Piccioli.

A farla corta, bisognerebbe che la Tangente o Sottangente conosciuta d' una Curva incognita desse gl' Infinitamente Piccioli dell' Ascissa e dell' Ordinata, che l' an prodotta, & in conseguenza l' Ascissa e l' Ordinata, che son Grandezze finite, la ragione delle quali dà l' essere alla Curva. Quest'Arte di ritrovare per mezzo delle Grandezze infinitamente picciole le Grandezze finite a chi esse si appartengono, si chiama *Calcolo Integrale*. Il Differenziale dal finito cala all' Infinitamente Picciolo, l' Integrale monta dall' Infinitamente Picciolo al finito. L' uno, per così dire, scompone una Grandezza, l' altro la rifà. Ma quelche l' uno scompone, l' altro non sempre rimette; e perciò l' Integrale è imperfetto, e finora almeno ristretto. Se lasciasse di esserlo, la Geometria farebbe giunta alla sua ultima perfezione.

Qualor si tratta di misurare una superficie, il Calcolo Integrale lo fa. La Base d' un Parallelogrammo moltiplicata per gli Elementi Infinitamente Piccioli della sua Altezza produce un Parallelogrammo Infinitamente Picciolo, quale è l' Ele-

Elemento d' un Parallelogrammo finito, e che vi è replicato un' infinità di volte, cioè tante, quanti punti sono nell' Altezza del Parallelogrammo finito. Per aver dunque questo Parallelogrammo finito per mezzo del suo Elemento, bisogna moltiplicarlo per detta Altezza, e così il Calcolo Integrale dall' Infinitamente picciolo monta al finito.

Egli è vero che questa operazione farebbe molto inutile, e questo Circuito d' Infinitamente piccioli molto vizioso per misurare solamente la superficie di un Parallelogrammo, che si fa semplicemente col moltiplicare la Base per l' Altezza; ma qualora si tratta di superficie terminate, o intieramente o in parte, da Curve, questo Metodo divien necessario, o dee almeno preferirsi a tutti gli altri.

Se si concepisca in una Parabola, per cagion di esempio, che lo spazio compreso fra due Ordinate infinitamente vicine abbia una porzione Infinitamente picciola dell' Asse, & un Arco Infinitamente picciolo d' una Curva; egli è certo, che questa Superficie infinitamente picciola non è un Parallelogrammo, perciocche le due Ordinate Parallele, che da un lato la terminano, non sono uguali, e l' Arco della Curva opposto alla picciola porzion dell' Asse non li è per lo più nè uguale nè parallelo: Frattanto per i principj della nuova Geometria, questa superficie, che non è un Parallelogrammo, puole in tutto rigor geometrico esser trattata come lo fusse, perciocche è Infinitamente picciola, & in conseguenza per misurarla, non convien altro che moltiplicare un' Ordinata della Parabola per la porzion dell' Asse infinitamente picciola che li corrisponde. Ecco l' Elemento della su-

superficie della Parabola , il quale per mezzo del Calcolo Integrale divenuto Infinitamente grande, o, ch'è lo stesso, cambiato in una grandezza finita, è la superficie intiera parabolica.

Questo vantaggio, particolare alla Geometria dell' Infinitamente piccioli, di poter senz' alcun errore trattare i piccioli Archi della Curva come linee rette, gli Spazj Curvilinei come i Rettilinei, &c., fa, ch' ella si drizzi con maggior facilità dell' antica Geometria alle stesse Verità, e più oltre ancora, dove l' antica non potea giugnere. Dalla maggior facilità nelle Operazioni, e dall' ampiezza maggiore nelle sue scoperte, nascono la semplicità, e l' universalità, che sole abbelliscono tutto.

I principj, & i ragionamenti, che la nuova Geometria in qualche maniera per privilegio impiega per le Linee e per le Superficie, l'impiega ella ancora per i Solidi. Una superficie, cui si dia un' Altezza infinitamente picciola, è l'Elemento d'un Solido, e quest' Elemento si trasforma col Calcolo Integrale in quest' istesso Solido.

I Centri della Gravità, della Percussione, e dell'Oscillamento, o del Dondolare, che formano una parte delle più difficili quistioni di Geometria, possono con quest' istesso Metodo risolversi, e vi divengono più facili le quistioni.

Dopo ch' il Calcolo Differenziale si è veduto rilucere nell' *Analisi degli Infinitamente Piccioli*, il Signor Carrè ha voluta dare un' idea del Calcolo Integrale poco ancor conosciuto. Quantunque e' si sia contenuto nella maniera la più facile e la più semplice d'applicarlo, non ha lasciato di darli una maggiore estensione.

ASTRONOMIA.

S U

L' ECLISSE SOLARE

DE' 23. SETTEMBRE 1699.

PER l'Eclissi della Luna si an facilmente le differenze della longitudine di varj luoghi; perciocche il momento dell' immersione della Luna nell' ombra della Terra, o della sua emersione, osservandosi l'istesso da tutti coloro che vedono l'Eclisse, due Osservatori, che siano in due differenti Meridiani, non devono far altro che notar l'ora che ciascun conta in detto momento, per avere indi la differenza de' loro Meridiani in ore, dopo di che è ben facile di averla in gradi.

Ma l'Eclisse del Sole non comincia nè finisce nell' istesso momento per tutti coloro che lo veggono: anzi per contrario tutte le Fasi son differenti nell' istesso istante a differenti Osservatori. L'uno ne vede il principio, mentre che l'altro ne vede il mezzo, o 'l fine; non porgendo egli Fale alcuna che sia loro comune, e su di cui possano essi assicurarsi che contano nell'istesso istante l'ora che in quel tempo è sotto'l Meridiano di ciascuno Osservatore: Perciò sinora non si è fatto uso alcuno degli Eclissi del Sole per la cognizione delle Longitudini.

La

La ragione di tal differenza tra l'Eclissi della Luna, e quelli del Sole, si è, che i primi son reali, e li secondi sono un'apparenza differente secondo i differenti punti di veduta.

Frattanto, a considerar le cose più da presso, il Signor *Cassini* ha ritrovata nell'Eclissi del Sole molta realtà da poterli far servire allo stesso uso che quelli della Luna; perciocchè se mai queste apparenze son differenti, ciò proviene da cause reali, che le determinano e regolano tutta la loro diversità. La difficoltà però si verteva in distinguere il reale dall'apparente, e fissare l'uno nel mezzo de' cambiamenti perpetui dell'altro. Ecco a un dappresso il Metodo del Signor *Cassini*, di cui non ne possiam noi dar'altro che una leggiera idea.

Bisogna concepire l'Orbita della Luna come una superficie che involge la Terra. I raggi che 'l Sole dirizza a tutto un Emisfero di questa, e con cui l'abbraccia, passano per quest' Orbita della Luna, e vi determinano una porzion circolare, che è la Proiezione o Rappresentazione del Globo terrestre illuminato. Dalla distanza del Sole, e dalla grandezza dell' Orbita della Luna riguardo a detto Globo della Terra, si sa qual'è la grandezza di detta Proiezione: Indi vi si descrivono geometricamente, e con regole conosciute, tutt' i Circoli della Sfera, l'Equatore, i Paralelli, i Meridiani, l'Eclittica, come essi devono esser rappresentati secondo il giorno di cui si tratta, perciocchè questo si cambia; e per cagion d'esempio stando il Sole nell' Equinozio, i due Poli sono nella circonferenza della rappresentazione del Globo terrestre illuminato, quando che se egli fusse in uno Solstizio, il solo Polo di questo lato sarebbe su 'l Globo, e vi sarebbe a 23. gradi della Circonferen-

2a. Supposto il Sole fisso, come vuol *Copernico*, può anche immaginarsi fissa questa rappresentazione, e ciascun luogo della Terra per lo moto diurno vi descriverà il suo Paralello, & avrà il mezzo giorno, quando e' sarà giunto ad un Meridiano unico & universale che vi sarà segnato. Quando dunque si saprà, che in qualche luogo, di cui sarà noto il Paralello, o Latitudine, si siano contate 9 ore in un certo momento, si saprà che sarà egli ben 3. ore lungi dal Meridiano universale, & in conseguenza in un certo punto del Globo.

Poiche questa Proiezione è fatta nell' Orbita della Luna, qual deve eclissare il Sole, la Luna col suo moto proprio passerà in questo Globo, e vi occuperà un certo luogo secondo la grandezza del suo diametro apparente. Il Sole ancora, il di cui diametro apparente l'è quasi uguale e noto, vi terrà pure un suo luogo.

Quelli che vedono il principio o'l fine dell'Eclisse, osservano i due diametri del Sole e della Luna come posti capo a capo; que' che vedono il mezzo di un'Eclisse centrale e totale, vedono i due diametri come esattamente uniti l'uno su l'altro; e così a proporzione di tutte le Fasi mezzane fra queste due.

Si descrive su la Proiezione la Traccia del moto della Luna, che facilmente con l'Astronomia si determina; è ancora facile il ritrovare quali saranno tutt' i punti di questa Traccia, ove sarà la Luna in ciascun'ora & in ciascun qualunque minuto, a rispetto d'un certo Meridiano, come, per cagion d'esempio, a rispetto di quel di *Parigi*.

Ogni luogo della Terra, che vede il principio dell'Eclisse, è in tal maniera posto su la Proiezione, che dal punto, ove egli è, alla Traccia della Luna, vi è l'estensione di due diametri del Sole e del-

e della Luna posti capo a capo.

Dunque se io sappia che una Città posta su 'l 30. Paralello, o avente 30. gradi di altezza di Polo, abbia veduto il principio dell' Eclisse a 9. ore del mattino, prendo su 'l 30. Paralello il punto ch'è distante dal Meridiano universale per tre ore; indi con un Compasso misuro l'estensione de' due diametri del Sole e della Luna, e ponendo una delle gambe del Compasso su 'l punto determinato del 30. Paralello, l'altra passerà su 'l punto della Traccia della Luna, ove questo Pianeta doveva essere quando detta Città vidde il principio dell' Eclisse.

Or poiche tutta questa Traccia è divisa a rispetto dell' Ore di Parigi, sò qual' ora era in Parigi quando la Luna era in detto punto; e la differenza delle Ore di dette due Città nell' istesso momento, è quella della loro Longitudine. Quelche si è detto del principio dell' Eclisse, facilmente si applicherà alle altre Fasi. Egli è chiaro che questo Metodo richiede la conoscenza della Latitudine del Luogo, dalla quale si troverà la Longitudine, cosa che gli altri Metodi ordinarij non richiedono; nella pratica però è ugualmente sicuro, & è stato molto più ingegnosamente immaginato. E' questo un vantaggio da risponderli alle Longitudini, che si ha dall' Eclissi Solari sinora tenuti inutili.

Avendo il Signor Cassini ricevute da alcune Città lontane le Osservazioni dell' Eclisse Solare de' 23. Settembre 1699, se n' è servito per conchiudere con tal Metodo le differenze della Longitudine tra dette Città e Parigi.

Dalle Osservazioni fatte a Nuremberg dal Signor Wurzelbaur egli conchiuse la differenza tra Nuremberg, e Parigi.

Anno 1700.

I

Alle

Alle volte di	34'	d' ora	19"
---------------	-----	--------	-----

Alle volte di	34		26"
---------------	----	--	-----

La grandezza dell' Eclisse osservata a *Nuremberg* fù di 10. dita $\frac{1}{4}$.

Dalle Osservazioni del Signor *Reiber* a *Kiel* in *Holstein*, egli conchiuse la differenza tra *Kiel* e *Parigi* di

	35'	45"
--	-----	-----

Vi fù in *Kiel* oscurità maggiore di quella che ordinariamente si osserva nel cader del Sole.

Dalle Osservazioni del Signor *Pyle* in *Gripwald* in *Pomerania*, conchiuse la differenza tra *Gripwald* e *Parigi*

Alle volte di	52'	45"
---------------	-----	-----

Alle volte di	52'	40"
---------------	-----	-----

In *Gripwald* a 10. Ore 22' apparve di non rimanere altro che quattro Minuti d'un dito del Sole, cioè, che di tutto il diametro del Sole diviso in 180. parti ne restò scoperta una sola. L' oscurità fù sì grande che non potevasi nè leggere nè scrivere, e furonvi Persone che viddero quattro Stelle, una delle quali fù *Venere* che si ritrovava nella parte Settentrionale del Sole, e le altre dovettero essere *Mercurio*, la Coda del *Leone*, e la Spiga della *Vergine*.

In *Stralsund* in *Pomerania* comparvero le Stelle come nella mezza notte.



S. II

L' ECLISSE

DELLA LUNA

De' 5. Marzo.

DOveva avvenire un' Eclisse totale della Luna a 5. di Marzo nel mattino, e 'l Signor *le Fevre* alcuni giorni prima ne presentò all' Accademia il Calcolo formato con le sue Tavole.

Il Principio a	5 ore 46' 47" del mat-
L'Immerzione totale	6 44 25. tino.
La Metà	7 33 15
Il Principio dell'Emerfione	8 22 5
Il Fine totale	9 19 43
La Durata intiera	3 33 56
La Grandezza	21 dita 12'

Cioè, che 'l diametro dell' Ombra, nel luogo per cui la Luna entrovvi, sorpassò tanto quel della Luna, o questa traversò l'Ombra sì obliquamente, che se in vece d'aver 12. dita, nelle quali sempre ella è divisa, ne avesse avute 21. $\frac{1}{2}$, vi farebbe ella ancora stata intieramente immersa, ma per un solo istante.

Secondo il Calcolo del Signor *le Fevre*, doveva la Luna tramontare in Parigi a 5. di Marzo ad ore 6. 26'. del mattino, e levarsi il Sole ad ore 6. 25'. e poiche l' Eclisse dovea cominciare a 5. ore 46'. 47", ne sequiva, che 'l principio sarebbe stato

I 2

vi.

visibile in Parigi, e la Luna si sarebbe eclissata circa 8. dita in tramontando.

Ebbe l'avvedimento il Signor *le Fevre* d'avvertire; che dovendo detto Eclisse farli vicino all'Orizzonte, ove le Refrazioni sono più irregolari, non dovesse sorprenderci se si scorgesse qualche differenza tra l'Osservazione e 'l Calcolo, e che questo poteva essere giusto senzache l'osservazione se l'accordasse intieramente, perciocche il principio della vera ombra su 'l Corpo della Luna essendo molto dubbioso, come quello che dipende dal giudizio dell'Osservatori, uno può giudicare che ella occupi un 30. del diametro della Luna, e l'altro no. Or una 30. parte del diametro della Luna è un minuto di grado, e la Luna, il di cui moto nel Zodiaco è molto rapido, scorre un minuto di grado in due minuti di ora; & in conseguenza un sì picciolo errore o differenza sì picciola nell'Osservazione produrrà nel Calcolo un errore o una differenza di due minuti d'ora, qual'è considerabile a rispetto della molta esattezza, che tiene oggi l'Astronomia.

Era questa fin a' nostri tempi sì poco esatta, che 'l Signor *le Fevre* affermò che le migliori Tavole pubblicate non potrebbero soddisfare alle apparenze in quattro Eclissi successive. Le famose Tavole Rodoline differirono col Cielo in 21. nell'Eclisse Solare del Mese di Settembre 1699., e di 16'. nell'Eclisse Lunare del Mese di Novembre 1696.

Ond'è che 'l Signor *le Fevre*, nel Calcolo ch'è fece dell'Eclisse della Luna de 5. Marzo prossimo, non si servì di dette Tavole, ma di altre particolari da lui fatte non ancora date in luce, quelle stesse, che aveva adoperate in tutt' i Calcoli dell'

dell' Eclissi rapportati all' Accademia fin da 8. o 9. Anni ; giacche in que' che avea dati nel suo Libro *del Conoscimento de' Tempi*, si era contentato delle Tavole Rodolfine di *Kepler* per la molta di loro stima .

Quest' Eclisse de' 5. Marzo , di cui su l' Orizzonte di *Parigi* poteva solamente vedersene circa il terzo della durata , molto imperfettamente fù veduto per detto breve tempo, e con gran pena, per le Nugole , da cui il Cielo fù quasi sempre coperto. Le poche Fasi , che li Signori *Cassini* e *De la Hire* poterono alla sfuggita notare , servirono ad avverar la giustezza del Calcolo del Signor *la Fevre* .

Poiche nel Calendario Gregoriano vi son sempre 3. centesimi Anni di seguito dopo il quarto, che non sono Bissestili , quantunque naturalmente dovessero esserli , e l' Anno 1700. n' era uno; il Signor *Cassini*, che ha ritrovata una Regola più facile di quella del detto Calendario per aver l' Epatta di questi Anni, volle vedere se l' Epatta che lui dava la sua Regola convenisse col giorno dell' Eclisse osservato . Secondo detta Epatta, il Plenilunio cadeva appunto a 5. di Marzo .

Aggiunse egli ancora molte riflessioni , l' intelligenza delle quali però suppone il profondo conoscimento del Sistema del Calendario Gregoriano, & inoltre un Periodo di 11600. Anni inventato dal Signor *Cassini* su 'l piano di detto Calendario, per rimettere sotto l' istesso Meridiano li Novilunj nel medesimo punto del Zodiaco, nell' istesso giorno della Settimana , e nell' Ora medesima . Si ritroverà un ampio spiegamento di detto Periodo su 'l fine delle Regole dell' Astronomia Indiana , di cui egli indovinò l' Enigmi quasi imperiscrutabili.

Questo stesso Eclisse de' 5. Marzo fù osservato

124 *Istoria dell'Accademia Reale*
 nel *Porto Reale* della *Martinique* dal Signor *Des Hayes*, che si era imbarcato col Signor *Renau* per l' *Isole Franzesi dell' America*, rinomato per molti altri Viaggi fatti per l'accrescimento delle Scienze. Il Signor *Des Hayes* osservò l' *Eclisse* con difficoltà per le spesse *Nugole* che cuoprivano la *Luna*: Poco prima delle 4. ore del mattino la vidde per traverso di esse, e l' osservò mentre cominciava a disbrigarfi dall' *Ombra*. Si lasciò vedere molte volte verso il fin dell' *Eclisse*, che fù ad ore 5. 2'. 40". dell' *Orologio* non corretto, quandoche 'l principio avea dovuto essere in *Parigi* ad ore 5. 46'. 47". Il fin della *Penombra* fù ad ore 5. 8'. 9".

La lettera del Signor *Des Hayes* al Signor *Casfini* con questa Osservazione, ne conteneva ancora molte altre delle *Altezze Meridiane* del *Sole*, o delle *Stelle fisse*, delle *Immerzioni*, o *Emerzioni* de' *Satelliti*, &c., le quali tutte sono nel *Tesoro* dell' *Accademia*, nè vi si tratterranno inutilmente.

S U

LE REFRAZIONI.

* SE le stesse cose da luoghi ben differenti si osservino, la *Natura* apparisce nuova in ciascun punto di veduta.

Le *Refrazioni*, che cambiano il luogo apparente di tutte le *Stelle*, fino a questi ultimi tempi anno ingannato tutti gli *Astronomi* come quelli che ben non

¶ Vedi le *Memorie* pag. 46. 49. e 94.

non l'avvisavano, & esse non permettevano loro di vedere altro che false Altezze, e false Distanze dall'Orizzonte. Quando cominciarono a diffidarsene & a conoscerle, si credè che tutta la di loro forza giungesse fino a 45. gradi di elevazione, di là de' quali si facea peniere di esserne liberi. Il Signor *Cassini* però ha dimostrato che giungano esse fino al Zenit, quantunque in estremo scemando, & aggiunte con ciò nuova esattezza a' Calcoli Astronomici.

Quando l'Accademia ebbe le Osservazioni fatte dal Signor *Richer* nella *Cayenne*, il Signor *Cassini* riconobbe che verso l'Equatore le Refrazioni Orizzontali erano minori di quelle del nostro Clima circa un terzo, differenza considerabile; che indi detta differenza andava sempre scemando fino a 60. gradi d' elevazione, dopo de' quali cessava quali intieramente fino al Zenit, e le refrazioni de' due Climi divenivano a un dappresso uguali.

Una conseguenza naturale di questa Scoperta si era, che le Refrazioni verso il Polo fossero maggiori delle nostre; ma qualunque ragione l'inducesse a supponerlo, si rimase su'l dubbio, attendendo Osservazioni su'l fatto. Felicemente queste si presentarono all' Accademia in un nuovo Libro a lei donato dal Sig. *Clement* Custode della Biblioteca del Re. Ha egli il titolo, *Refractio Solis in occidentis in Septentrionalibus oris iussu Caroli XI. Regis Svecorum, &c. a Joanne Bilgerg. Holmia 1695.*

Il Re di Svezia, nel 1694. stando in Torneo nella *Westbotnie*, qual'è nella latitudine di 65°, 45', vidde che'l Sole non era tramontato nel Solstizio della State; perlocche nell' Anno appresso inviò ivi de' Matematici per farvi più esatte e più sicure Osservazioni, che sono contenute in questo Li-

bro: I Signori *Cassini* e de la *Hire* deducono da esse, che in questa latitudine di $65^{\circ}.45'$ le Refrazioni Orizzontali devono essere quasi che doppie delle nostre, le quali innalzano le Stelle per un mezzo grado.

Il Signor *Cassini* ha scritto per aver dalla *Svezia* alcuni lumi necessari su le circostanze di questa Osservazione. Bisognerà oggimai che ciascun Clima abbia le sue Tavole particolari di Refrazione, per conoscere qual è rispetto ad esso l'errore delle altezze apparenti. Anticamente non sarebbersi posto in dubbio, che 'l Sole, qual vedevasi levare, non fusse già 'l Sole, ma una falsa Immagine che in suo luogo presentavasi, e che questa Immagine tanto più ingannasse, o più lungamente, quanto che si stasse più distante dall' Equatore. Questa differenza di Refrazioni secondo i Climi, è un nuovo affanno, & una nuova diligenza, di cui conviene che l' Astronomia si carichi.

Queste grandi Refrazioni del Settentrione sono molto utili a' Popoli che per molti Mesi non vedono il Sole, rendendò loro quest' Astro molto più presto di qualche naturalmente l' era conceduto a rivederlo, e stravolgendo verso di essi un lume che non se li doveva; fan le Refrazioni in alcun modo l' uffizio di Canali, che conducono l' acqua in luoghi dove il natural corso di questa nol portava.

Se la grossezza dell' aere, che cagiona queste grandi Refrazioni del Settentrione, vi fa ancora, come è molto verisimile, i Crepuscoli che a proporzione sianò maggiori de' nostri; facilmente si calcola che nella maggiore oscurità della notte di sei mesi, qual' è sotto al Polo, stando il Sole 23. gradi e mezzo sotto l' Orizzonte, i Crepusco-

scoli saranno ancora molto spessi anche senza Luna. L'aere grossolano, in cui vivono questi Popoli Settentrionali, con la grossezza sua istessi li rileverà da una porzione degl' incomodi ch' ella loro cagiona.

Cade in acconcio l' avvertire col Signor *De la Hire*, che l'aere del Settentrione, quantunque più denso, non è più greve del nostro, e che'l Barometro di *Stokholm* è come quel di *Parigi*.

Poiche le Refrazioni crescono con la grossezza dell'aere dall' Equatore sino al Polo, ne siegue che un Raggio, qual teneffe la sua direzione dall' Equatore verso il Polo, ugualmente sempre distante dalla Terra, soffrirebbe una Refrazione continua; & in conseguenza e' si rifrangerebbe ancora in passando da un Aere sottilissimo, qual' appunto è quello che resta, se pur ve ne resta, nella Machina Pneumatica, o pure da uno Spazio intieramente voto di aere, nell'aere che noi respiriamo. Perciò i Signori della Società Reale di *Londra* avendo fatta questa Sperienza, di cui il Figlio del Signor *Cassini* ce ne reca il rapporto, ritrovarono che un Raggio, qual passava dal Voto nell'Aere, frangevasi, e molto facilmente determinarono la quantità della refrazione.

Posto ciò, sapevano essi precisamente per mezzo delle Osservazioni come l'aere rifrange un Raggio obliquo, qual esce dalla materia eterea per penetrarlo; locche chiamarono essi Potenza rifrangente dell'aere: Comparavano tal Potenza con quella dell' acqua o di altri liquori, le Potenze rifrangenti di questi differenti liquidi con le loro gravità, &c. In fine potevano geometricamente seguire, in tutta la densità dell' Atmosfera il cammino de' raggi, & in conseguenza disegnare più esattamente che mai
la

la figura dell' ombra della Terra , diffinirne i limiti , e notar la distanza della Luna eclissata .

Tante nuove conoscenze che nascevano dalla Sperienza fatta in *Inghilterra* , e dall' altra parte la conclusione di quella che perfettamente si accompagnava con un commendatissimo raziocinio , crederono che rattenesse l'Accademia delle Scienze a non disaminarla , & a non rifare ciocche la Società Reale aveva fatto . Frattanto su di leggieri sospizioni che si ebbero di qualche difetto nella sperienza di *Londra* , si venne alla diliberazione di farne una più semplice e più sicura per l'istesso effetto .

Il Signor *Hornberg* saldò esattamente bene all' estremità d'un doccio un vetro piano perpendicolare all' Orizzonte, & all'altra estremità un altro vetro piano inclinato a questo 45. gradi . Adattò detto doccio nella Machina del voto allogata in una delle Sale dell' Accademia, che sporge su 'l Fiume, e scuopre la Sponda opposta distante circa 100. passi . Pose dirimpetto al doccio un Canocchiale ordinario, il di cui Asse a un da presso era su l'istessa linea retta di quello del doccio. Il Canocchiale nel suo fuoco avea due fili incrocicchiati ; Si ritrasse ben' esattamente tutto l'aere del doccio per mezzo della Machina Pneumatica ; dopo di che con molta diligenza si osservò un obbietto disegnato su la Sponda opposta, che precisamente corrispondeva all' Intersecazion de' fili del Canocchiale. Il Raggio, per cui mezzo questo obbietto era veduto, entrava prima nel doccio voto d'aere per lo vetro perpendicolare all'Orizzonte , & in conseguenza non si rompeva ; in uscendo però per lo vetro Inclinato 45. gradi veniva fuori obliquamente , e poichè passava dal voto all'aere , dovea fragnerfi , se vi era refrazione in questa mutazion di mezzo , e per contrario

rio non romperfi di vantaggio allorache non vi era cambiamento di mezzo ; & essendo l'aere rientrato nel doccio , il Raggio non traversava altro che aere . Così dopo di aver fatto rientrar l'aere nel doccio , l'istesso obietto non doveva più corrispondere all' intersecazion de' fili del Canocchiale . Ma pur e' vi corrispose sempre . Fù replicata più volte l'Osservazione da differenti Osservatori, e da que' dell' Accademia che erano i più addestrati ad osservare , quali sempre rinvennero che un istesso obietto distante non variava in modo alcuno , o che 'l raggio, per cui era veduto, passasse per lo voto e per l'aere , o ch' e' passasse solo per l'aere .

Sembrava quasi incomprendibile che due Mezzi così differenti , qual'è 'l Voto , o la Materia sottile , e l'Aere non cagionassero alcuna refrazione, e fossero indifferenti alla Luce , qual per altro è , a dirla , così delicata su 'l cambiamento del Mezzo, ch' ella s'infrange in passando da un aere ad un' altro , per poco ch' e' sia più o meno grossolano . A considerar però la cosa da presso , forse non è impossibile che le refrazioni celesti si facciano non già nel passaggio dalla Materia Eterea alla nostra Atmosfera , ma in quello da uno Strato superiore dell'Atmosfera ad uno inferiore più denso . Egli è vero che richieder si potrebbe , perche l'estrema differenza tra la Materia Eterea e l'aere non produca refrazione, e la minor differenza tra un aere & un altro la produca . Per questo però si converrebbe un Sistema , per cui non è oggi ancor tempo . Basta che l'Esperienza di Parigi, quantunque men probabile di quella di Londra , men ad una conclusione non impossibile . Il miglior partito sarà il disaminarle di nuovo tutte due, poi-

poiche ne' fatti della Fisica il più probabile non ha diritto assoluto di decidere, e talvolta ancora ciocche sarebbersi creduto impossibile si ritrova vero, malgrado del raziocinio.

S U

LA LUNGHEZZA

DEL PENDOLO.

• **S**E bisognasse giustificare il ripetimento continuo delle Osservazioni, e provare, come già abbiain fatto con l'esempio delle Rifrazioni Settentriionali, che non si possono fare osservazioni in luoghi molto differenti, sarebbe facile a dimostrarlo con questa Lettera, di cui abbiain parlato, che il Sig. *Des Hayes* scrisse dalla *Martinique* al Sig. *Cassini*, e con le Osservazioni del Figlio del Sig. *Couplet*.

Avvisava detto Sig. *Des Hayes* al Sig. *Cassini*, che nel suo viaggio dell' *America* non solamente aveva egli avverata la celebre Scoperta del Signor *Richer*, il quale avea osservato che l'Pendolo a secondi era più corto verso l'Equatore di quello ch'è qui; ma che ancora egli giudicava su di molte forti conghietture che detto Pendolo fusse più corto di qualche il Signor *Richer* asseriva. Forse questo Signore non avea osato fidarsi intieramente alla sua Osservazione, e ne avea scemata qualche cosa, per esser' ella troppo nuova e troppo improvvisa.

Che

• Vedi le Memorie pag. 207.

Che che ne sia, il Figlio del Signor Couplet nel ritorno del viaggio da Portogallo e dal Brasile si ritrovò uniforme col Signor Des Hayes su la necessità d'accortare il Pendolo verso l'Equatore, molto più di quello che 'l Signor Richer avea fatto.

Il Pendolo, che batte i secondi col moto mezzano, è in Parigi di tre piedi 8. linee $\frac{1}{2}$.

Il Signor Richer essendo nella Cayenne 4. gradi lungi dall'Equatore, osservò, che per battere i secondi secondi dovea questo Pendolo esser più corto una linea $\frac{1}{2}$; e 'l Figlio del Signor Couplet essendo in Lisbona, la di cui Latitudine è secondo le sue Osservazioni di $38^{\circ} 45' 45''$, lo rinvenne più corto che in Parigi in 2. linee $\frac{1}{2}$, cioè più corto che nella Cayenne istessa, quale ha 24. gradi di Latitudine meno di Lisbona: Et in Parayba Città del Brasile, la di cui Latitudine è, secondo lui, di $6^{\circ} 28' 18''$, dall'altra parte dell'Equatore, ritrovò il Pendolo più corto che in Parigi in 3. linee $\frac{1}{2}$.

Poiche le Operazioni necessarie per determinare la lunghezza del Pendolo son lunghe e delicate, e richiedono Istrumenti molto giusti e più grandi di que' che avea il Signor Couplet, non dee si attener precisamente a questa misura; ma in generale sembra fermo, che la lunghezza del Pendolo vada scemando da quì verso l'Equatore, e che possa cominciarfi ancora a credere ch' ella si stremi più di qualche prima si pensava. Le conseguenze di questa Scoperta si fan quali siano.

1. Servirà ella per regolare in appresso gli Orologj a Pendolo secondo il Clima dove alcun sia; nè vi è cosa sì necessaria a tutte le Osservazioni, &c a tutt' i calcoli Astronomici, quanto d'avere gli Orologj regolati con tutta la giustezza possibile.

2. Supposto che 'l Pendolo debba esser accor-

ta,

tato ne' Climi più vicini all' Equatore, fassi ciò perche e' corra così veloce, come un Pendolo più lungo che batte i Secondi in Parigi. Per conseguenza un istesso peso cade più lentamente verso l'Equatore, e la sua Gravità ivi è minore; cosa molto importante per lo Sistema della Gravità, ad indovinar la quale il raziocinio non è arrivato.

3. Se la Gravità nasce dalla materia eterea, che cercando discostarsi dal Centro della Terra vi respigne i Corpi meno atti di essa ad un gran moto; questa forza, che secondo l' osservazioni deve essere ineguale, non potrebbe esser tale, se l'azion sua fusse circolare; & in conseguenza la materia eterea non forma un circolo intorno alla Terra: Ma la linea, ch' ella descrive intorno a questa che gira con lei su del suo Asse, è l'istessa con quella della circonferenza della Terra; dunque la circonferenza di questa non è circolare dall' Equatore a' Poli, o nella parte d'un Meridiano.

4. L'ineguaglià del Pendolo determinata bene una volta, sarà la medesima con quella dell'azione della forza centrale della materia eterea; e con le Regole del Signor *Varignon* si avrà la Curva della superficie della Terra nella parte d'un Meridiano. Il Signor *Huygens* di già ha trattato questo stesso nel suo discorso della Gravità. Ritrova egli l'Equatore più grande d'un Meridiano, in maniera che la Terra sarà piana nella parte de' Poli. Una linea di differenza del Pendolo, che nella *Cayenne* si era osservata, li diè luogo di cambiar la figura della Terra; altre maggiori differenze, se mai sian vere, la faranno più notabilmente cambiare.

S U D I U N A
C O N G I U N Z I O N E
D I V E N E R E
C O L S O L E.

N On si conobbe alla prima tutto 'l giova-
mento de' Telescopj per l'Astronomia. Si
vedeva ne' Pianeti qualche non si era mai veduto, si
ravvisava un numero infinito di nuove Stelle, e chi
non sarebbesi contentato di tanti vantaggi? E pure
i Canocchiali ne dovevano recare un altro conside-
rabile agli Astronomi, che col tempo, lo sentirono:
Era quelli il vedere i Pianeti, e le Stelle fisse a pie-
no giorno, anche nel Meridiano, col Sole, purché
fussero esse d'una certa grandezza. Per un verso ac-
crescendo i vetri del Canocchiale l'immagine
dell'Astro, e per l'altro impedendo il doccio, qual
è oscuro, ch'egli non sia dal pieno giorno offusca-
to, l'Astro comparisce malgrado del Sole.

Quindi si determina immediatamente la si-
tuazion del Sole a rispetto delle Fisse che nell'istef-
so tempo si vedono, quando che prima non si ri-
trovava se non se per mezzo de' Calcoli; e si può
ancora immediatamente paragonare, e con molta
maggior certezza, il moto de' Pianeti con quello
del Sole; infine torna sempre miglior conto all'
Astro-

• Vedi le Mem. pag. 355.

Astronomia il vedere e l'osservare, che 'l calcolare e dedurre. Per trar profitto da tal vantaggio, il Signor *De la Hire* su 'l fin del Mele d' Agosto, quando Venere doveva essere in congiunzione col Sole, alcuni giorni prima e dopo detta congiunzione osservò il passaggio di Venere per lo Meridiano, qual' ella traversava poco lungi dal Sole. In questa maniera determinò, con una esattezza che ogn' altro Metodo non avrebbe potuta mai dare, la congiunzione di Venere in longitudine a 5. ore 8'. 18". della sera de' 31. di Agosto.

Osservava detto Pianeta con un eccellente Canocchiale di 16. piedi, quale accrescevasi di lui diametro 90. volte; e poiche questo alla veduta semplice compariva d' un sol minuto, col Canocchiale diveniva tre volte maggiore di quel della Luna veduta a nudi occhi. Venere, per la sua situazione a rispetto del Sole e della Terra, era necessariamente delicatissima Crescente, e 'l Sig. *De la Hire* nella parte inferiore della Crescenza ravvisava dell' inequaglianze, e, se si voglia, de' Monti molto maggiori di quelli della Luna, li quali a proporzione sono più grandi di que' della Terra. Non v' è cosa che più vivamente possa riflettere il lume in lunghe distanze, quanto un ammasso di Roccie molto alte e nude; e forse tal disposizione sì scabrosa contribuisce a rendere Venere sì brillante e sì vaga da lungi.



S U
L E M A C C H I E
D E L S O L E.

UN Astro, che fusse ugualmente luminoso in tutta la sua superficie, girerebbe intorno al suo centro senza che noi potessimo giammai avvedercene. Giova a noi che vi sian delle Macchie, cioè parti che si fan distinguere dalle altre, alle quali possiam appigliarci per ravvilare il giramento di tutto il Globo su del suo Asse.

Alle Macchie del Sole osservate col Telescopio dobbiam noi la scoperta, che detto Astro in 27. giorni & alcune ore fa il giro intorno al suo centro. Ma poiche esse sovente svaniscono per tempi considerabili, tosto che di nuovo compariscono, si ripigliano le Osservazioni con una tutta nuova attenzione, per divisare se la rivoluzione di 27. giorni sia stata esattamente bene determinata.

Inoltre se mai si scuopra alcuna cosa su la natura del Sole, tutto devesi ad esse. Il Sig. *De la Hire* conghiettura che le Macchie quali si vedono, tutto che di figura sì varia, nella maggior parte sian una soda massa molto più grande della Terra, e che altro moto non faccia nel Corpo liquido del Sole, se non se di galleggiare alle volte su la superficie, & alle volte d'immergersi o intieramente o in parte. Ha egli osservato che le Macchie,

quali.

* Vedi le Mem. pag. 354.
Istor. 1700.

quali appariscono le più divise, non lo son mai tanto che non possano essere porzioni d' un' istessa irregolar massa, di cui si vedano differenti eminenze; in fatti egli non ha mai osservate in un' istesso tempo Macchie nell' uno e nell' altro orlo del Sole. Alcune volte appariscono esse in un subito verso la metà dell' Astro, senza cominciar a farsi vedere verso gli orli; & allora an quasi che sempre tutta la loro grandezza, nè si veggono crescere a poco a poco, come poi si osserva che impiccoliscono. Quello Fenomeno si accorda con un Corpo immerso in un liquido, qual tutto in un subito rivenga a galla.

Qualora dopo molti Anni, ne' quali non si faran vedute Macchie alcune, si ricominci a vederne, per ordinario si osservano in quell' ora & in quella parte del Sole, nella quale dovevano comparire supposta la rivoluzione di 27. giorni; locche dimostra che questa gran massa, le di cui diverse apparenze formano le Macchie, non sia errante e vaga su 'l Corpo del Sole, ma come arrestata in alcun luogo di esso. Frattanto perche vi sono alcune volte Macchie, il di cui apparimento non vada d'accordo con la rivoluzione di 27. giorni; bisogna ammettere molte masse differenti, che vi corrispondano.

Per quel che appartiene alla differenza delle figure, può ella risondersi alla gran massa che in tempi differenti si presenti ora per un lato & ora per un' altro, e che in un' istesso tempo a poco a poco s'immerga, e possa avere qualche moto intorno al suo centro.

Perfciocche le differenti apparenze d'una Macchia o d'un' ammassamento di Macchie, site nel mezzo o verso l' orlo del Sole, si fanno dalla diffe-

ren-

rente loro posizione su di un Corpo Sferico: Quella ch'è su gli orli , per cagion d'esempio , apparirà più lunga , quella ch'è nel mezzo, più corta e più raccolta, &c.

Se malgrado di tutto ciò si voglia, che le Macchie siano generazioni novelle, dovrà formarli un' altra idea del Sole : Rassomiglierà egli piuttosto ad un liquore impuro che getta e leva le schiume, che ad un Mare in cui nuoti un Corpo straniero : Ma come in questo Sistema potranno spiegarli tanti sì regolati ritorni d'un'istessa Macchia , e dopo tanti Anni ?

Cheche ne sia , il Sistema delle Macchie ben ristabilito sarà quello che metterà noi in istato da formare alcune conghietture su la natura del Sole .

Dopo che 'l Signor *De la Hire* avvisò l'Accademia a 13. di Novembre di aver veduto delle Macchie , proseguì col Telescopio ad osservarle quanto mai potè, come il Sig. *Cassini* nello stesso tempo facea in *Lingua'doca* , ove egli era allora ; quali Osservazioni tutte si rimettono come in deposito tra le mani del Pubblico , perche servano un giorno ad un Sistema, il quale , secondo le apparenze , farà l'Opera di più d'un Secolo.



S U L A
P R O L O N G A Z I O N E
D E L L A M E R I D I A N A
D I P A R I G I .

N On v'è cosa più nota in tutt'i luoghi ove son Matematici, quanto l'Istoria della Misura della Terra, che per ordine del Re cominciò l'Accademia nel 1669, e proseguì l'Anno appresso dal Paralello d'*Amiens* sino a *Malvoisine* ne' confini del *Gatinois* e di *Hurepoix*, cioè sino al valore di più d'un grado Celeste. Di là si rinvenne, che un grado Celeste corrispondeva sopra la Terra alla lunghezza di 57060. passi del gran *Châtelet* di *Parigi*.

Conosciuto una volta il valor di un grado, non bisogna far altro che moltiplicarlo per 360., e si tien la circonferenza del Globo terrestre, se però detto valore di un solo grado sia molto esatto; perciocchè se vi è errore, questo si moltiplica 360. volte, e divien con ciò considerabile, quantunque prima fusse molto leggiero.

Or egli era quasi impossibile che non fusse scorso qualche errore nelle operazioni che si eran fatte. 1. Era convenuto su la distesa di circa 22. leghe misurare 12. Triangoli. 2. Nelle due estremità della Meridiana, che si era determinata, era bisognato prender le Latitudini su 'l Cielo; ma con i migliori Istrumenti, e con la maggiore giustezza d'operazione, niuno può comprometterli che quat-

tro secondi del grado Celeste ragguagliati sopra la Terra vagliano più di 66. Passi.

Essendo quali inevitabile l'errore, non poteva farli altro che renderlo men sensibile col tirar una Meridiana più lunga di quella del Paralello d' *Amiens à Malvoisine*; poiche non riesce più difficile il prendere la differenza della latitudine di due luoghi più lontani, che di due più vicini; E le Operazioni Astronomiche non produrrebbero sempre al più altro errore che di 66. Passi, quali in una lunghezza di 10. gradi, per cagion di esempio, si moltiplicherebbero 36. volte, quandochè in un grado solo essi verrebbero a moltiplicarsi per 360. volte: E per i Triangoli, che servivano a misurare le distanze sopra la Terra, non erano essi quasi più sottoposti ad errore nelle maggiori distanze, quantunque il numero ne fusse più grande.

Importava moltissimo all'Astronomia, Geografia, e Navigazione, che la Misura della Terra fusse la più esatta che mai far si potesse. Perciò il Re ordinò, che si prolungasse infin all'estremità della Francia, ver Mezzogiorno e ver Settentrione, la Meridiana che li era cominciata. Questa nella lunghezza di un grado Celeste, che teneva, era la maggior Opera, che la Geometria pratica avesse mai intrapresa; e col distenderli fin a quella di 10. gradi, diviene la più utile a proporzione del suo accrescimento.

L'Accademia continuò quest' Opera sino al 1683. Il Sig. *Cassini* s'avviò per la parte di Mezzogiorno, e'l Sig. *De la Hire* per quella del Settentrione; l'impresa però su le prime fu interrotta da differenti cagioni particolari, indi dalla Guerra che cominciò nel 1688. Terminata questa, il Re che

era sollecito a favorir generosamente le Scienze, diè nuovi ordini per la continuazione della Meridiana, e'l Sig. *Cassini* partì nel Mese di Agosto del 1700. per ripigliarla dove l'avea lasciata verso Mezzogiorno. Portò seco tutti gl'Istrumenti, e tutti gli Osservatori che potevano bisagnarli, e'l suo Viaggio fu degno della magnificenza del Re.

Continuò egli sempre a misurare le distanze terrestri col Metodo de' Triangoli, e s'imbattè in difficoltà che non mai finora si erano incontrate in tal faccenda. Era la Meridiana passata sempre per luoghi, ove si ritrovavano Campanili o grandi Alberi, a' quali poteansi dirizzar gl'Istrumenti per formar i Triangoli; ma su le nude Montagne dell'*Auvergne*, per dove il Sig. *Cassini* era menato dalla Meridiana, mancavano questi sensibili e determinati segni, e perciò li convenne di far trasportare e piantare grossi Alberi su di dette altezze con infinita pena. In ciascun punto notabile o comodo della Meridiana, egli ha presa la latitudine del Luogo per mezzo delle altezze degli Astri. Quando si determinerà la differente latitudine delle due estremità della Meridiana ne' due confini della Francia, si rimarrà più sicuro della giustezza di queste due operazioni finali, se le latitudini di molte parti della linea unite insieme vi corrisponderanno, e forse ancora le une serviranno a regular le altre.

Quantunque per la diligenza & esattezza, che si teneva nelle operazioni de' Triangoli, potesse il Signor *Cassini* esser certo di non aver traviato dalla Meridiana cominciata, cioè da quella dell'Osservatorio, e' però volle assicurarsene con un'altro Metodo. Osservava quante volte poteva gli Eclissi de' Satelliti di Giove, mentrech' il Sig. *De la Hire* nell'istesso tempo l'osservava dall'Osservatorio, ove
erasi

erati rimasto per fare queste Osservazioni corrispondenti; e supposto che l'ora quando avvenivano l'Eclissi in questi due luoghi differenti fusse precisamente la stessa, i due luoghi erano certamente sotto l'istessa Meridiana.

E' si sa che queste Osservazioni dell'istesso Eclisse d'un Satellite fatte in differenti luoghi siano il miglior Metodo per metter in agguaglio la longitudine di detti due luoghi: ma ancora diverse osservazioni fatte in quest'istessi luoghi, & insieme comparate, non dan quasi mai sì precisamente l'istessa ragion di longitudine, che non vi sia l'errore di alcuni secondi di differenza, perciocche ne' migliori istrumenti vi son sempre piccioli inevitabili divarj, anche nelle Operazioni le più esatte.

Or il Sig. *Cassini* comparando la Meridiana che avea in *Auvergne*, per cagion d'esempio, col Metodo de' Triangoli, con quella che risultava dalle Osservazioni dell'istesso Eclisse fatte nell'istesso tempo in *Auvergne* & in *Parigi*, ha ritrovato che queste non differivano l'una dall'altra più che la Meridiana dell'Osservatorio differisca da se stessa nel risultamento di varie Osservazioni d'Eclissi de' Satelliti in differenti tempi.

L'esattezza è ancora passata oltre. Il fu Sig. *Picard* dell'Accademia delle Scienze ritrovandosi in *Sette* & in *Montpellier*, vi avea fatté le Osservazioni dell'Eclissi de' Satelliti, e dal paragone di questi istessi Eclissi osservati nell'istesso tempo in *Parigi* avea egli dedotta la differenza de' Meridiani tra queste due Città e *Parigi*, & in conseguenza la differenza de' Meridiani tra loro. Essendo il Signor *Cassini* in *Languedoc* misurò col Metodo de' Triangoli la differenza de' Meridiani di queste due Città, e la ritro-

vò precisamente la stessa con quella che si era avuta per mezzo de' Satelliti.

Di là egli conchiuse, che avea tutta la certezza geometrica possibile che la linea Meridiana dell' Osservatorio fosse la stessa con quella d' *Auvergne*, e di altri luoghi; e che 'l Metodo de' Triangoli, tenuto da lui per tirare la Meridiana, e misurare una estensione terrestre, sia così esatto, come quello dell' Eclissi de' Satelliti, il più esatto di tutti li Metodi Astronomici per avere le differenze de' Meridiani ne' gradi celesti.

Il Metodo dell' Eclissi tiene un gran comodo, cioè di non essere sottoposto a maggior errore per le distanze grandi che per le picciole; ma 'l Sig. *Cassini* pretende che 'l Metodo de' Triangoli non soggiaccia ad un sì grande errore per le picciole distanze, che son le sole nelle quali può adoperarsi.

Quando 'l Sig. *Cassini* si ritrovava su le alte Montagne, vi osservava le altezze del Barometro, per compararle con quelle in cui nell'istesso tempo il Barometro dell' Osservatorio sarebbe montato. Si sa altronde che nell' altezza dell' Osservatorio, o di *Parigi*, più eminente della superficie del Mare, il Mercurio per ordinario sia quattro linee più basso di quel ch' è nel lido del Mare: si sa ancora che 'l Mercurio si abbassa una linea in ogni 11. passi di altezza; di là facil cosa sarà a conchiudere, quanto le Montagne, dove si sarà fatta l' Osservazione, sianò elevate al di sopra della livella del Mare: conoscenza, che può essere in molte occasioni profittevole.



S U 'L

CALENDARIO.

UN movimento che in quest'Anno si è fatto in *Allemague*, e che riferivasi in alcun modo all'Accademia delle Scienze, ha ben dimostrato di qual'importanza sia l'Astronomia in alcune occasioni per l'affari Ecclesiastici e Politici.

La Riforma del Calendario Gregoriano, quantunque necessaria e ben pensata, non fù ricevuta da' Protestanti, come quella che veniva da Roma. Ann'essi continuato a servirsi dell'Anno Giuliano, che prima tenevasi nella Chiesa, e che continua vie più ad allontanarsi dalla positura del Cielo, come lo era nel tempo del Concilio di Nicea, dal quale si ebbe la disposizione su la Festa di Pasqua.

Il fine del XVII. Secolo risvegliò su di tal materia l'attenzione de' Stati Protestanti dell'Imperio. Volevano essi nel principio del nuovo Secolo accordarsi con lo Stato del Cielo, e di concerto tutti disposero, che 'l Mese di Febrajo dell'Anno 1700. fusse di soli 18. giorni, risegando appunto que' 10. giorni, che 100. Anni prima da Gregorio XIII. furono scemati; e che in conseguenza si contasse il primo di Marzo col Calendario Gregoriano, e per tutto il XVIII. Secolo si proseguisse ad andar di accordo con detto Calendario, a rispetto dello Stile delle date, e delle Feste immobili. In fine, o per regolare la Pasqua, e le altre Feste che da questa dipendono, più esattamente di quel che può averfi da

da un Calendario, e da' Cicli, sempre soggetti ad alcuni errori, perche non si ragguagliano giustamente gli anni con gli altri; o per non tener cosa alcuna da Roma; Risolvero, che si determinasse immediatamente con l'Astronomia l'Equinozzio di Primavera.

Fu dato l'incarico al Sig. *Leibnitz* di consigliarsi con l'Accademia su la maniera da far questa determinazione Astronomica. Scrisse perciò egli una lettera da *Hanover* agli 8. di febbrajo 1700.

Dopo di aver esposto il fatto, come noi abbiam riportato, aggiugnere egli, che siccome altre volte la Chiesa per mettere in esecuzione i Canoni del gran Concilio di Nicea, e per avere il vero tempo Pasquale, era ricorsa a' Matematici d'Alessandria; così conveniva nell'occasione presente di seguir gli avvisi di Astronomi eccellenti: e poiche il Re con una magnifica fondazione, di cui non vi era esempio ancora sinigliante nella Cristianità, avea stabilita per sempre l'Accademia delle Scienze, questo era un soccorso che Sua Maestà su di tal materia dava alla Chiesa, da cui conveniva trar profitto. Proponeva indi i pensamenti che alcuni avevano fatti su'l soggetto che si trattava.

Il Signor Conte di *Pontchartrain* riconobbe questo affare sì importante, che volle conferirlo col Re: Tanto più che su 'l cambiamento, che si era fatto in Allemagna, si cercavano in Roma i mezzi per una intiera Conciliazione su 'l Calendario, e la Congregazione de' Riti vi s'adoperava. Ordinò il Re che l'Accademia non parlasse di quel che si trattava in Roma; e se in altra guisa poteva soddisfare a qualche se li domandava, lo facesse con libertà.

Felicamente il Signor *De la Hire* era su 'l punto

di pubblicare le sue Tavole de' Moti de' Pianeti, e perche dovevano essere più esatte di tutte quelle che finora si son vedute, rispose l'Accademia al Signor *Leibnitz* che ella non conosceva cosa migliore a farsi, quanto l'attendere dette Tavole.

Avea il Refatto scrivere al Sig. *Principe di Monaco* suo Ambasciadore in *Roma* qualche era avvenuto in *Francia* su l'affare del Calendario, e detto Sig. *Principe* rispose al Sig. Conte di *Pontchartrain* con lettera de' 2. Agosto 1700. di avere egli parlato su di tal faccenda col Sig. Card. *Spada*, che infinitamente avea commendata l'attenzione del Re per la Corte di *Roma*; soggiugnendo che la Congregazion de' Riti non diffinirebbe cosa alcuna senza consigliarla con l'Accademia delle Scienze, molto più illuminato su di queste materie di qualche siasi in Italia.

Terminando il Secolo in quest'Anno, l'Accademia avvertì che *Argolo* non avea distese le sue Efemeridi più lungi, e che del Secolo, qual s'incominciava, non vi erano Efemeridi, poiche non potean tenerli le copie di quelle di *Mezzavacca*. Ella diede il pensiero al Figlio del Sig. *De la Hire* di formarle per l'Anno appresso, e così di mano in mano nel finir di ciascun Anno calcolar le altre per qualche seguiva. Si addossò egli questa fatica, servendosi delle Tavole Astronomiche del Signor suo Padre, che dovevano tra non molto uscir alla luce. Anno dette Efemeridi del Figlio del Signor *De la Hire* il vantaggio di esser le prime calcolate su le nuove Osservazioni, e godono di quella perfezione che da certo tempo sperimenta l'Astronomia.

GEO.

GEOGRAFIA.

UN naufragio avvenuto in quest' Anno su le Coste di *Picardie* è stato di considerabil perdita per l'Accademia delle Scienze. Ritrovavali su'l Vascello il Figlio del Signor *Couplet*, che ritornava da *Portogallo*, e dal *Brasile*, ov'era egli andato con lo spirito di Osservazione che portan seco gli Accademici da per tutto. Per fortuna e' si salvò dal naufragio, ma tutte le sue Carte, e le cose più curiose ch'ei recava, si perdettero. Non rimase altro frutto del suo viaggio, che alcune lettere scritte da lui al Signor *Cassini*, o ad altri, nelle quali faceva rapporto di alcune delle sue Osservazioni. Raccolse egli queste lettere nel suo ritorno, e presentò all'Accademia quelle poche Osservazioni che avea potuto ritrarne.

Abbiám parlato di quelle che riguardano la lunghezza del Pendolo, rimane ora a dir di alcune altre che si appartengono alla Geografia.

Fra le molte Osservazioni de' Satelliti ch'ei fece in *Lisbona* nel 1698., ve n'è una che fù fatta nell'istesso tempo in *Parigi* dal Signor *Cassini*. Era questa una immersione del primo Satellite nell'Ombra di Giove a 7. di Maggio. L'Osservazione fù esatta. Il Signor *Couplet* si servì d'un Canocchiale di 17. piedi del Signor *le Bas* dell'istessa perfezione appunto che quello del Signor *Cassini*. Dal paragone delle Osservazioni di *Parigi* e di *Lisbona* si ha la differenza della longitudine fra queste due Città di 12°. 57'. 45".

Questa differenza si ravvisa nelle Carte di *Sansons*

* Vedi le *Mém.* pag. 207.

son più grande in $52^{\circ} 15'$, e nelle nuove Carte Marittime per ordine del Re 6. Anni sono impresse, più picciola in $27^{\circ} 45'$.

Di già si è detto, che 'l Signor Couplet ritrovò la latitudine di *Lisbona* $38^{\circ} 45' 25''$ per mezzo delle due altezze Meridiane della Stella Polare. Osservò ancora che a 26. Dicembre 1697. l'Ago calamitato dichinava in *Lisbona* $4^{\circ} 10'$ N. O., & in *Parayba* nel mese di Maggio 1698. $5^{\circ} 35'$ verso l'istessa parte.

DIOTTICA.

S O P R A

D' U N N U O V O

C R I S T A L L O

D I T E L E S C O P I O .

Il Signor *Tschirnhaus*, che molto si studia per la perfezione della Diottica, avendone già dato un bel saggio rapportato nell' Istoria del 1699. *, ha dimostrato a' Savj gli effetti d'un nuovo Cristallo da lui fatto.

E' questi convesso per tutte due le bande, e 'l suo fuoco è di 32. piedi, straordinario invero per la

ta grandezza del suo diametro ; quandochè i maggiori Cristalli dell' istesso fuoco finora adoperati non an di diametro che 4. o 5. dita , questo ha più d'un piede del *Reno* , e prima ne avea due , che per dannoso accidente bisognò stremare : Quindi può formarli giudizio qual doveva essere la Machina dal Signor *Tschirnhaus* immaginata per lavorar sì gran Cristallo.

Dagli effetti ch'è produsse sembrava esser posta sopra tutta la Diottica . Per cagion di esempio , si lascia nel Canocchiale picciola apertura alle Obiettive ordinarie, quantunque molto picciole; ma 'l Sig. *Tschirnhaus* lascia il suo, così grande come egli è, intieramente scoperto.

Per comprendere la ragione della pratica comune, e della singolare del Sig. *Tschirnhaus*, bisogna saper bene come si faccia l'immagine d'un punto luminoso nel fuoco d'un Cristallo convesso, traversato da' raggi . Supponiamo che questo Cristallo sia un intiero Emisferio ; i raggi , che 'l punto luminoso drizza sopra tutta la superficie di questo, non già si riuniscono, dopo di averlo traversato, su d'un sol punto del suo Asse , come potrebbeli immaginare stando su' termini di fuoco e di riunione ordinariamente adoperati in questa materia : occupano essi per contrario molto maggiore spazio, quantunque molto minore della superficie dell'Emisferio su la quale erano essi prima diffusi ; così quantunque non siano essi esattamente riuniti , sono però più stretti gli uni contro gli altri di quel che erano . Vi è di più . Nell'ampiezza di questo spazio ch'essi occupano , sono inegualmente ristretti , meno verso l'estremità , e molto più verso il mezzo , cioè verso l'Asse dell'Emisferio , e questi possono esser quelli che intieramente si riunisco-
no.

no in un punto . Questi raggi a un da presso raccolti su l'Asse son que' ch'erano entrati verso l'Asse , cioè verso 'l mezzo dell' Emisferio ; e poiche tutti gli altri che piombano su 'l rimanente della superficie malissimamente si riuniscono , si risega tutto il rimanente dell' Emisferio , conservandone il mezzo per far l'Obiettiva . Vi è ancora altra osservazione a farli . I raggi infranti naturalmente formano de' Colori e delle Iridi , se per mezzo della refrazione non siano riuniti , o almeno estremamente ristretti gli uni contro gli altri . Così un'Obiettiva , qual' è un picciol avanzo dell'Emisferio , pure ordinariamente è molto grande ; perciocche ella verso gli orli riceve raggi , quali dopo esser infranti non si raccozzano molto , e formano delle Iridi assai incommode agli Osservatori . Perciò si cuoprono gli orli dell'Obiettiva , lasciando vi una picciola apertura circolare intorno al suo Asse .

Non approva il Signor *Tschirnaus* questa Pratica nell'apparenza sì ben fondata , e pretende che nell'Ottica vi siano molti altri errori che converrà distruggere . Egli non risega cosa alcuna dalla gran superficie della sua Obiettiva , forse perche tiene alcun segreto che ancora non iscopre . E' certo che riuscirebbe cosa molto vantaggiosa di dare una maggiore apertura alle Obiettive , purchè da ciò non sopraggiungessero degl'inconvenienti , perciocche verrebbero più raggi da un' istesso punto .

L'Obiettiva del Signor *Tschirnaus* puol'essere impiegata senza dell'Oculare : e questo ancora è un gran vantaggio ; perciocche quanti più Cristalli tiene il Canocchiale , tanti più raggi riflettono su la loro superficie , che vengono a perdersi per l'Osservatore . Perciò egli allicura che gli obietti si veg-
gono

gono più chiaramente col suo Cristallo solo, che con gli altri Canocchiali. Afferma ancora ch' essi appajono più chiari di quel che sogliono alla semplice veduta, quantunque necessariamente su 'l suo Cristallo si facciano delle riflessioni de' raggi, qual perdita però chiaramente è più compensata dal gran numero di essi raggi d'un istesso punto, che la grand'ampiezza della sua superficie e del fuoco fa entrar nell'occhio.

Questo Cristallo può adoperarsi senza doccio, in una maniera diversa da quella che 'l Signor *Huygens* ha data nella sua *Astrosopia*; perciocchè l' Obietto si vede sempre distintamente, malgrado de' raggi del Sole che passano tra lui e l'occhio.

Il Campo, cioè lo Spazio, che può in una fiata con tal Cristallo vedersi, è d'incredibil grandezza. Afferma egli, che senza doccio & Oculaze, ha veduto distintamente a pieno mezzo giorno una Città intiera nella distanza d'un Miglio e mezzo d'*Allemagne*.

Tante singolari cose del Cristallo di questo Signore fan presagire grandi e felici novità nella Diottica. Quantunque tale Scienza appena oggi nasca, fa stupire che si possano in lei ancora fare sì importanti scoperte: Cotanto in questo Secolo siam addestrati al corso rapido delle Scienze.



ACUSTICA.

S U L L A D E T E R M I N A Z I O N E D I U N S U O N O F I S S O.

LA Scienza che riguarda il Senso dell' Udito non è forse men' ampia di quella che ha la Veduta per oggetto, quantunque sinora sia stata meno a fondo trattata. La necessità che i Filosofi anno avuta de' *Telescopj*, e de' *Microscopj*, l'ha costretti a studiare con una estrema applicazione su i differenti cammini & i varj accidenti della Luce; ma poiche non anno avuto l'istesso bisogno di conoscere esattamente tutto ciò che si appartiene a' Suoni, avendo per lo più trattata la Musica come cosa di piacere, di cui non dovevasi troppo avvacciar l'uomo a cercarne le Regole nel fondo della Filosofia, non an perciò rivolto a questa parte le loro speculazioni.

Quindi è che il Signor *Sauveur* ha stimato questo un Paese poco ancora conosciuto, e pur ritrovava egli tale Scienza più vasta quanto più vi s'innoltrava, & ha creduto che meritasse, non men che l'*Ottica*, un nome particolare, ond' è che l'ha chiamata *Acustica*. Il numero e l'important-

za delle nuove scoperte giustifica questo nuovo nome; e qualche si è veduto del Signor *Dodart* in questa Istoria * su la formazione della voce, può limitarsi per una porzione dell'Acustica.

Ogn' un sa che per avere tutti gli accordj Musici su di due Corde d'Istrumento, della stessa materia, ugualmente grosse, e distese ugualmente, non conviene far altro che rendere le loro lunghezze proporzionali in certa ragion di numeri. Per cagion d' esempio, se le due corde supposte, quali noi in appresso supporrem sempre, siano uguali in lunghezza, faranno esse all' Unisono; se siano come 1. a 2., formeranno l'Ottava; se come 4. a 5., la Terza maggiore; come 3. a 4., la Quarta; come 2. a 3., la Quinta &c.

Poiche quelli principali accordj son formati da tali ragioni che anno tra di loro le lunghezze delle Corde, egli è chiaro, che altre ragioni, per cagion d' esempio di 8. a 9., di 15. a 16., &c., daran degli altri accordj. E poiche le ragioni de' numeri son infinite, sembra alla prima che gli accordj della Musica debbano così essere, e lo farebbero in fatti, se le Voci e gl' Istrumenti non fossero necessariamente ristretti tra certi limiti, e se l'Orecchio non lo fusse ancora in maniera, che al di sotto di un certo tuono basso, o al di sopra di un certo tuono alto, non val' egli a distinguere que' che farebbero più bassi o più alti.

E' vero che in questa estensione, dove le Voci e gl' Istrumenti possono giugnere, e dove l'Orecchio può distinguere i tuoni, sembra che si potrebbe fare un'infinità di accordj, dando sempre alle lunghezze delle corde, quantunque ristrette tra' certi limiti, tali ragioni di numeri quali vorrebbonfi, per cagion di esempio, quella di

929. a 930. , di 1000. a 1001. , &c. Queste ragioni però son sì picciole, che due Corde, quali tra di loro l' avessero , produrrebbero l' istesso effetto che se fossero uguali , cioè apparirebbero unisone ; perciocchè in trattandosi dell' Orecchio , ch' è un Organo materiale , non può discernere differenze egli cotanto minute e raffinate .

Prima che una Corda, la di cui lunghezza è 2., sia accortata sino ad essere 1., cioè ad esser l' Ottava alta del Tuono che prima rendeva , può ella passare per tante divisioni quante se ne vorranno . Il Signor *Sauveur* determina questo numero di divisioni a 43., e queste 43. parti, ch' egli chiama *Merides*, cioè Partimenti , e che compiono l' estension dell' Ottava, rendono i tuoni i più sensibili e più ordinarij che vi sian compresi. Se però si voglia venire a differenze di tuono molto più delicate , bisogna dividere ciascuna Meride in 7. parti , che diconsi *Eptameridi* , & in conseguenza in un Ottava vi faran 301. *Eptameridi* . Questi numeri di 43. e di 301. an de' comodi e degli usi tali , che il Signor *Sauveur* l' ha preferiti a tutt' gli altri che avrebbe potuto scegliere : ma presentemente non entriamo in tal quistione .

Una Corda più corta fa in un tempo uguale maggior numero di vibrazioni che un' altra più lunga , e da ciò addiviene che rende ella il tuono più acuto . I numeri delle vibrazioni di due Corde ineguali sono tra di loro in ragione inversa delle lunghezze , cioè, se le due Corde sono come 1. a 2., come 2. a 3., 3. a 4., &c., la più corta fa due vibrazioni mentreche l' altra ne fa una, 3. mentreche l' altra ne fa 2., &c.

Quindi è chiaro che le vibrazioni di due Corde uguali devono andar sempre insieme , co-

minciare , finire , ricominciare nell' istesso istante; quelle però di due Corde ineguali devono essere alle volte separate, alle volte riunite , & altrettanto più lungamente separate quanto i numeri che esprimono l' inegualità delle Corde son maggiori : Poiche se due Corde siano come 1. a 2. , e comincino esse nell'istesso tempo le loro vibrazioni, egli è certo che dopo due vibrazioni della più corta e della più acuta , & una dell' altra , ricominceranno esse ad andar di concerto , e così su di due vibrazioni della più corta vi sarà sempre una riunione di vibrazioni di tutte le due . Se elle fossero come 24. a 25., vi sarebbe la riunione delle loro vibrazioni in ogni 25. vibrazione della più corta ; & egli è chiaro , che ne' maggiori numeri le riunioni sarebbero ancora più rare .

Finora queste altro non sono che ragioni , che non fan conoscere cosa d' assoluto . Bisogna fissare un termine , al di sopra del quale si prende la serie de' tuoni acuti , & al di sotto quella de' tuoni gravi . Riesce molto facile lo sceglierlo ad arbitrio , la difficoltà però stà a ritrovarlo sicuramente quando se ne ha bisogno .

I Musici si servono d' una spezie di Zufolo di legno , o di metallo d' una certa lunghezza, per determinare il tuono , al quale l' Istrumenti e le Voci devono accordarsi in un Concerto ; e poiche vogliono essi che detto tuono sia sempre lo stesso , suppongono che'l Zufolo sempre lo renda tale .

Questa supposizione però non è esattamente vera . 1. Un doccio d' Organò di 4. piedi , che di per se stesso è molto più giusto d' un picciolo Zufolo , non rende sempre l' istesso suono precisamente . 2. Essendo la materia del Zufolo capace di alterazione, il sol-ulo che se ne fa, il tempo, cento acciden-
ti,

ti, ne cambiano sensibilmente il tuono dopo alcuni Anni . 3. Egli è certo che soffiando con maggiore o minor forza in un Zufolo, s'alza il tuono o si abbassa, nè con sicurezza può sempre darli l'istesso soffio . In fine, perduto detto Zufolo non può averli più quel tuono che si era determinato .

Quest' inconvenienti an mosso il desiderio al Signor *Sauveur* di poter determinare con maggior sicurezza un Suono fisso; & eccone l' idea .

Quando sentasi accordar l' Organo , e due Canne, quali si avvicinano all' Unifono, suonino insieme , vi sono alcuni istanti , ne' quali il comun suono, ch'esse rendono , è più forte , e questi istanti sembrano ritornare in uguali intervalli . Avendo il Sig. *Sauveur* ricercata la cagione di questo Fenomeno, ha immaginato con un' estrema verisimilitudine, che'l suono delle due Canne insieme debba avere maggior forza quando le di loro vibrazioni, dopo di essere state per alcun tempo separate, vengano a riunirsi , e si accordino a percuotere l' Orecchio con un istesso colpo . E' sembra ancora che l' espressione comune de' Musici , quali dicono , che le Canne *battono*, quando il di loro suono ancor si raddoppia , abbia la sua origine in questa idea . Riesce comodo che le Canne si avvicinino all' Unifono, perciocchè allora essendo maggiori i numeri quali esprimono le di loro lunghezze, sopra di un maggior numero di vibrazioni separate vi son meno vibrazioni che s' incontrano , e che battono ; & in conseguenza l' Orecchio più facilmente si accorge delle pulsazioni che son più rare, e distinte da maggiori intervalli .

Se si prendessero due Canne tali, che gl' intervalli delle di loro pulsazioni fossero tanto grandi che si potessero misurare con le vibrazioni d'un Pendolo,

saprebbe esattamente dalla lunghezza di questo quanta sarebbe la durata di ciascheduna delle vibrazioni ch'è farebbe, & in conseguenza quella dell'intervallo di due pulsazioni delle Canne. Altronde saprebbe per la natura dell'accordo delle Canne, quante vibrazioni farebbe l'una mentre che l'altra ne produce un certo numero determinato; poichè questi due numeri sarebbero compresi nell'intervallo di due pulsazioni, di cui si conoscerebbe la durata, si saprebbe precisamente quante pulsazioni ciascuna Canna farebbe in un determinato tempo. Or appunto questo, cioè il determinato numero di vibrazioni fatte in un tempo determinato, fa un certo tuono; e poichè le ragioni delle vibrazioni di tutti i tuoni son conosciute, si saprebbe quante vibrazioni ciascun tuono fa in quest'istesso tempo determinato.

Ecco sin dove l'industria umana non avea potuto ancora giugnere. Sapevasi che una Canna faceva determinato numero di vibrazioni nell'istesso tempo che un'altra ne produceva un altro numero determinato; ma qual'era questo tempo? non se ne sapeva cosa, nè stimavasi possibile a saperlo, perciocchè il nostro senso non giunge a misurare tal sorta di vibrazioni.

Il Signor *Sanveur* ha prese le pulsazioni delle due Canne come due punti fissi e sensibili, tra quali era compreso ciocchè sinora è stato insensibile & indeterminato.

Essendo dunque per esperienza fissato il tempo durante il quale si fan le vibrazioni di un certo tuono, e conosciuti altronde i numeri delle vibrazioni che fan gli altri tuoni durante l'istesso tempo, il Signor *Sanveur* prende per Suono fisso quello che farà 100. vibrazioni in un Secondo, e chiama

ma Ottava fissa acuta quella ch'è al di sopra, & Ottava fissa grave quella ch'è al di sotto.

Questo Suono fisso può facilmente ritrovarsi in tutti tempi, & in tutti luoghi, con l'esperienza delle pulsazioni di due Canne, che guiderà sicuramente ad un suono tale che farà 100. vibrazioni per Secondo; di maniera che il tuono dell' Opera di *Parigi* essendo determinato per mezzo di tal Suono fisso, si avrà precisamente ancora nella *China*: Nè importa che le due Canne, su delle quali si farà la fondamentale sperienza delle pulsazioni nella *China*, sian del' istessa lunghezza, grossezza, e della istessa medesima con quelle di *Parigi*; basta che da due docci, qualunque siano, si abbia un suono qual faccia 100. vibrazioni per Secondo: questo suono è sempre lo stesso indipendentemente dagl' Istrumenti che lo producono, e tutta la sua natura consiste in questo numero determinato di vibrazioni in un Secondo.

Quando il Signor *Sauveur* comunicò tutti questi pentamenti all' Accademia, volle tosto ella assicurarsi della sperienza delle Pulsazioni, e nominò alcuni Accademici perche la disaminassero. Il Signor *Sauveur* egli stesso ne rese conto, e confessò che per questa volta non l'era ben riuscita, quantunque altre volte & in presenza de' più abili Musicisti di *Parigi* erasi osservata giustissima & infinitamente precisa. La difficoltà di rifarla, l'apparecchio che bisognava per questo, altre più gravi occupazioni del Signor *Sauveur*, & altre ricerche ancora su l' Acustica, che convenni fare, per l'unione che avevano esse col Suono fisso, fecero che la faccenda si rimanesse quì. E' però si sa, che su'l fatto di sperienze non bisogna facilmente scoraggiarsi, come quelle che anno, per così dire, i loro capric-

ci, quali si superano col tempo. In aspettando che l' Accademia ripigli questo affare, si propone egli quì a' Musici, come una sperienza che dovrebbero essi verificare, & ad ogn'altro ancora, almeno come un pensiero.

E per meglio far conoscere quanto ella meriti di esser fatta, aggiugnerò quì alcune conseguenze che si dedurrebbero dal Suono fisso una volta stabilito, per rapporto o alla Teorica della Musica, o alla Fisica generale.

Il Signor *Sauveur* ha sperimentato, che una Canna d'Organo di circa 5. piedi, rendeva il Suono fisso; & altronde una Canna di 40. piedi produceva il Suono il più grave che potesse mai distinguersi. Questa Canna di 40. piedi, essendo 8. volte più lunga di quella di 5., fa 8. volte meno vibrazioni in un Secondo; e poiche quella di 5., secondo l'Ipotesi del Suono fisso, ne fa 100., siegue da ciò, che il tuono più grave che l'Orecchio possa distinguere fa in un Secondo 12. vibrazioni e mezza.

Parimente, se la Canna la più corta, di cui si possa distinguere il Suono, sia di un dito meno una sedicesima parte, cioè sia alla Canna di 5. piedi come 1. a 64., il Suono il più acuto farà in un Secondo 6400. vibrazioni.

Quindi si vede tra quali limiti vien ristretta la facoltà che ha l'Orecchio di distinguere i tuoni; si vede qual'è il punto donde quest'Organo comincia a sentire le differenze di essi, e quello dove non più l'avverte; e poiche questa ragione di 12. $\frac{1}{2}$ a 6400. è come quella di 1. a 512., può conchiudersi, che l'Orecchio sia capace d'uno scuotimento di sensazione da un certo grado sino ad un altro superiore 512. volte.

Qualche si è detto della Canna d'Organo può
adat-

adattarsi alle Corde degl' Istrumenti , poiche queste possono essere aggiustate all' Unifono con quel doc- cio che si vorrà .

Le vibrazioni delle Corde sono sensibili , ma non già quelle delle Canne . Si può molto bene con un Microscopio osservare il moto che fa una Corda pizzicata per mezzo , cioè la durata delle sue vi- brazioni . Se detta Corda rende il Suono fisso , que- sto cammino moltiplicato per 100. è l' intero spazio che il mezzo della Corda scorre in un Se- condo .

Le prime vibrazioni d' una Corda pizzicata son molto più grandi delle ultime, quantunque tut- te siano d' ugual durata ; e quindi nasce che 'l Suo- no sempre dolcemente vada indebolendo sino al fi- ne , senza che 'l tuono si muti . Bisogna dunque nell' Osservazion precedente procurare di saper il cammino che fa il mezzo della Corda nelle prime vibrazioni, quando il Suono è più forte, e quello che fa nelle ultime quando è più debole . Ha sperimen- tato il Signor *Sauveur* che il mezzo d' una Corda, qual rendeva il Suono fisso , & avea il suo diametro di un sesto di linea, nelle sue ultime vibrazioni sen- sibili faceva $\frac{1}{4}$ di linea , & in conseguenza presso a 6. linee in un Secondo , e nelle prime vibrazioni 72. volte più di cammino , cioè 3. piedi per Se- condo .

I tuoni gravi fanno in un tempo uguale meno vibrazioni che i tuoni acuti, ma quelli le fanno più grandi, e se, come è molto verisimile, questa gran- dezza delle vibrazioni compensa precisamente il di- fetto del numero, tutte le Corde di $\frac{1}{4}$ di linea di dia- metro , in qualunque tuono ch' esse sian , fanno l' istesso cammino in un Secondo, che la quella qua- le rende il Suono fisso .

La

La quantità del movimento è 'l prodotto della massa di un Corpo per la sua velocità. Le Corde, che noi quì supponiamo dell' istesso diametro, e di lunghezze differenti, poiche esse sono in differenti tuoni, ion Cilindri, che tra di essi sono come le di loro altezze, o lunghezze. Ann'esse tutte la medesima velocità, perciocche fanno l'istesso cammino nel medesimo tempo: dunque le di loro quantità di movimento son come le di loro lunghezze: dunque le Corde di un tuono grave anno maggior quantità di movimento, e ne imprimono più all' Orecchio, ma i colpi che vi fanno son meno stretti, e, per così dire, men affollati l' un su l' altro. Lo Scuotimento dunque più picciolo, ma più vivo, è quello che fa il tuono acuto; e'l men vivo, ma più grande, quello che fa il tuono grave; e le differenti combinazioni de' gradi di vivezza e di grandezza dello Scuotimento fan tutt'i tuoni. Può immaginarsi una spezie d' estensione, qual cominci per lo tuono il più grave, cioè per lo Scuotimento il più grande e men vivace: da detto termine la grandezza và sempre scemando, e la vivacità crescendo, fino a tanto che in fine la vivacità sia la più grande, e la grandezza picciola quanto si possa più fare. Nel punto di mezzo li ritrovavan esse nell' egualità.

Dalle sperienze fatte dal Signor *Sauveur* per determinare i' Suono fisso, ha egli avvertito, che quando due Canne facevano un tale accordo che non pulsavano più di 6. volte, cioè quando le loro vibrazioni non si rincontravano che 6. volte in un Secondo, queste pulsazioni vi si distinguevano con molta facilità. Dunque in tutti gli accordj, ove le vibrazioni si rincontrino più di 6. volte per ogni Secondo, le pulsazioni non saran sensibili, & allo 'ncontro si sentiranno esse con altrettanta maggior

age-

agevolezza , quanto le vibrazioni si rincontreranno meno di 6. volte per Secondo . Così per lo Sistema del Suon fisso riesce facilissimo a determinare quante volte in un Secondo si rincontrano le vibrazioni di quell' accordo che si vorrà .

Per cagion d' esempio , se una Corda è all' Ottava alta di quella che rende il Suon fisso , farà ella 200. vibrazioni in un Secondo, mentre che l'altra ne farà 100., e le di loro vibrazioni si rincontreranno 100. volte, lo che è ben lungi dal rincontrarsi 6. volte . Se detta Corda è all' Ottava bassa di quella del Suon fisso , farà ella 50. vibrazioni per Secondo , e le di loro vibrazioni si rincontreranno 50. volte . Se ella è alla Seconda Ottava bassa , le vibrazioni si rincontreranno 25. volte , & infine converrà ch' ella sia alla quarta Ottava bassa perche le vibrazioni si rincontrino 6. volte .

E' dunque impossibile che si sentano le pulsazioni in una qualunque Ottava . Se ella è più alta del Suon fisso , assolutamente è impossibile; se ella è più bassa , bisognerà un Istrumento che cali alla quarta Ottava bassa del Suon fisso , come farebbe , per cagion di esempio , una Canna d'Organo di 80. piedi , poiche una di 5. rende il Suono fisso . Or senza metter in conto la smisurata grandezza dell' Istrumento , abbiain noi veduto che l'Orecchio non può distinguere tuoni più bassi di quelli d' una Canna di 40. piedi . Così , se una Corda di 3. piedi rende a un da presso il Suono fisso , ve ne bisognerebbe una di 48. piedi , ch' è impraticabile .

Le pulsazioni non piacciono all' Orecchio per cagion dell'ineguaglianza del Suono, e si può credere con molta probabilità , che quel che rende l'Ottave sì aggradevoli sia perche non vi si sentono mai le pulsazioni .

Non

Non lasciando questa idea , si ritrova che gli accordj , di cui non possono sentirsi le pulsazioni, son quelli appunto che i Mulici dicono Consonanze ; e quelli che fan sentire le loro pulsazioni , Dissonanze ; e che quando un accordo è dissonante in una certa Ottava, Consonante in un'altra, ciò avviene perche egli pulsa nell' una , e non già nell'altra ; e perciò egli vien tenuto per Consonanza imperfetta . E' molto facile , secondo i principj del Signor *Sauveur* quì posti, il conoscere quali accordj pulsano , & in quali Ottave Soprane o Basse al Suon fisso . Se questa Ipotesi è vera , scuoprirà ella l'origin propria delle Regole della Composizione finora sconosciute alla Filosofia , la quale si rimettea quasi che intieramente al giudizio dell' Orecchio . Questa sorte di giudizj naturali, tutto bizzarri che talvolta sembrassero, non lo sono in fatti; anno essi delle Cause realissime , il conoscimento delle quali si appartiene alla Filosofia, purchè ella se ne possa impadronire .



MECANICA.

S U

LA FABRICA

DEGLI OROLOGJ.

• Quando il Signor *Huygens* scoprì che le vibrazioni fatte secondo gli Archi della Cicloide, tutto che ineguali esse fossero nell' estensione, erano però sempre d'una ugual durata, comprese bene che se un Pendolo si adattasse ad un Orologio, e se li facessero descrivere Archi di Cicloide, modificherebbe le inegualità inevitabili dell' Orologio; perciocchè qualora i differenti principi di tali inegualità farebbero fare al Pendolo vibrazioni più grandi o più picciole, farebbe queste in virtù della Cicloide in tempi perfettamente uguali, e così registrerebbe sempre ne' movimenti dell' Orologio questa perfetta uguaglià de' tempi, supposto ch' egli la governasse.

La difficoltà però si era di far descrivere ad un Pendolo Archi di Cicloide; perciocchè venendo egli appiccato ad un punto fisso, di sua natura non può descrivere intorno a detto punto che Archi di Circolo. Il Signor *Huygens* ritrovò ancora questo segreto, che ora non v'è chi nol sappia. La Ver-

ga

• Vedi le Memorie pag. 195.

ga di ferro, che sostiene il Pendolo con l'ultima sua estremità di basso, è attaccata per l'estremità alta ad un fil di seta tra due piccioli Archi di Cicloide fatti di metallo. Il moto delle vibrazioni adatta senza rifinar mai all' uno o all' altro di detti Archi questo filo, ch'è molto flessibile, e si acconcia esattamente alla loro figura; e perciò si è dimostrato in Geometria, che 'l peso nell' altra estremità della Verga appiccato descrive esattamente un' altro Arco di Cicloide. Ecco un de' più ingegnoli e più celebri ritrovati d' un Secolo, che ne ha prodotto molti.

Si è con ciò creduto che non vi fosse cosa più a desiderare su l' arte di misurare i tempi, come in fatti i buoni Pendoli d' oggi giorno non si ritrovano in molti giorni mancanti neppur d' un solo Secondo, cioè della 3600. parte d' un' ora.

Frattanto, poiche giova il non contentarsi mai, & una certa inquietitudine filosofica, qual non crede mai di esser giunta alla perfezione, è solamente capace di pervenirvi, il Signor *De la Hire* confessa di non disperare di potere perfezionar la pratica degli Orologj.

Questo fil di seta, al quale si sospende la Verga del Pendolo, con l'umido s'accorta, e con la secchità si dilunga, ond' è che 'l Pendolo fa lo stesso. Or col cambiarsi la lunghezza del Pendolo, egli fa più o meno vibrazioni in un istesso tempo, e perciò l'esatta giustezza di tutta la Machina si distrugge.

Aveva il Signor *De la Hire* immaginato di mettere in luogo del fil di seta una laminetta a molla molto leggiera e molto flessibile, quale si sarebbe adattata con l'istessa facilità a' piccioli Archi di Cicloide, lungi dall' esser sottoposta alle istesse

al;

alterazioni dell' aer secco o umido . Ma egli sperimentò , che 'l freddo rendeva la molla della laminetta più dura e le sue vibrazioni più spesse , che 'l caldo faceva un' effetto contrario , che l'uno e l'altro operavano con maggior violenza che il secco o l'umido su la seta, e che in fine l'Orologio era perciò più irregolare.

Trattasi quì del Pendolo a' Secondi, cioè di quello che fa una sola vibrazione per ogni Secondo ; ma se questo fusse un Pendolo più corto , e che in un Secondo facesse due vibrazioni , allora l'accrescimento o diminuzione del numero delle vibrazioni cagionato dalle irregolarità della laminetta a molla , cadendo su d'un maggior numero di vibrazioni , diverrebbe insensibile rispetto a tal numero ; e farebbe vantaggioso l'adattar la laminetta ad un Pendolo a mezzi Secondi , maggiormente ne' viaggi per mare , dove le vibrazioni del Pendolo appeso ad un fil di seta soggiacciono molto ad esser interrotte da' differenti moti del Vascello .

Vorrebbe in fine il Signor *De la Hire* , che 'l Pendolo a' Secondi si appendesse ad una Verga dura e forte in tutta la sua lunghezza . Egli è vero che per questo sembrerebbe egli di non curare intieramente la Cicloide; crede però, e con la prova ancora , che le vibrazioni secondo gli Archi di Circolo si facciano parimente in tempi esattamente uguali , purché non siano esse d'una grande estensione ; & in fine, se credasi che non si possa far a meno della Cicloide , ha egli immaginata una maniera molto delicata & assai sottile di adattarla ad un moto, qual sembrerebbe non potersi fare che per un Circolo . Si avrebbe dunque tutto 'l vantaggio che dà noi la Cicloide, senza l'inconveniente del fil di seta,

Quan-

Quantunque le Mostre, picciole e portatili come elle sono, non possino esser mai ridotte alla giustezza de' grandi Orologj, non bisogna però lasciare di dar loro tutta quella di cui son capaci. Quando un Pendolo, che descrive piccioli Archi di Circolo, o qualsivogliano Archi di Cicloide, in tempi ugua'i fa vibrazioni d'inequale estensione, perciò egli rende le grandi più velocemente a proporzione, e le picciole più lentamente. Per l'istessa ragione una Molla posta in moto, qual faccia le sue vibrazioni più grandi o più picciole, secondo ch'ella è più o meno dura, e che maggiore o minor moto ha ricevuto, fa queste in tempi viciniissimi agli uguali, purché l'ineguaglianza della loro estensione non oltrepassi certi limiti. E siccome si son adattate le vibrazioni d'un Pendolo a' grandi Orologj per regolare le ineguaglianze de' loro moti, così ancora si è pensato d'applicare allo Spirito delle Mostre, quale ha movimenti molto inequali, una Molla che li corregga coll'egualità della durata delle sue vibrazioni.

Questa Molla ordinariamente è contorta in Spirale, affinché nello spazio picciolo, in cui si restringe, abbia ella molta lunghezza, e 'n conseguenza assai forza da non lasciarsi vincere, e trasportate dall'ineguaglianze dell'istesso Spirito, che deve regolare. Bisogna che questi due Pezzi facciano vibrazioni a un da presso dell'istessa grandezza, che l'un l'altro non si disturbino ne' loro moti, e si adattino in maniera, che la Molla nella durata delle sue vibrazioni più regolare dello Spirito non faccia altro che comunicarli la sua regolarità quando occorre.

Dalla maniera come sinora la Molla spirale è
sta-

stata applicata, giudica il Signor *De la Hire* che debba ella esser vinta dallo Spirito, e che questa sia una delle cagioni perche le Mostre son poco giuste: Propone perciò un'altra maniera di adattare la Molla, sicche avrà ella sempre forza superiore.

Propone ancora un'altra figura di Molla; è questa piegata ad onde, affinche in picciolo spazio sia molto lunga, & assai dolce.

Quelle correzioni che si fanno su le Invenzioni conosciute e stabilite, fanno invero minor sensazione all'animo di qualche fecero l'istesse Invenzioni, le quali avevano il risalto della novità; ma talvolta son esse nè men utili, nè men ingegnose. Quanto più una prima invenzione si accosta alla perfezione, di cui ella è capace, tanto più quel poco che li manca è a noi importante, e questo poco è altrettanto più difficile a scoprirsi quanto che di per se stesso è men visibile, e men si cura a cercarlo.



S U D I U N
ISTRUMENTO UNIVERSALE
P E R L A N C I A R
L E B O M B E.

• **N**on bastò alla Geometria l'aver determinato che le Bombe e le Palle da Cannone descrivono nell'aere Parabole; bisogna ancora che ella immagini Strumenti, per cui mezzo una certa Parabola particolare descritta da una Bomba vada a rincontrarsi con quel punto che si vorrà, cioè, per dirla in breve, che la Bomba colpisca al segno. Perciò il fù Signor *Blondel* dell' Accademia delle Scienze, dopo di avere stabilita, nel Libro ch'egli ha composto su di tal materia, tutta la Teorica del getto delle Bombe, vi aggiugne diverse Costruzioni d'Istrumenti.

Non riesce sì difficile l'immaginar Pratiche le quali corrispondano perfettamente alla Teorica, quanto il renderle molto semplici, & assai comode, perche se ne faccia comun uso, tanto più se ve ne siano altre, quantunque meno semplici e meno comode, quali erano prima stabilite; perciocche essendo poco abili e men attenti generalmente quelli che le mettono in esecuzione, la prima difficoltà che se li presenta in ciò ch'è nuovo, fa che lo rifiutino, e si attengano agli antichi Metodi, le difficoltà

• Vedi le Mem. pag. 239.

tà de' quali son superate dall' abito .

Il nuovo Istrumento che propone il Signor *De la Hire* sembra di avere molti vantaggi sopra gli altri finora immaginati , e su di quelli stessi che si tengono in uso .

Quando si vuol tirare una Bomba ad un certo segno , convien sapere 1. Quanto detto segno sia distante; 2. Quanto sia superiore o inferiore alla livella del luogo , donde si lancia; 3. Qual sia la forza della polvere che si adopera , cioè qual sia la maggior distanza dove un' istessa quantità di detta polvere possa menar la Bomba . Supposte queste tre cose , il Metodo , o l' Istrumento , di cui vi servite , compirà al di più , cioè d' insegnarvi sotto qual'angolo bisogna puntar il Mortajo , affinchè la Bomba cada nel proposto segno , perciocchè da detto angolo dipende il tutto .

L' Istrumento del Signor *De la Hire* è tale , che di per se dà egli le due prime cognizioni de le tre preliminari che bisogna avere , senz'acche sia alcuno obbligato a ricercarle altronde . Per la terza , cioè la forza della polvere , è un conoscimento che , indispensabilemente bisogna aver prima col mezzo delle sperienze precedenti .

Ha quest' Istrumento ancora un altro comodo , qual si è il non aver bisogno , come que' del Signor *Blondel* , delle Operazioni Aritmetiche , quali convien far da parte ; cosa che molto allegria i Bombardieri .



S O P R A

I CENTRI DI CONVERSIONE,
E SUI FREGAMENTI.

SE si ponga un Bastone sopra un'acqua stagnante, e con un filo appiccato vi si tiri in maniera, che faccia detto filo sempre l'istesso angolo col bastone, per cagion di esempio, un angolo retto; si scorgerà che detto bastone girerà sopra uno de' suoi punti che sarà immobile, e dal Signor Parent vien chiamato Centro di Conversione. Può supponersi per maggior facilità, che'l filo sia attaccato ad una dell' estremità del bastone.

Questo effetto nasce dalla resistenza del fluido, e dalla maniera come ella si divide. Poiche se si concepisca il primo momento del tralimento, egli è certo che la resistenza delle parti del fluido, quali bisogna rimuovere, si drizza a far girare il bastone intorno al punto dove il filo è attaccato, come intorno ad un centro: in maniera che nella supposizione presente il bastone descriverebbe precisamente un quadrante di Circolo, dopo di che il fluido non resisterebbe più al bastone secondo la sua lunghezza. Ma se questo moto circolare si facesse, l'estremità libera del bastone, e le parti che a questa son vicine, descriverebbero maggiori Archi di circolo, che le altre, & avrebbero maggior velocità. Dunque la resistenza del fluido, che si drizza ad imprimere un movimento circolare al bastone intorno al punto ove il filo è attaccato, cerca d'imprimere.

mere maggior velocità alle parti che sono verso l'altra estremità; o, ch'è lo stesso, queste parti an bisogno di maggior velocità per vincere la resistenza del fluido, in maniera che il bastone non prenda questo movimento circolare intorno al punto, dov'è il filo; o infine la resistenza del fluido è maggiore verso l'estremità libera del bastone, e v'è sempre scemando di là verso l'altra estremità. Or e' bisogna supporre che tutte le Colonne, o tutti fili d'acqua che resistono al bastone, son dell'istessa lunghezza, o dell'istessa massa. Si può dunque ritrovare su 'l bastone un punto tale, che prendendo un maggior numero di detti fili dalla parte ove essi resistono meno, e più picciol numero dalla parte ove resistono più, vi sarà un esatto compensamento, e le forze saranno eguali da una parte e dall'altra. Questo punto è 'l Centro di conversione; e poiche l'istesso ragionamento vale per tutti momenti del tramento che si fa sempre nella stessa maniera, questo Centro è sempre l'istesso punto.

Se l'angolo del filo col bastone lasciasse di esser retto, e divenisse ottuso, non lascierebbe perciò il Centro di Conversione di esser sempre nell'istesso punto; perciocche la resistenza del fluido, quantunque in se stessa minore, è sempre secondo l'istessa proporzione più grande verso l'estremità libera del bastone, e minore verso l'altra; locche ad occhi veggenti si conosce per lo moto circolare che cerca sempre d'imprimere al bastone, quantunque tal moto non debba essere d'un quadrante di Circolo intiero. Ma se dopo di aver tirato il bastone per lo filo sotto un angolo retto, si tirasse egli sotto un angolo ottuso, il Centro di Conversione, che non cambierebbe luogo su 'l bastone, lo muterebbe nel fluido, perciocche l'intie-

ro bastone farebbe un movimento, e non si vedrebbe più girare su d'un istesso punto immobile.

La gran quistione è di sapere in qual punto precisamente si debba ritrovare il Centro di Conversione; ch'è appunto quello che l' Signor *Parent* ha determinato col Calcolo Algebraico, aggiuntevi alcune altre considerazioni generali di Meccanica, oltre alle particolari per detto Fenomeno, le quali sole noi abbiám rapportate. Sperimenta egli, che se l' bastone tirato per una delle sue estremità fusse una semplice linea divisa in 20. parti da contarfi da dopo il filo, il Centro di Conversione farebbe a un da presso su la 12. Se però non sia più una linea, ma una Superficie, o un Solido, che si tiri, s'incontra qualche cambiamento nella situazione del Centro di Conversione, secondo la Superficie, o l' Solido. Tutto ciò richiede un minuto squittinio di calcolo Algebraico, in cui è entrato il Signor *Parent*.

Se un Corpo tirato in vece di nuotare su d'un fluido, come si è supposto, fusse egli tirato sopra di un piano ineguale e scabro, la resistenza di questo piano al movimento del corpo si dividerebbe sempre nell' istessa maniera, e determinerebbe l'istesso Centro di Conversione.

Questa resistenza è precisamente quel che dicev' Fregamento, tanto nocivo all'effetto di tutte le Machine; e la Teorica de' Centri di Conversione, che alle prime potrebbe sembrare ben poco utile, ha servito al Signor *Parent* nella ricerca e nella determinazione della forza de' Fregamenti.

Per ristriognere tra certi limiti limigliante quistione, che si rende infinita, & in conseguenza insolubile dalla differenza infinita delle superficie che possono fregarfi insieme, il Signor *Parent* ha confide-

tato solamente un Corpo perfettamente duro, che frega, o su di un Corpo ancor durissimo, o sopra di uno mollissimo, cioè fluido. Questi due estremi conosciuti una volta, si verrà a formar giudizio a un da presso che cosa avverrà degli altri che son fra questi due.

Ciascheduno di questi due casi divideasi ancora in due altri; poiche egli è quistione di conoscere lo sforzo necessario, o per muovere quanto meno sia possibile, cioè per cominciare a muovere un Corpo su di un' altro, o per muoverlo con una velocità data.

Se'l Corpo, su di cui deve muoversi l'altro durissimo, è fluido, la sola sperienza può determinare la grandezza del primo sforzo, quale una volta ritrovato, que' che saran necessarj per imprimere qualsivogliano velocità, saran tra di loro come i quadrati di queste velocità; perciocchè la resistenza del fluido non solamente cresce perche il Corpo, qual vi si muove, è più velocemente mosso, ma ancora perche, essendo mosso più velocemente, incontra egli & urta in altrettanta maggior quantità di particelle del fluido, ciò che fa una ragion duplicata, o di quadrati.

Se'l Corpo, su di cui si muove l'altro durissimo, è ancor durissimo, considera il Signor *Parent* le due superficie tutte ruvide, e l'ineguaglianza, a foggia di Emisferi uguali, di maniera che gli Emisferi del Corpo superiore siano imbrigati in que' dell' inferiore. Si tratta di disbrigarle, e rilevarle per cominciare il movimento. Dà questa Figura al Signor *Parent* una facilità maggiore di formare un calcolo; e per pura Geometria ritrova egli che in tal supposizione bisognerebbe, per innalzare un peso di 20. libbre, una forza, che fusse o di 14. libbre

M 4

quan:

quando bisognasse rilevare uno degli Emisferi del Corpo superiore sopra due degl' inferiori, o di 7. libbre solamente qualora convenisse innalzarla sopra di uno. Or poiche detti due casi incontranó indifferenti parti della stessa superficie, bisogna dunque una forza mezzana tra 14. e 7., o tra 11. e 10. Questa proporzione è precisamente quella che 'l Signor *Amontons* avea determinata con la sperienza de' Specchi e de' loro Pulitoj, quali sono Corpi molto duri, e pochissimo si logorano per un solo fregamento; locche li rende vicinissimi alla supposizione del Signor *Parent*.

Quando con qualche untume s' immastricia il Corpo inferiore, si riempono gl' intervalli degl' Emisferi della sua superficie, in modo che quelli del Corpo superiore quasi che non più vi s' imbricano, e possono cominciare a muoversi senza essere sensibilmente rialzati. In questo caso dunque la forza, che muove il peso di 20. libbre, deve esser minore della più picciola che le poteva muovere quando bisognava elevare gli Emisferi in tutta la loro altezza, cioè che questa forza deve esser minore di 7. libbre. Ha sperimentato il Signor *Amontons*, siccome vien rapportato nell' Istoria del 1699. *, ch' ella era il terzo del peso, & in conseguenza nella presente supposizione, di 6. libbre $\frac{2}{3}$, ch' è meno di 7. La Geometria del Signor *Parent* l' ha menato all' istesso punto, ove il Signor *Amontons* era giunto con l' esperienza, tutto che la materia non sembrava propria ad esser trattata con la Geometria.

Il paragone di differenti velocità, con le quali si vorrebbe muovere un de' Corpi su l' altro, sempre

se-

secondo l'Ipotesi degli Emisferi, ha fatto entrare il Signor Parent in una Geometria molto più composta e più sottile. Tutto quel che noi ne possiamo qui detrarre, come più chiaro e molto sensibile, si è, che la resistenza del Corpo inferiore al moto del superiore non si accresce nell'istessa ragione che la velocità del superiore; nè più sensibilmente si aumenta, passato un certo termine, quantunque detta velocità si accresca ancora quanto mai si vorrà.

Che si concepisca col Signor Parent il Corpo superiore ridotto intieramente ad un solo degli Emisferi della sua superficie, senza perdere cosa alcuna del suo peso; e che detto Emisfero successivamente passi con un movimento orizzontale sopra un ordinanza di Emisferi inferiori a se uguali, cadendo per ciascun momento tra gl' intervalli di questi, e rilevandosi sempre; se 'l peso di questo Emisfero superiore è tale, che in un Secondo faccia lui scorrere uno spazio verticale uguale all' altezza o profondità degl' intervalli che sono tra gli Emisferi inferiori; se 'l movimento orizzontale dell' Emisfero superiore è tale, che in un Secondo non faccia egli se non se un intervallo di due Emisferi inferiori; è certo che in ciascun Secondo egli s' immergerà tutto intiero in un de' detti intervalli, cioè egli si congegnerà quanto l'è possibile. Ma se col suo moto orizzontale deve egli scorrere due intervalli in un Secondo, non entrerà in cia scheduno che fino alla metà della sua profondità, perciocche queste due metà unite insieme faran tutta l' altezza da cui il suo peso deve farlo in un Secondo cadere. E' dunque chiaro che quanto più il moto orizzontale, qual può crescere all' infinito, sarà grande rispetto al moto verticale del peso che non

non cambia mai, tanto meno l' Emissero superiore si affonderà & imbrigherà negl' inferiori; & infine la velocità orizzontale potrà esser tale, che l' Emissero superiore toccherà gl' inferiori nelle loro sommità solamente, perlocchè il fregamento non si accrescerà più sensibilmente per l' accrescimento della velocità. Bisogna però bene avvertire, che del fregamento si dovrà avere sempre qualche considerazione, perciocchè per grande che sia la velocità orizzontale, come quella che non può essere se non finita è determinata, quella del moto verticale del peso sempre è qualche cosa rispetto a lei.

Quanto più un Corpo si muove velocemente in un fluido, altrettante parti incontra, la quantità delle quali è un maggiore ostacolo; & allo'ncontro quanto più un Corpo si muove velocemente su d' un Corpo durissimo, men egli s' imbriga fra gl' intervalli delle sue parti, & in conseguenza è men arrestato.

S O P R A
I C O R P I
C H E N U O T A N O
N E' L I Q U O R I.

BEN si sà che un Corpo dell' istesso peso specifico con un Liquido ov' egli è immerso, vi stia in qualunque parte vien situato: che se egli è più leggiero del Liquido, li stia a galla, tenendo immersa una parte più o meno grande, secondo la ragione del

del suo peso a quella del Liquido ; e che infine se egli è più grave, vada a fondo . I Matematici tutti han dimostrata la necessità di questi effetti .

Questo riguarda solamente il luogo d' un Corpo nel Liquido ; ma la situazione di detto Corpo nel medesimo Liquido è differente dal luogo che vi occupa . Vna Sfera , per cagion d' esempio , che vi farebbe un mezzo giro su' l suo Centro , vi cambierebbe sito , perciocchè la sua parte superiore diverrebbe l' inferiore senza ch' ella cambiasse luogo .

Supponiamo che s' immerga nell' acqua un Corpo composto di due differenti parti , una più leggiera , l' altra più grave dell' acqua , come sarebbe, di legno , e di piombo ; supponiamo ancora la quantità di queste due parti sì fattamente proporzionata, che l' tutto insieme precisamente pesi quanto una uguale ampiezza di acqua ; immaginiamci infine che questo Corpo sia sferico : egli è chiaro che più della metà della Sfera sarà di legno .

Questo Corpo avrà due centri ; uno sarà il centro della Figura e dell' Estensione , cioè il punto di mezzo della Sfera ; l' altro di gravità , cioè il punto di un Diametro orizzontale, per cui soslese le due parti del legno e del piombo , che inegualmente pesano , stanno in bilico . Or si sa che per metterle in equilibrio bisognerebbe che 'l punto d' appoggio, o, ch'è lo stesso, il Centro di gravità fusse più vicino alla parte più pesante : In conseguenza il Centro di gravità di detta Sfera formata da differenti parti sarebbe più verso quella del piombo, nè l'istesso col Centro della Figura .

Immersa questa Sfera nell' acqua in maniera, che il Centro della gravità sia in alto , si cerca quale avvenga .

Egli è certo che un Corpo libero a muoversi
non

non può star in riposo fino a che il suo Centro di gravità sia disceso quanto più basso può. Bisogna dunque che 'l centro di gravità della Sfera, cioè la Sfera stessa cali, giacchè lo può.

Per un altro verso, essendo ella di uguale peso specifico con l'acqua, non deve nè salire nè scendere, ma star precisamente nell' istesso luogo dov' è posta.

Per componere queste due cose, il Signor Borelli nel suo Eccellente *Trattato De motu Animalium part. 1. Cap. 23. Prop. 207.* decide che la Sfera girerà intorno al Centro della sua Figura fin a tanto che il suo Centro di gravità sia disceso nella parte inferiore ver la Terra, perlocchè il Corpo cambia di situazione, e non già di luogo.

La decisione d' un sì grande Autore, cotanto in apparenza convincente, non fù dal Signor Parente riputata giusta; nè egli ha avuto il timore di proporre quello Paradosso, cioè che 'l Corpo, malgrado della ugnaglianza della sua gravità specifica con quella dell' acqua, calerebbe fino ad un certo punto; e, qualche sembrerà più maraviglioso, che la Figura del Corpo monterebbe, mentrecchè il Corpo istesso discenderebbe.

Egli è certo, che se due forze uguali, e che operino per mezzo di linee l' un l' altra parallele, tirino una Verga ciascheduna per una punta in due versi opposti, poichè non si suppone alcun punto fisso in detta Verga, girerà ella sopra uno de' suoi punti, e questo sarà quel di mezzo, perciocchè le due forze opposte sono uguali. Se elle non lo fossero, girerebbe detta Verga su d' un altro punto altrettanto più vicino alla forza maggiore, quanto questa forza maggiore superasse l' altra.

La Sfera immersa nell' acqua è spinta a basso dal

dal suo proprio peso, tutta l'azion del quale è raccolta nel Centro di gravità . Nell' istesso tempo viene detta Sfera spinta in alto dal peso d' una massa d' acqua a se uguale , che cerca sempre calar giù e prendere il suo sito ; e tutta l' azione di questa quantità d' acqua uguale deve esser concepita come riunita nel Centro della Figura della Sfera , poiche trattasi dell' estensione della massa, ch' è qualche determina la quantità dell' acqua, di cui si considera l'azione . Ecco due forze opposte che operano per versi paralleli ; essendo due gravità, son esse uguali per la suppolizione , applicate a due punti differenti , presi su d' un medesimo diametro della Sfera ; bisogna dunque che la Sfera giri intorno ad un punto mezzano tra questi due, qual ne sia ugualmente distante .

Poiche 'l Centro di gravità della Sfera è montato su, ella non può girare intorno a questo punto mezzano senza che 'l Centro della gravità non discenda ; e quando infine egli è calato sino alla linea verticale , la sua azione cessa , poiche non può più scendere, e la Sfera si arresta .

Per un' altro verso, egli è chiaro che in questa disposizione il Centro della Figura, qual' era al di sotto del Centro di gravità , è salito ; e di là il Signor *PARENT* conchiude , che 'l Corpo, qual si considera come intieramente raccolto nel suo Centro di gravità, è calato, mentre che la Figura di quest'istesso Corpo è salita .

Si è qui presa la Figura sferica per un esempio, essendo ben chiaro che sussista l' istesso raziocinio con tutte altre Figure.

Sussiste ancora quando le due forze sono inguali .

Se 'l peso del Corpo di diverse spezie immerso nell'

nell'

nell'acqua è maggiore di quello d'un' ampiezza d'acqua uguale, e 'l suo Centro di gravità sia posto in alto, non solamente questo Corpo deve immergersi nel liquido, ma farà un mezzo giro in cadendo; perciocchè bisogna che 'l suo Centro di gravità cali il più basso che può, dopo di che continua il Corpo ad immergersi, senza però girar di vantaggio. Il giramento si fa intorno ad un punto, qual non è ugualmente distante da' Centri della gravità, e della Figura, perciocchè le due forze che vi sono applicate sono ineguali.

Di là nasce che i Gatti, e molti Animali dell'istesso genere, come le Faine, i Gatti Selvaggi, le Volpi, le Tigri, &c. quando cadono da un luogo alto, per ordinario cadono su le loro piante, quantunque alle prime tenessero queste in alto, e per conseguenza dovrebbero cadere con la testa giù. Egli è certo che da per loro non potrebbero rivolgersi così nell'aere, dove non ritrovano essi punto fisso per appoggiarsi; ma 'l timore fa loro curvar la spina del dorso in maniera che le interiora sono spinte in alto, allungando essi nello stesso tempo la testa e le gambe verso 'l luogo dove vanno a cadere come per incontrarlo, locchè dà a queste parti una maggiore azione della lieva. Vien così il lor Centro di gravità ad esser differente dal Centro della Figura, e posto nella parte superiore, donde siegue, secondo la dimostrazione del Signor *Parent*, che devono questi Animali far un mezzo giro nell'aere, e rivolgere le loro branche in giù, per cui mezzo campano quasi che sempre la vita. Non saprebbe in tal'occasione far cosa migliore la più fina conoscenza della Meccanica, che pur lo fa la passion del timore confusa e cieca.

Se 'l peso del Corpo è minore di quel dell'acqua,

qua , verrà egli sommerso in parte , nè vi bisogna considerare per Centro di Figura se non se quello della parte sommersa , che sola sperimenta e riceve l'azion dell' acqua , una delle due forze ineguali; & opposte . Per lo Centro di gravità, questo sempre è quello del Corpo intiero , perciocchè tutto 'l suo peso è sempre quello che opera . Dopo di ciò, egli è facile a giudicare da quel che si è detto come si farà il giramento .

Mentreche 'l Corpo fa 'l suo mezzo giro , se suppongasì immobile il Centro del giramento , come naturalmente e da per se lo è , la parte sommersa nell'acqua sempre sarà uguale, se questo Corpo è una Sfera ; ma se e' sarà di tutta altra Figura, l'azione del giramento farà che questa parte sommersa ora sarà maggiore, & ora minore. Da un'altra parte , l'equilibrio del Corpo con certa ampiezza d'acqua determinato richiede che la sua parte sommersa ne occupi sempre il luogo , qual' è pur sempre dell' istessa grandezza : Così l'azione del giramento sembrerebbe contraria a ciò che richiede l' equilibrio ; qualche però accorda tutto, si è , che quando per lo giramento la parte sommersa è molto picciola , l' equilibrio fa che 'l Corpo s' immerga più, & in conseguenza il suo Centro di giramento cali in linea verticale . Se la parte sommersa è molto grande, il Corpo s'innalza, e 'l suo Centro di giramento ancora .

Egli è certo , che nell' uno o nell'altro di questi moti il Centro della Figura totale monta o scende per linea retta, e nell'istesso tempo circolarmente gira ; & in conseguenza deve descrivere una Cicloide , come quella che si forma dal moto Retto o dal Circolare in tal guisa misti .

A queste pruove , che molto ben dimostrano

co-

come in tutti questi casi i Corpi girano , non già intorno al loro Centrodella Figura , ma intorno ad un punto mezzano tra questo Centro e quel della gravità, il Signor *Parent* aggiunge un'altra pur convincente, qual però entra in una maggior discussione Geometrica . Il Principio si è , che 'l Centro di gravità comune tanto al liquore quanto al Corpo sommerso , deve stare il più basso che sia possibile ; dopo che dimostra il Signor *Parent* che tal situazione si abbia solo nel suo Sistema .

Per le stesse vie ritrova qual situazione debba prendere il Corpo di differenti spezie formato, immerso nell' istesso tempo in molti liquori di gravità differenti . I principj sono l'istessi , l'adattamento però è più difficile .

Le differenti Figure, che possono in questi Corpi supponersi, fanno entrare questo Problema in uno maggior squittinio geometrico. *Archimede* lo risolvè per la Paraboloide retta situata, solamente in un liquore ; ma 'l Signor *Parent* lo solve per tutte le Conoidi poste in quanti liquori si vorrà mai .

Dalla maniera pur or da noi riferita , in cui il Sig. *Parent* ha trattato questi differenti soggetti, può formarsi qualche idea , quantunque leggiera, d' un Libro ch'egli ha pubblicato in questo Anno , che ha per titolo, *Elementi di Meccanica e di Fisica , ne quali si anno i principi della Percossa e degli Equilibri tra due sorti di Corpi* . E' facile l'immaginare quanto sia vasta la Scienza del moto , se ella si adatti a' tutti i differenti casi , & a tutte le combinazioni , di cui tal materia è capace , ch'è appunto quel che 'l Signor *Parent* ha fatto . Dopo che ven-

ne

nela fronte qu'ella parvero sì naturale, e frattanto
tutti cominciarono all'ultimo secolo, che tutto si fic-
cò dal vero, e i Filosofi con diligenza ne andarono
studiando i Principj de' Leggi, & i diversi accidenti; por-
che potesse mirare loro tante differenze, e finora for-
se di molto, non riesce molto facile o a cancellarle
tutte, o a ridurle all'uniformità, o ad accreditarle
de' principj.

Continuando il Signor Jaugen la descrizione
dell'Arte della Stampa, in diverse volte ha parlato
della maniera di fondere i Caratteri, delle differen-
ze portate sopra le quali si è scritta, o improntato,
della maniera con la quale le Matrici, e le Me-
dulle, si cominciano l'Arte de' Alfabeti di
diversi lingue, & ha fatto vedere l'Alfabeto
Ebraico derivato dalla Ieroglifica, o da' Monumenti
antichi.

Il Signor Des Billiers, oltre alla descrizione
di alcune Forti di China, ha recata quella dell'
Arte di far le Spille, ricorrendovi osservare delle Pra-
tiche sì generali e delicate, che non riguardavano
l'apparenza piacevolezza dell'oggetto.

In quest'Arme caria voce di essersi ritrovato
il Moto perpetuo. Vadevasi egli in un luogo, dove
la situazione della cosa non poteva ben conoscersi,
dove l'investigazione non era posta in quistione, come
lo sarebbe stato in un' Accademia, dove l'apparen-
za di scoprirsi alcune volte incontra, e l'aria di si-
milisimo quasi che sempre. Il Sig. Sauvour riferì l'
avvenimento all'Accademia, che ne rimase sorpresa.
Poco dopo il rumore di tale scoperta, disse che il
Moto perpetuo col suo Autore. Con tal occasione il

Signor Parent ne provò l'impossibilità, per questa ragione, che tutte le parti d' una Machina anno un comun Centro di gravità, quale, mentre che dette parti girano intorno ad un qualunque fiali punto fisso, li ritrova necessariamente in una situazione, dove è egli più sotto che in ogn'altra, ond' è che tosto deve affatto arrestarsi; perciocchè essendovi un punto, dove la forza, che molti Corpi anno per calare, tutta intiera si unisce, qualor detto punto non può più scendere, bisogna che tutti questi Corpi restino immobili. Determina detto Signor Parent in generale qual deve essere questo punto di riposo inevitabile per tutte le possibili Machine.



M A C H I N E O I N V E N Z I O N I

Approvate dall' Accademia

N E L M D C C .

I.

U N Cembalo , che piegandosi può trasportarsi facilmente da per tutto dove si voglia, e che all'grado di tutto ciò si scorda più difficilmente del Cembalo ordinario.

II.

Machina per fegare e pulire i Marmi , inventata dal Sig. De Fontenay Avvocato nel Parlamento.

III.

Due Pistole da S. M. , delle quali in un tratto si ne può formare uno Schioppo; invenzione del Sig. de la Chaumette .

IV.

Machina per inalzare Vascelli sommersi, inventata dal Signor Baron de Redingnes .

V.

Machina Idraulica del Signor Adriano de Corroy Signore di S. Giacomo .

N. 2

E. L. O.

E L O G I O

D E L F U

SIGNOR T A U V R Y.

D *Aniello Taurvy*, Figlio d' *Ambrogio Taurvy* Medico della Città di *Laval*, nacque nel 1669. Apparè egli il Latino e la Filosofia dal Padre istesso, il quale sì felici disposizioni ravvisò nel suo Scolare, che nell' età di 9. Anni e mezzo fè sostenerli Conclusione di Logica, e nell' Anno appressò altra generale di Filosofia: dopo questa, essendo egli Medico dell' Ospedale di *Laval*, insegnò al Figlio la Teorica della Medicina, e la Prattica su gl' Infermi dello stesso Ospedale. Perchè e' però fusse più a fondo instrutto in detta Professione, lo mandò in *Parigi* mentre era di 12. Anni; e due Anni appresso il Giovane Medico fù riputato da que' dell' Università d' *Angers* degno del grado Dottorale. Ritornò in *Parigi*, dove per lo spazio di 3. Anni si diede alla Notomia, & appunto nel diciottesimo Anno di sua età pubblicò la *Notomia ragionevole*; Non può farli a meno di esattamente notar queste date cotanto singolari. Da' Studi di Notomia fè passaggio a que' de' Remedj, e ver l' età di 21. Anni compose il *Trattato de' Medicamenti*. Per la proibizione che 'l Re fece a' Medici Forellieri di esercitare la di loro professione, li convenne poco dopo presentarsi alla Facoltà di *Parigi*, dalla quale fù ricevuto Dottore. Raddoppiò l' ardenza
fin

fin dalla culla concepita per detta professione ; & avendo egli lo spirito secondo di riflessioni , somministrandoli i suo' Studj e le Sperienze copiose materie , scrisse la *Nuova Prattica delle Malattie acute , e di tutte quelle che da fermentazione de' liquori addizengono* , quale uscì alla luce nel 1698.

In questo tempo appunto io lo conobbi , e tenni in molta stima ; perlocche avendo l'onore di essere uno degli Accademici delle Scienze , e 'l diritto di nominare un Allievo , stimai di non poter presentare miglior Soggetto alla Compagnia , quanto il Signor *Taury* : E quantunque l'esser da me nominato non aggiungesse lui verun pregio , la gran voglia ch'egli avea d'entrare in questa illustre Adunanza non li fe poner mente alla maniera d'introdurvisi .

Nel 1699. il Re onorò l'Accademia con recenti Regole , nominando molti nuovi Accademici nell'istesso tempo , o avanzando gli Antichi ; & allora il Signor *Taury* da Allievo passò nell'ordine degli Associati .

Poco dopo prese e' la briga col Signor *Mery* sulla famosa quistione della Circolazione del sangue nel Feto , e con tale occasione fece egli il *Trattato della Generazione e Nutrizione del Feto* , pubblicato nel 1700.

Tal quistione forse contribuì alla Malattia di cui egli se ne morì ; perlocche dovendo contrastare con un grande Avversario , sostenne penose fatiche , rubando molto dal sonno , per istudiare a fondo la materia di cui si trattava , e per componere il suo Libro , non interrompendo frattanto l'esercizio prattico della Professione .

Che ne sia , l'Asima , alla quale inchinava , se l'accrebbe verso il principio di quest' Anno , e nel

Mese di febbrajo 1701. passò a miglior vita Tifico, nell'età di Anni 31. e mezzo.

Da tutto quel che si è rapportato scorgefi quanta si fusse la vivezza & acutezza della sua mente: Alla molta cognizione che avea di Notomia, aggiungeva il talento di felicemente immaginare gli usi delle strutture; in generale teneva egli il dono di formar Sistema. E' molto verisimile che nell'esercizio della Medicina avrebbe avuta molta rinomanza, quantunque mancassero lui Protettori, Ciurmerie, & Artifizj che lo promuovessero. Il di lui merito cominciava a renderlo conto presso di molte Case riguardevoli, nelle quali con miei occhi ho veduto piangere molto la di lui perdita.

Tenne il suo luogo di Associato il Signor *Lirre*, Allievo del Signor *Du Hamel*; e questo d'Allievo l'occupò il Signor *Du Verney* Cerusico, Fratello del Signor *Du Verney* Pensionario.

Fine dell' Istoria

M E M O R I E
D E L L'
ACCADEMIA
R E A L E
DELLE SCIENZE

Dell' Anno M. DCC.



IN NAPOLI M. DCC. XXXIX.

A spese di Bernardino Gessari.

Nella Stamperia di Felice-Carlo Mosca.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.



TAVOLA

PER LE

MEMORIE.

A nalisi dell' <i>Ipecacuanana</i> del Signor Boulduc.	pag. 1
Osservazioni del Barometro, del Termometro, e della quantità d' <i>Acqua piovana</i> , e di <i>Neve</i> sciolta caduta in Parigi nell' Osservatorio Reale nell' Anno 1799. Del Signor de la Hire.	6
Soluzione d' un Problema Fisico-Matematico, del Signor Marchese dell' Hopital.	10
Maniera Generale per determinare le Forze, le Velocità, i Spazi, e i Tempi, in tutte sorti di movimenti rettilinei variati a discrezione, essendo data una sola di dette quattro cose; del Signor Vati- gnon.	23
Osservazioni su le Piante che nascono nel fondo del Mare, del Signor Tournesort.	35
Avvertimenti su le osservazioni delle Refrazioni ritratte dal Libro intitolato <i>Refractio Solis Inocci- dus in Septentrionalibus oris jussu Caroli XI. Re- gis Suecorum &c. a Johanne Bilberg Holmia 1695.</i> , del Signor de la Hire.	46
Riflessioni su le osservazioni fatte in Botnia, del Signor Cassini.	49
Su l' perpenicolare adattamento osservabile in tut- ti Tronchi, e, per quanto può farsi, in tutti Rami delle Piante, del Signor Dodart.	59
Osservazioni su la quantità degli acidi assorbiti da-	65

<i>Alcali Arreli, del Signor Homberg :</i>	76
<i>Analisi del Sal Ammoniaco, della Seta, e del Corno di Cervo; del Signor Tournefort.</i>	84
<i>Problema del Signor De la Hire.</i>	88
<i>Proseguimento dell' Analisi su l' Ipecacuana, del Signor Boulduc.</i>	90
<i>Sperienza della Refrazione dell' aere, fatta dalla Società Reale Inglese, riferita dal Signor Cassini Figlio.</i>	94
<i>Del Moto in generale per tutte sorti di Curve; e delle forze Centrali, così Centrifughe che Centripete, necessarie a Corpi che le descrivono; del Signor Varignon.</i>	100
<i>Spiegamento Fisico-Chimico de' Fuochi Sotterranei, de' Terremoti, delle Tempeste, de' Baleni, e de' Tuoni; del Signor Lemery.</i>	114
<i>Osservazioni su le Soluzioni e Fermentazioni che possono dirsi fredde, perciocchè si accompagnano col raffreddamento di que' liquori ne' quali si fanno; del Signor Geoffroy.</i>	125
<i>Dell' Uso Medico dell' Acqua di Calcina, del Signor Burlet.</i>	148
<i>Estratto delle Descrizioni, che Pison e Marcgravius an date della Caa-apia, e confronto delle Radici di Caa-apia, e d' Ipecacuana così grigia che bruna, con la descrizione di esse, donde sensibilmente si vede la differenza tra la Caa-apia e l' Ipecacuana; del Signor Geoffroy.</i>	162
<i>Su la moltiplicazione de' Corpi Viventi considerata nella fecondità delle Piante. Prima Memoria letta nell' Assemblea a 19. Maggio, e 14. Luglio 1700., del Signor Dodart.</i>	165
<i>Osservazioni su la Costruzione degli Orolj a Pendoli, del Signor De la Hire.</i>	195

T A V O L A. 207

De' 7 si Onfalmeſenterici , del Signor Du Ver2

204

Esſe di alcune Lettere ſcritte da Portogallo e
dal Baſille dal Signor Couplet Figlio al Signor
Aloisio Bignon Preſidente dell' Accademia Reale
delle Scienze . . .

207

Nuova Maniera di rendere i Barometri luminofi, del
Signor Bernoulli Profefſore in Groningue. Eſtrat-
to di una delle ſue Lettere ſcritta da Groningue
a 19. Giugno 1700.

214

Præſentimento delle Oſſervazioni ſu' Diſcioglienti del
Mercurio, del Signor Homberg .

229

Della Struttura e ſentimento della Midolla , del Sig.
Du Verney .

235

Metodo Generale per lanciar le Bombe in tutte ſorti
di caſi propoſti con uno Strumento univerſale a tal
uſo anſſe, del Signor De la Hire .

239

Oſſervazioni ſugli Oli delle Pianta, del Signor Hom-
berg .

247

Quiſten Fifica, ſe ſia vero che l' aere, qual' entra ne'
vaſi del ſangue per mezzo della reſpirazione, ſcap-
pi via con i vapori e ſudori per gl' inſenſibili pori
della pelle; del Signor Marry .

252

Delle Forze Contrali, ovvero de' peſi neceſſari a' Pian-
te per farli diſcendere le Orbite ſuppoſte loro fuora;
del Signor Varignon .

260

Meſſura de' l' razioni della voce d' l' Uomo, e ſuoi
ſecanti toni, del Signor Dodart .

288

Oſſervazioni delle Macchie del Sole compaſſe nel
Meſe di Novembre 1700. , del Signor De la
Hire .

254

Oſſervazioni della Canionazione inferiore di Venere
col Sole, fatta nell' Oſſervatorio Reale; del Signor
De la Hire .

355

Sopra l' acido dell' Augimonio, del Signor Hom-
berg .

355

Signor Parent ne provò l'impossibilità, per questa sola ragione, che tutte le parti d' una Machina anno un comun Centro di gravità, quale, mentre che dette parti girano intorno ad un qualunque siasi punto fisso, li ritrova necessariamente in una situazione, dove è egli più sotto che in ogn'altra, ond' è che tosto deve affatto arrestarsi; perciocche essendovi un punto, dove la forza, che molti Corpi anno per calare, tutta intiera si unisce, qualor detto punto non può più scendere, bisogna che tutti questi Corpi restino immobili. Determina detto Signor Parent in generale qual deve essere questo punto di riposo inevitabile per tutte le possibili Machine.



M A C H I N E O I N V E N Z I O N I

Approvate dall' Accademia

N E L M D C C .

I.

U n Cembalo , che piegandosi può trasportarsi facilmente da per tutto dove si voglia, e trasportando si tutto ciò si scorda più difficilmente del Cembalo ordinario.

II.

Machina per segare e pulire i Marmi , inventata dal Sig. *De Fonten* Avvocato nel Parlamento.

III.

Due Pistole da Sella , delle quali in un tratto si può formare uno Schioppo, invenzione del Sig. *de la Chaumette*.

IV.

Machina per inalzare Vascelli sommersi, inventata dal Signor *Baton de Redingues*.

V.

Machina Idraulica del Signor *Adriano de Cordes* Priore di S. Giacomo.

N 3

E. L. O.

E L O G I O

D E L F U

SIGNOR T A U V R Y :

D Aniello Taurvy, Figlio d' Ambrogio Taurvy Medico della Città di *Laval*, nacque nel 1669. Appare egli il Latino e la Filosofia dal Padre stesso, il quale sì felici disposizioni ravvisò nel suo Scolare, che nell' età di 9. Anni e mezzo se sostennerli Conclusione di Logica, e nell' Anno appressò altra generale di Filosofia: dopo questa, essendo egli Medico dell' Ospedale di *Laval*, insegnò al Figlio la Teorica della Medicina, e la Pratica su gl' Infermi dello stesso Ospedale. Perche e' però fusse più a fondo instrutto in detta Professione, lo mandò in *Parigi* mentre era di 12. Anni, e due Anni appresso il Giovane Medico fù riputato da que' dell' Università d' *Angers* degno del grado Dottorale. Ritornò in *Parigi*, dove per lo spazio di 2. Anni si diede alla Notomia, & appunto nel diciottesimo Anno di sua età pubblicò la *Notomia ragionevole*; Non può farli a meno di esattamente notar queste date cotanto singolari. Da' Studj di Notomia fè passaggio a que' de' Remedj, e ver l' età di 21. Anni compose il *Trattato de' Medicamenti*. Per la proibizione che 'l Re fece a' Medici Forestieri di esercitare la di loro professione, li convenne poco dopo presentarsi alla Facoltà di *Parigi*, dalla quale fù ricevuto Dottore. Raddoppiò l' ardenza

fin

fin dalla culla concepita per detta professione; & avendo egli lo spirito fecondo di riflessioui, somministrandoli i suo' Studj e le Sperienze copiose materie, scrisse la *Nuova Prattica delle Malattie acute, e di tutte quelle che da fermentazione de' liquori aduencono*, quale uscì alla luce nel 1698.

In questo tempo appunto io lo conobbi, e tenni in molta stima; perlocchè avendo l'onore di essere uno degli Accademici delle Scienze, e l' diritto di nominare un Allievo, stimai di non poter presentare miglior Soggetto alla Compagnia, quanto il Signor *Taurvy*: E quantunque l'esser da me nominato non aggiungeffe lui verun pregio, la grandezza ch'egli avea d'entrare in questa illustre Adunanza non li fe poner mente alla maniera d'introdurvi.

Nel 1699. il Re onorò l'Accademia con recenti Regole, nominando molti nuovi Accademici nell'istesso tempo, o avanzando gli Antichi; & allora il Signor *Taurvy* da Allievo passò nell'ordine degli Associati.

Poco dopo prese e' la briga col Signor *Mery* sulla famosa quistione della Circolazione del sangue nel Feto, e con tale occasione fece egli il *Trattato della Generazione e Nutrizione del Feto*, pubblicato nel 1700.

Tal quistione forse contribuì alla Malattia di cui egli se ne morì; perlocchè dovendo contrastare con un grande Avversario, sostenne penose fatiche, rubando molto dal sonno, per istudiare a fondo la materia di cui si trattava, e per componere il suo Libro, non interrompendo frattanto l'esercizio pratico della Professione.

Cneche ne sia, l'Asima, alla quale inchinava, se l'accrebbe verso il principio di quest' Anno, e nel

Mese di Febrajo 1701. passò a miglior vita Tifico, nell'età di Anni 31. e mezzo.

Da tutte quel che si è rapportato scorgesi quanta si fosse la vivezza & acutezza della sua mente: Alla molta cognizione che avea di Notomia, aggiungeva il talento di felicemente immaginare gli usi delle strutture; in generale teneva egli il dono di formar Sistema. E' molto verisimile che nell'esercizio della Medicina avrebbe avuta molta rinomanza, quantunque mancassero lui Protettori, Ciurmerie, & Artifizj che lo promuovessero. Il di lui merito cominciava a renderlo conto presso di molte Case riguardevoli, nelle quali con miei occhi ho veduto piangere molto la di lui perdita.

Tenne il suo luogo di Associato il Signor Litze, Allievo del Signor Du Hamel; e questo d'Allievo l'occupò il Signor Du Verney Cerusico, Fratello del Signor Du Verney Pensionario.

Fine dell' Istoria

M E M O R I E
D E L L'
ACCADÉMIA
R E A L E
DELLE SCIENZE

Dell' Anno M. DCC.



IN NAPOLI M. DCC. XXXIX.

A spese di Berardino Gessari.

Nella Stamperia di Felice-Carlo Mosca.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

THE
JOURNAL
OF
THE
AMERICAN
MEDICAL
ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL.
1914

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

TAVOLA

PER LE

MEMORIE.

A <i>Nalisi dell' Ipecacuana del Signor Boulduc.</i>	pag. 1
<i>Osservazioni del Barometro, del Termometro, e della quantità d'Acqua piovana, e di Neve sciolta caduta in Parigi nell' Osservatorio Reale nell' Anno 1699. Del Signor de la Hire.</i>	6
<i>Soluzione d' un Problema Fisico-Matematico, del Signor Marchese dell' Hopital.</i>	10
<i>Maniera Generale per determinare le Forze, le Velocità, i Spazi, & i Tempi, in tutte sorti di movimenti rettilinei variati a discrezione, essendo data una sola di dette quattro cose; del Signor Varignon.</i>	28
<i>Osservazioni su le Piante che nascono nel fondo del Mare, del Signor Tournefort.</i>	35
<i>Avvertimenti su le osservazioni delle Refrazioni ritratte dal Libro intitolato Refractio Solis in occidui in Septentrionalibus oris jussu Caroli XI. Regis Svecorum &c. a Johanne Billberg Holmia 1695., del Signor de la Hire.</i>	46
<i>Avvertimenti su le osservazioni fatte in Botnia, del Signor Cassini.</i>	49
<i>Su l' perpendicolare adattamento osservabile in tutti Tronchi, e, per quanto può farsi, in tutti Rami delle Piante, del Signor Dodart.</i>	59
<i>Osservazioni su la quantità de gli acidi assorbiti da-</i>	64

<i>Alcali terrei, del Signor Homberg :</i>	76
<i>Prova delle Analisi del Sal Ammoniaco, della Nera, e del Corno di Cervo; del Signor Tournefort.</i>	84
<i>Prolenza del Signor De la Hire.</i>	88
<i>Perseguimento dell' Analisi su l' Ipecacuana, del Signor Boulduc.</i>	90
<i>Sperienza della Refrazione dell' aere, fatta dalla Società Reale Inglese, riferita dal Signor Callini Figlio.</i>	94
<i>Del Moto in generale per tutte sorti di Curve; e delle frae Centrali, così Centrifughe che Centripete, necessarie a Corpi che le descrivono; del Signor Varignon.</i>	100
<i>Spiegamento Fifico-Chimico de' Fuochi Sotterranei, de' Terremoti, delle Tempeste, de' Baleni, e de' Tuoni; del Signor Lemery.</i>	124
<i>Offervazioni su le Soluzioni e Formentazioni che possono dirsi fredde, perciocche si accompagnano col raffreddamento di que' liquori ne' quali si fanno; del Signor Geoffroy.</i>	135
<i>Dell' Uso Medico dell' Acqua di Calcina, del Signor Bulet.</i>	148
<i>Estratto delle Descrizioni, che Pison e Marcgravius an- dale della Caa-apia, e confronto delle Radici di Caa-apia, e d' Ipecacuana così grigia che bruna, con la descrizione di esse, donde sensibilmente si vede la differenza tra la Caa-apia e l' Ipecacuana; del Signor Geoffroy.</i>	163
<i>Su la multiplicazione de' Corpi Viventi considerata nella fecondità delle Pianta. Prima Memoria letta nell' Assemblea a 19. Maggio, e 14. Luglio 1700., del Signor Dodart.</i>	165
<i>Offervazioni su la Costruzione degli Orologi a Pendoli, del Signor De la Hire.</i>	195

I. Fisi Onfalmo fenterici, del Signor Du Ver2

204

*Estratto di alcune Lettere scritte da Portogallo e
dal Reame del Signor Couplet Figlio al Signor
Abbate Bignon Presidente dell' Accademia Reale
delle Scienze. •*

207

*Una Maniera di rendere i Barometri luminosi, del
Signor Bernoulli Professore in Groninque. Estrat-
to di una delle sue Lettere scritta da Groninque
a 19. Giugno 1700.*

214

*Prossimimento delle Osservazioni su' Discioglienti del
Mercurio, del Signor Homb-rg.*

229

*Della Struttura e sentimento della Midolla, del Sig-
nor Verrey.*

235

*Maniera Generale per lanciar le Bombe in tutte sortie
di cannone proporzionata con uno Strumento universale a tal
uso, del Signor De la Hire.*

239

*Osservazioni sugli Oli della Pianta, del Signor Hom-
berg.*

247

*Quistione Fisica, se sia vero che l' aere, qual' entra ne'
vasi del sangue per mezzo della respirazione, scap-
pi via con i vapori e sudori per gl' insensibili pori
della pelle, del Signor Mery.*

252

*Delle Forze Centrali, ovvero de' pesi necessari a' Pianete
per farle descriver le Orbite supposte loro finora;
del Signor Varignon.*

260

*Memoria su le ragioni della voce dell' Uomo, e su'
Sogni tutti, del Signor Dodart.*

288

*Osservazioni delle Macchie del Sole comparse nel
Mese di Novembre 1700., del Signor De la
Hire.*

354

*Osservazioni della Centioni re inferiore di Venere
col Sole, fatta nell' Osservatorio Reale, del Signor
De la Hire.*

355

*Sopra l' acido dell' Antimonio, del Signor Hom-
berg.*

berg.

Osservazione su d' una nuova specie d'Ernia, del Signor De Littre .

Descrizione dell' Uretra dell' Uomo, dimostrata all' Accademia a 3. di Luglio 1700. ; del Signor De Littre .

MEMORIE
DI
MATEMATICA,
E
DI FISICA,

*Dal Registro dell' Accademia Reale delle
Scienze ritratte.*

Dell' Anno M. DCC.

ANALISI
DELL' IPECACUANA:
DEL SIGNOR BOULDUC.



N tutta la Fisica sperimenta-
le non v' è cosa , a mio giu-
dizio , più necessaria , e più
misteriosa , quanto la disami-
na delle virtù , e differenze
de' remedj purgativi: Questa
fin' oggi è stata l' applica-
zione la più seria de' Savj
& io entro in questa parte,
felice , se in seguitando i lumi di essi , aggiunga
alcuna cosa a qualche ci an rimasto: Ho stimato

Memor. 1700.

• 1700. 8. Gennajo.

A per-

perciò incominciar dalla radice d'Ipecacuana , come da cosa nuova ; e procurerò di scoprire a qual principio , o a qual parte di tal misto debba rifonderli la virtù specifica di essa , con que' lumi , che l'industria dell'arte , e la sperienza mi an potuto suggerire .

Io son di accordo , che sia questo un rimedio divino per le occorrenze , e flussi disenterici , e nell'istesso tempo , emetico , solutivo , & astringente , siccome alcuni de' nostri Moderni ancora per tale l'an ravvisato ; quantunque della di lui figura , & uso brevissima descrizione ne abbiam formata ; Ha egli presso di noi corsa l' istessa sorte di molti altri buoni remedj , essendo rimasto , per dirla in una parola , lungo tempo inutile , o per negligenza , o per miscredenza di alcuni , quali non solamente an negata la credenza a maravigliosi effetti di esso , ma an trascurato ancora per mezzo di accorte sperienze d' istruirsi ; o per la prevenzione di alcuni altri , quali , misurando le forze della natura col valor de' loro lumi , non an potuto immaginarli , che vi fossero altri rimedj più efficaci di que' , che erano a loro contezza ; o infine per la troppo prudenza , o più tosto timidezza di alcuni Autori , quali , informati quantunque e' fossero della virtù di tal radice , mancato è loro il cuore di adoperarla ; non potendo concepire , come un remedio potesse sicuramente operare , quando con violenza muoveva .

Queste ragioni , che senza dubbio an si lungamente tenuta detta radice in dimenticanza , come altri molti , de' quali noi ci serviamo con l' istesso effetto , non an ritenuti altri più arditi dal non tentarne le pruove , e spianar così la strada a noi , per quell' uso , che tutto giorno ne facciamo con
tante

tanto beneficio del pubblico: Quindi molti, presa l'occasione, an detto, che per ridurre a perfezione questa grand' arte, quale tutta principalmente si drizza alla conservazione della vita degli Uomini, la prevenzione, e la negligenza sian sempre nocivissime a' suoi progressi; e che spesso un' arditezza, ragionevole, accoppiata a mediocre conoscenza, sia più utile, che le scoperte di un profondo sapere accompagnato con molta lentezza, e timideità.

Non v' essendo più luogo da dubitare della virtù dell' Ipecacuana, e lasciando a Botanici la diligenza nel descrivere detta pianta, io recherò in mezzo solamente qualche ho di sua natura ravvivato: E per tener qualche ordinanza in ciò, dirò sù le prime, che noi ne conosciamo oggi giorno due forti, una grigia, & un' altra bruna inchinante nella parte esteriore al nero; che la grigia sia meno violenta ne' suoi effetti della bruna; ma che quest' ultima sia più sicura nel profitto della grigia, per molte sperienze, che se ne son fatte, e per quel che io stesso me ne son' accertato: frattanto, come de' remedj avviene, che per ordinario si preferiscono i dolci a' violenti, l' uso ha dato luogo all' Ipecacuana grigia, che si adopera più frequentemente della bruna.

Vò aggiungere, che dopo la voga presa di queste due, ce ne an portata una terza, bianca, poco simile alle due altre, quale non si son rimasti di volercela far credere per una terza Ipecacuana; & in fatti oggi giorno la chiamano Ipecacuana bianca, di cui si servono nelle stesse malattie, per le Donne incinte, e per piccioli Figliuoli, come quella che per ordinario fa molto poco effetto.

Sù le prime ho lavorato sù la grigia, col di

fegno di proleguir l' opera su le due altre : Ne ho fatta in due maniere l' analisi ; e per distillazione ordinaria nella storta a fuoco di riverbero chiuso, e graduato ; e per estrazione con dissolventi varj, proprj, e convenevoli .

Con la distillazione , mi ha resa alle prime certa flemma , indi lo spirito acido , & un poco d' olio ; e dalla massa nera , rimasta nella storta, con violentissimo fuoco calcinata , ne ho ritratto pochissimo sal fisso .

Il poco lume, che quest' analisi mi ha dato, non merita ch' io veng' al minuto noioso , col divisare le proporzioni , e gli effetti di tutte le parti , ch' ella mi ha prodotti ; e ne avrei ancora potuto far a meno , ben persuaso di esser ella inutile alla vera conoscenza della natura de' misti , come quella, che ce li mette inanzi distrutti ; ma non l' ho voluta affatto trasandare , sì per l' uso , che lungamente si tiene , come perche non lascia ella di svilupparsi , e dimostrarci le proporzioni delle parti separate , e divise .

Per dunque meglio riconoscere la natura di tal radice , ho stimato dover camminare per la via dell' estrazione , che poteva darmi un ristretto , o per lo meno alcuna parte essenziale di tal misto , nella quale potess' io fare un vero saggio di sua virtù specifica , e del suo carattere principale .

Cominciai questa estrazione con acquarzen-
te raffinatissima, tirandone così i solfi , o le sue parti resinose al peso di 10 dramme, da 8 oncie di radice : Il rimanente (pogliato interamente delle sue parti resinose , e ben disseccato , pesava 6 oncie sole , dalle quali con acqua piovana distillate ritraffi ancora due oncie di molto duro estratto , il quale era un ammasso delle parti saline della radi-

ce unite ad alcune parti terrestri , che ne sono inseparabili : Quest' estratto era nelle sue parti poco legato , perciocche se li eran tolte le resinose con l' operazion precedente .

Ho creduto dovermi servire di questa doppia estrazione , una con l' acquarzente , e l' altra con l' acqua fatte , persuasissimo , che la virtù di tal radice non risedesse solamente nella Resina ma nelle parti saline ancora , le quali non potevan dallo spirito di vino , ma solamente dall' acqua , essere disciolte .

L' ultima residenza , o capomorto spogliato tanto delle parti resinose , che delle saline , pesava sole 4 oncie .

Da queste due differenti estrazioni m' avvisai , che tal radice contenesse maggior porzione di parti saline , che di resinose , trattene alcune terrestri ; donde io dedussi , che senza l' ajuto dello spirito di vino , avrei potuto con la sol acqua tirar da detta radice e le parti saline e le resinose ; perciocche predominando le saline su di queste , esse potrebbero attenuar le resinose , distaccarle , scioglierle , e stemperarle , per appropriarsele , e farne un corpo , cioè un misto contenente Sali , e resine .

E ciò conforme alla sperienza ; sapendo noi , che sia proprio de' sali lo sciogliere i solidi ; e la pruova ha confermato il mio raziocinio ; perciocche con la sola acqua piovana , e con l' istessa quantità della sudetta radice ne ho io avute 3 oncie e mezza d' estratto molto solido , e legato , & unito altrimenti nelle sue parti , di quelche era l' anzidetto ; dal residuo , qual pesava sole 5 oncie ben disseccato , donde l' acqua non poteva tirarne più cosa , con lo spirito di vino ne ricavai una sola dramma d' una spezie di resina .

Tutte queste fatiche , & osservazioni poco monterebbero , se non avessero seco giunte alcune sperienze sù gli effetti particolari di ciascheduna di dette parti. Non penso far parola affatto di quelle, che dalla distillazione procedono, avendo più di una pruova , che alcune di simili parti , che con abuso si dicono principj , non ritengano virtù alcuna del misto , donde si son cavate : Non può dirli l' istesso di quelle , che noi per mezzo delle differenti estrazioni abbiamo ; sapendo bene , che i prodotti , quali ne risultano , comprendono in ristretto tutti i principj attivi di un misto .

Spero , che mi si porgerà l' occasione, fra questo , e 'l tempo , in cui dovrò io recare in mezzo i fatti , é le mie operazioni sù l' ipecacuana bruna , di far altre sperienze , delle quali la Compagnia sarà informata .

OSSERVAZIONI

*Del Barometro , del Termometro, e della quantità
dell'acqua piovana , e della Neve sciolta caduta
in Parigi nell' Osservatorio Reale nell'
Anno 1699.*

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

LE osservazioni della quantità dell' acqua piovana , che cade sù l' Osservatorio, sono state fatte nell' istessa maniera di quelle , che ne' precedenti Anni si fecero . Si pose per tal effetto.

il 1700. 16. Gennaio .

effetto nella Torre scoperta un vaso di ferro bianco, quale ha 4 piedi di superficie, & intorno un rialto di 6 dita. Ha detto Vaso un pò di pendio verso uno de' suoi angoli, dove è succhiata picciola apertura, & a questa appiccata una doccia, per cui scorre tutta l'acqua, che cade nel cennato Vaso, dentro d'una brocca, che si adatta di sotto. Tosto che ha piovuto, con grandissima diligenza esattamente si misura tutta l'acqua raccolta nella brocca, e si nota in un registro particolare. Una tal misura si fa con un picciolo vaso cubico di 3 dita, sicche 32 linee di altezza d'acqua in detto picciolo vaso, si uguagliano a mezza linea d'altezza su la superficie del gran vaso di ferro bianco: Ond'è, che intorno all'orlo di sopra di questo picciolo vaso cubico, qual'è aperto, si è formata una linea distante 4 linee dall'orlo; affinche riempiendosi detto picciolo vaso fino all'altezza di questa linea, si abbia il valore di mezza linea di altezza d'acqua piovana. Ecco la summa di quella, che è caduta in ciascun mese di detto Anno.

Linee .

Gennajo	11	1
Febrajo	11	1
Marzo	11	1
Aprile	36	1
Maggio	23	1
Giugno	29	1
Luglio	11	1
Agosto	18	1
Settembre	35	1
Ottobre	12	1
Novembre	9	1
Dicembre	15	1

A 4

La

La summa dell' altezza dell' acqua caduta in tutto l'Anno è di 224 l. $\frac{1}{2}$, ovvero di 18. dita 8 l. $\frac{1}{2}$.

Quantunque apparisca quest' Anno estremamente secco, si vede però, che la quantità dell' acqua pochissimo differisca da quella, che negli Anni mezzani suol cadere: s' osservi ancora, che ordinariamente le maggiori piogge avvengano nel mese di Luglio, & Agosto; in quest' Anno però son cadute nel mese di Aprile, Maggio, Giugno, e Settembre; e le maggiori non anno oltrapassate 36 l. in un mese; locche, a paragone della frequenza delle piogge della State, è molto poco. I tre primi mesi, & i tre ultimi di quest' Anno tutti insieme, appena giungono a un da presso alle acque del mese di Aprile, e Settembre uniti: E può osservarsi ancora, che le più abbondanti piogge di quest' Anno sono cadute nel medesimo giorno, e che non sono state continue, e che vi è corso tempo molto considerabile fra di esse, senza che sia piovuto.

Il Barometro, qual si tiene nell'alto della gran Sala di detto luogo circa 20 passi sù del Fiume, è montato nella sua più grande altura del Mercurio, sino a 28 dita, 3 linee, a 21 di Novembre, & a 31 di Dicembre; e 'l maggior di lui abbassamento è stato di 26 dita, 9 l. a 14 di Gennajo, & a 14 di Dicembre; Sicche la differenza delle altezze del Mercurio, tra la maggiore, e minore, è stata di 18 l.

Il Termometro, di cui mi servo per osservare il caldo, e 'l freddo, stà riposto nella Torre Orientale, la quale è scoperta in mantera, che stà riparata dal vento, e dal sole. Fò le osservazioni cotidianamente poco prima di levarsi 'l Sole, perocche questo è 'l tempo, in cui l'aere ordinariamente è più freddo. Ho cercato a determinare in detto Termome-

tro la mezzana sua altezza ; e dopo di averlo lasciato per qualche giorno nel fondo della grotte del cennato luogo, ho ritrovato, che lo spirito di vino si era arrestato all' altezza di 38 sue parti, quale io prendo per un' altezza mezzana ; in maniera che qualora esposto in alcun luogo egli monta a tale altura, io fò giudizio, che la temperatura dell'aria sia tra 'l freddo, e 'l caldo. In quest' Anno, dal primo di Gennajo, sino a 5 di Giugno, poco cambiamento si è osservato nell' altezza del liquore ; sicche in questi due giorni era ella l' istessa di parti 42 a 43 : Pochissime volte è gelato sù 'l principio di Febrajo, nel qual tempo calò il Termometro sino a 29 parti, e mezza, dove per ordinario scende nel maggior freddo ; siccome il più gran caldo avvenne a' principj di Luglio. A 11 di Dicembre il Termometro discese sino a 25 parti, e mezza, che fù 'l giorno più freddo dell' Anno ; siccome a 25 di Luglio, che si fù il più caldo, salì egli a 63 parti, e mezza : Donde, comparando il calor della State con quello dell' aere mezzano, si vede, che sia quasi giunto ad esser doppio del freddo, rispetto a questa istessa condizion mezzana d' aere : quantunque l' osservazion del calore siasi fatta prima di forgere il Sole.

Ho parimente osservato a 23 di Ottobre la declinazione dell' ago calamitato di 8° 10' nell' istesso luogo, e nell' istesso ago, che soglio adoperare per sì fatte osservazioni. E' questi 8 dita lungo, & eccellente quanto mai possa farsi per tal uso ; ma quantunque egli sia leggierissimamente sospeso, io non ritrovo nelle Osservazioni degli Anni di seguito un' istessa progressione di declinazione, o perche la declinazione non si faccia sempre per un moto uguale, o che altra sia la cagione dell' irre-

golarità, quale può ancor provenire dalle osservazioni, quantunque io ci usi tutte le maggiori cautele, che mai sappia; ma sempre è difficile di osservare le minuzie sopra di un Istrumento, il di cui grado appena giugne ad una linea; e molto più difficile sarebbe l'osservarlo, se detto grado fusse di mezza linea, come son que' dell' ordinarie bussole di 3, o 4 dita di diametro. Tutto quel che mai può farsi 'n tal caso, si è, di prendere un lungo ordine di osservazioni, come di 10, o 12 Anni fatte con l'istesso ago, e nell' istesso luogo, e dividere la differenza per lo numero degli Anni; bisognando prima esser certi, che la declinazione non li accrescesse, nè diminuisse di più. Esempio. Sù 'l finir dell' Anno 1686 io ritrovai la declinazione dell' ago calamitato essere di 4 gradi, e 30' verso Ponente, e nel fin dell' Anno ultimo 1699 era egli di 8° 10': la differenza dunque era di 3°, e 40', ovvero 220', qual divisa per 13 Anni, per ciascun Anno dà 17' di movimento da Tramontana a Ponente.



S O L U Z I O N E

D'UN PROBLEMA FISICO MATEMATICO

DEL SIG. MARCHESE DELL'HOPITAL.

P R O B L E M A.

* **I**N un piano verticale ritrovar la Curva EFM; per cui il corpo M cadendo liberamente, e col suo proprio peso, la preme in tutte le sue parti con una forza uguale a quella del suo peso: cioè, che 'l corpo grave M, giunto in un qualunque punto M di detta curva, debba sù di questo operare, secondo la perpendicolare MS con l'istessa forza, che e' premerebbe una linea orizzontale, sù la quale fusse posta. Ovvero (che è lo stesso) se suppongasi, che HC sia la Sviluppata della linea Curva ricercata, in maniera che il peso M attaccato all'estremità di un filo, qual circonda detta Sviluppata, in discendendo per questa linea Curva, in ciascuna posizione del corpo M distenda il filo sviluppato MC con l'istessa forza, come se egli fosse sospeso da questo filo †. Sia la linea orizzontale AP l'asse della curva, qual abbia per applicate le verticali PM: allora che il corpo grave M è piombato dall'altezza PM, acquista egli una certa velocità, con la quale se e' si movesse in un piano orizzontale intorno al centro C, ch-

* 1700. 23. Gennaio.

† Fig. 1.

C, essendo attaccato all'estremità del filo CM, distenderebbe egli questo filo con una tal forza, che diceli *Centrifuga*; ma perchè il corpo M, giunto in M, si muove in un piano verticale, ne siegue, che e' distende il filo MC con detta forza centrifuga, accresciuta da parti del suo peso, che opera su 'l punto M di detta Curva, per pignerlo secondo la perpendicolare MS. Or e' si sa dalle Meccaniche, che se suppongasi, che la parte costante MR della verticale PM prolungata esprima il peso assoluto del corpo M, e che si tiri RS perpendicolare sopra di MS, quale sega ad angoli retti la curva nel punto M; la retta MS esprimerà l'azione del peso M su 'l filo MC, per tirarlo verso S. Dunque non rimane altro, che ritrovar l'espressione della forza centrifuga, con la quale questo corpo distenda il filo MC, per ridurre tal quistione alla pura Geometria. Allo che fare bisogna il Lemma, che siegue.

L E M M A.

Se un corpo M si muova con moto uniforme in una circonferenza, che ha per centro il punto C, e per raggio la linea CM, con una velocità uguale a quella, che avrebbe egli acquistata, in cadendo dall'altezza PM^{*}; io dico, che la sua forza centrifuga sarà a quella del suo peso, come il doppio dell'altezza PM è al raggio CM.

Egli è un principio ricevuto nella Fisica, che i corpi tendano a muoversi per linea retta; dimo-
do che, se il filo CM si rompesse, il corpo M, in
vece di proseguire il suo cammino per la circonferenza

ceq,

* Fig. 2.

renza, si muoverebbe per quella direzione istessa, nella quale e' si rinverrebbe allora, cioè secondo la tangente MT. Supponiamo ora che 'l corpo M scorra su di questa tangente la parte ML in un istante (per cui intendo una parte infinitamente picciola di tempo); egli è chiaro, che nell' istesso istante avrebbe egli scorso sopra la circonferenza un arco MN uguale ad ML: Si unisca NL, e si tiri NO parallela ad MT; quindi ne seguirà per cagion dell' infinita picciolezza dell' arco MN, che possa la linea NO assumersi per detto arco, quale per supposizione è uguale alla retta ML, e così NL può essere tenuta come parallela, & uguale alla parte MO del diametro MK. Ma per proprie-

tà del circolo, $MO = \frac{ON^2}{OK}$; & in mettendo per ON

l'arco MN, e per OK, il diametro MK; si ritroverà, che MO, ovvero NL sia uguale al quadrato dell'arco MN, applicata al diametro MK. Donde si vede, che la forza centrifuga farebbe scorrere al corpo M lo spazio uguale al quadrato dell' arco MN, applicata al diametro MK nell' istesso istante, che questo corpo correrebbe l' arco MN; perciocchè per mezzo di questa forza il corpo M, trovandosi in L, in vece di essere in N, l'avrebbe fatto scorrere la linea NL.

Ma Galileo ha dimostrato, che se'l corpo M si movesse uniformemente con la velocità, che egli ave acquistata, in cadendo dall' altezza PM, scorrerebbe nell' istesso tempo una linea doppia di PM; poichè quest' istesso corpo M con la medesima velocità, e per un movimento uniforme ha corso l'arco MN; è chiaro, che i tempi faranno tra di loro, come queste linee, e che perciò il tempo, che 'l corpo M impiega a cader dall' altezza PM, è al tempo, che

che a scorrer l'arco MN consuma, come $2PM$ è ad MN : Se dunque si faccia come $\frac{2PM}{MN^2}$ ad $\frac{4PN}{MN^2}$ così

PM a $\frac{4PN}{MN^2}$; questo quarto termine esprimerà lo spazio, che scorrerebbe il corpo M nel primo istante di sua caduta (nel quale scorrerebbe parimente l'arco MN); poicché i spazj scorsi, sù la prima origine della caduta, sono tra di loro, come i quadrati de' tempi: Ciò posto, egli è chiaro, che la forza centrifuga del corpo M deve essere a quella del suo peso, come i spazj, che queste due forze fan correre a questo corpo nell'istesso istante; perciocché se bene lo sforzo del peso del corpo M di continuo si accresca durante la sua caduta, & al contrario la di lui forza centrifuga rimanga sempre la stessa in tutto 'l movimento di detto corpo intorno alla circonferenza, che ha per centro il punto C; non si lascia però di confiderare il peso, come uniformemente operante, e senza accrescimento nel primo istante della caduta per l'infinita picciolezza del tempo. Dunque la forza centrifuga del corpo M

farà a quella del suo peso, come LN , ovvero $\frac{2PM}{MN^2}$ è ad $\frac{4PN}{MN^2}$; cioè come il doppio dell' altezza PM al raggio CM. Che conveniva dimostrare.

COROLLARIO.

Quindi è chiaro, che $\frac{2PM \times MR}{AC}$ esprima la forza centrifuga con la quale il corpo M distenderebbe il filo

filo CM *, se e' si movesse in un piano orizzontale intorno al centro C, con una velocità uguale a quella, che in cadendo dall' altezza PM avrebbe acquistata. Ma si è provato, che questa forza deve essere accresciuta dalla retta MS, quale esprime, come il peso del corpo M operi su 'l filo CM secondo la sua direzione MS; perciocche il corpo M si muove in un piano verticale: Donde siegue, che la quistione si riduce a ritrovare una linea curva EFM, nella quale si abbia sempre $\frac{2PM \times MR}{\Delta C} + MS = MR$.

Devesi ricordare, che la retta costante MR è presa su l'applicata PM prolungata, e che ella esprima il peso assoluto del corpo M.

S O L U Z I O N E .

Sian dette la costante MR, a , le indeterminate AP, x , PM, y ; l'arco della curva EFM, v ; Si avrà Pp, ovvero $MK = dx$, $Km = dy$, $Mm = dv$, &c. (in prendendo dv per costante) $MC = \frac{dv dy}{ddx}$ secondo l'art. 79. del libro degl' *Infiniti piccioli*. Per soddisfare alla quistione e' bisogna, che $\frac{2PM \times MR}{MC} \left(\frac{2xy ddx}{dvdv} \right) + MS \left(\frac{ddx}{dv} \right) = MR (a)$: donde si ha $2y ddx + dy dx = dv dy$, & in dividendo il tutto per $2\sqrt{y}$, ne nasce $\frac{2y ddx + dy dx = dv dy}{2\sqrt{y}}$, le di cui integrali donano $dx \sqrt{y} = dv \sqrt{y} - dv \sqrt{a}$; dove s'avverta, che io rislego la quantità costante $dv \sqrt{a}$, perciocche Mm (dv).

* Fig. 1.

(*dv*) essendo l'ipotenusa del picciolo triangolo rettangolo *MKm*, di cui *MK* (*dx*) è un de' lati, ella deve superarlo. Se si metta in questa equazione, in vece di *dv* il suo valore $\sqrt{dx^2 + dy^2}$, se ne didurrà questa $dx = \frac{dy\sqrt{y} - dy\sqrt{a}}{\sqrt{a}\sqrt{y} - a}$, la di cui integrale è

$5ax = 2y - 2\sqrt{2ay - ax}\sqrt{2a} \times \sqrt{ay - ax}$, qual'esprime la natura della richiesta curva, che farà per conseguenza Geometrica, di cui si potran ritrovare tutti i punti, servendosi solamente del circolo, e delle linee rette.

Poiche si ha $dx\sqrt{y} = dv\sqrt{y} - dv\sqrt{a}$, ovvero $\frac{dx}{dv} = \frac{dv\sqrt{y} - dv\sqrt{a}}{dv\sqrt{y}}$, si avrà, prendendo *dv* per co-

$$\text{stante } ddx = \frac{\sqrt{y}}{dv\sqrt{y}} \sqrt{a}; \text{ e per conseguenza } \frac{2PM \times MR}{MC}$$

$$\left(\frac{2ay ddx}{dv dy} \right) = \frac{2y\sqrt{y}}{a\sqrt{y}}, \text{ \& MS } \left(\frac{ndx}{dv} \right) = \frac{a\sqrt{y} - a\sqrt{a}}{\sqrt{y}};$$

$$\text{Dunque } \frac{2PM \times MR}{MC} + MS = MR; \text{ Sicche questa cur-}$$

va ha la proprietà, che si dimanda.

Se si tiri la verticale *AF*, e si disamini la natura di detta curva, si vedrà. 1. che, avendo presa *AB* = $\frac{1}{2}a$, comincierà ella dal punto *B*, dove sega detta verticale ad angoli retti. 2. che ella se ne dilunghi infino ad *E*, in modo che avendo tirata *ED* perpendicolare sopra *AF*, si abbia *AD* = *a*, & *ED* = $\frac{1}{2}a$; dopo di che ella gli si avvicina fino a che la leghi nel punto *F*; in maniera che *2AF* = $3a + a\sqrt{5}$. 3. Che si distenda ella di poi fino all'infinito di più in più, dilungandosi dal suo asse *AP*.

Quin-

Quindi siegue, che'l corpo M. deve cadere dall'altezza AB prima che si muova nella curva BEFM, e

che nella porzione BE si ha sempre $\frac{2PM \times MR}{MC}$ — MS

= MR, cioè, che la parte del peso M, quale opera sopra i punti di BE, deve essere sottratta dalla forza centrifuga, per aver la forza, con la quale il corpo M tira il filo MC.

Se si prenda sopra di AF la parte BG = AB, e sopra ED prolungata la parte EH = 2a, i punti G, H faranno nella sviluppata, e generalmente $\sqrt{AD}$, $\sqrt{PM} :: 2PM$. MC. $6y + 4\sqrt{xy} + 4a$

L'Arco BEFM = $\frac{25a}{\sqrt{2a} \sqrt{xy} - ax}$; e

supponendo, che PM (y) divenga AD (a), si avrà la porzione BE = $\frac{1}{2}$ AD.

Lo spazio BEFMCHGB rinchiuso tra la porzione della curva BEFM, sua sviluppata GHC, e

fuoi due raggi BG, MC = $\sqrt{2a} \sqrt{xy} - ax$ $\frac{\sqrt{y}}{a}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{a}$

$$\frac{12 \cdot xy \cdot 5x^2 \sqrt{y^3}}{21 \times 9 \cdot 10 \times 6 \times 4} + \frac{5 \times 4 \times 6}{11 \times 9 \times 7 \times 5} y + \frac{5 \times 4 \times 6}{11 \times 9 \times 7 \times 5} y + \frac{5 \times 4 \times 6}{11 \times 9 \times 7 \times 5} y + \frac{5 \times 4 \times 6}{11 \times 9 \times 7 \times 5} y + \frac{5 \times 4 \times 6}{11 \times 9 \times 7 \times 5} y + \frac{5 \times 4 \times 6}{11 \times 9 \times 7 \times 5} y + \frac{5 \times 4 \times 6}{11 \times 9 \times 7 \times 5} y + \frac{5 \times 4 \times 6}{11 \times 9 \times 7 \times 5} y + \frac{5 \times 4 \times 6}{11 \times 9 \times 7 \times 5} y$$

Se in luogo di richiedere, che la forza, con la quale il corpo M distende il filo MC, fusse sempre uguale a quella del suo peso assoluto, si domandasse, che in tutto fusse uguale alla stessa linea data b, si rinverrebbe con ragionamento simile al precedente, che l'equazione differenziale $dx = \frac{b \sqrt{y} + a \sqrt{y}}{\sqrt{2ay - by} \pm 2ba \sqrt{ay - a^2}}$ esprimerebbe la natura della curva ricercata.

Memoria 700.

B Se

Se in questa equazione si faccia $d=a$, si ricade nel caso pocanzi spiegato a minuto. La costruzione generale però dipende dalla quadratura dell'iperbole, o dall'invenzione de' Logaritmi, qualora b è minore di a ; e dalla quadratura del Circolo, quando ella è più grande.

* Se si faccia $b=v$, l'equazione differenziale, che esprime in generale la natura della curva ricercata, si cambierà in questa $dx = \frac{ady}{\sqrt{ay^2 - aa}}$ le di cui

integrali donano $x = 2\sqrt{ay^2 - aa}$: Et in conseguenza la curva richiesta sarà in tal caso una Parabola BM, quale avrà per asse la verticale AG, per sommità il punto B, distante dall'origine A della quantità x della retta $AB=a$, e per parametro, una linea quadrupla di AB. Donde si vede, che se 'l corpo M mosso orizzontalmente con la velocità, ch'è acquistata con la sua caduta da A in B, discenda libero nell'aere; e che si concepisca attaccato ad un filo BGC, che giri la sviluppata GC della Parabola BM; la forza con la quale e' tirerà il filo sviluppato MC in ciascuna posizione, sarà sempre uguale a, o, ovvero nulla: Cioè, che la forza centrifuga

$\left(\frac{PM \times MK}{MC} \right)$ con la quale cerca slontanarsi dal centro C nella direzione CM, sia precisamente uguale a quello sforzo, che 'l suo peso fa farli verso il centro C in questa istessa direzione; in modo che il corpo M nell'istessa maniera deve muoversi, come se non fusse attaccato ad alcun filo, e che liberamente cadesse nell'aere. Ma poichè Galileo dimostrò già in una maniera differentissima da questa, rice-

vuta

• Fig. 3.

vuta da tutti i Geometri, che il corpo M mosso orizzontalmente con una velocità uguale a quella, che avrebbe egli acquistata, in cadendo dall'altezza AB, descriverebbe, nell'aere cadendo per proprio peso, quell'istessa Parabola BM, è ella una chiara pruova della bontà della nostra ipotesi.

Questo Problema fu dal Sig. *Bernoulli* Professore in *Groningue* proposto nel secondo Tomo de' supplementi degli *Atti di Lipsia* pag. 291. Ho stimato a proposito di darne qui la soluzione ampia, & intiera; perciocchè ella mi sembrava propriissima a dimostrare la necessità del nostro metodo, senza'l di cui soccorso riuscirebbe difficilissimo, per non dire impossibile, il venirne a capo.

Le dimostrazioni di tutti i Teoremi del Sig. *Huygens* intorno alla forza centrifuga, che si veggono nel fine del suo *Horologium Oscillatorium*, dipendendo dal precedente Lemma, nè, per quel ch'io sappia, ritrovandosi altrove, io le sogglugnerò in poche parole.

PROPOSIZIONE I.

* Se M esprima il peso del corpo M, qual si muove nella circonferenza, che ha per raggio CM con una velocità uguale a quella, che avrebbe egli acquistata, in cadendo dall'altezza PM; egli è chiaro per lo Lemma, che la di lui forza centrifuga sia $\frac{1}{2}PM = M$

$\frac{CM}{2}$; donde nasce, che se $PM = \frac{1}{2}CM$, la forza centrifuga sarà uguale a quella del suo peso. Questo è il quinto Teorema del Sig. *Huygens*.

B 2

PRO.

* Fig. 2.

PROPOSIZIONE II.

Se supponghasi, che il corpo N descriva la circonferenza, che ha per raggio DN, con una velocità uguale a quella, che avrebbe egli acquistata col cader dall'altura QN; * egli è chiaro per lo stesso Lemma, che la forza centrifuga del corpo N

sia parimente $\frac{2QN \times N}{DN}$: Et in conseguenza le forze

centrifughe de' corpi M, N * faranno tra di loro ::

$\frac{2PM \times M}{CM}$, $\frac{2QN \times N}{DN}$, donde si vede, che se li corpi M,

N, siano uguali, la forza centrifuga del corpo M

farà alla forza centrifuga del corpo N :: $\frac{2PM}{2QN}$, $\frac{CM}{DN}$,

cioè in ragion composta della diretta 2PM,

2QN, ovvero de' quadrati della velocità $\sqrt{PM}$, $\sqrt{QN}$, e della reciproca de' raggi CM, DN.

COROLLARIO I.

Se i corpi M, N, supposti uguali, scorrano le loro circonferenze in tempi uguali; le velocità di essi faranno tra di loro, come dette circonferenze, ovvero come i loro raggi. Si avrà dunque in tal caso $\sqrt{PM} : \sqrt{QN} :: CM : DN$, & in conseguenza

$2PM : 2QN :: CM^2 : DN^2$. Donde siegue, che $\frac{2PM}{CM^2} = \frac{2QN}{DN^2}$.

* Fig. 4.
* Fig. 2. e 4.

2QN

$\frac{v^2 QN}{DN} :: CM \cdot DN$, cioè, che le forze centrifughe sono allora tra di esse, come i raggi.

COROLLARIO II.

Se i corpi M, N siano uguali, e le velocità loro $\sqrt{PM}$, $\sqrt{QN}$ parimente uguali; egli è chiaro, che le forze centrifughe $\frac{v^2 PM}{CM}$, $\frac{v^2 QN}{DN}$ saranno tra di loro, come DN a CM, cioè in ragione contraria de' raggi, o de' diametri.

COROLLARIO III.

Se i corpi M, N, & i raggi CM, DN, siano uguali; la loro forza centrifuga farà come $v^2 PM$ a $v^2 QN$; cioè come i quadrati della loro velocità.

COROLLARIO IV.

Se i corpi M, N, e le loro forze centrifughe siano uguali; Si avrà $\frac{v^2 PM}{CM} = \frac{v^2 QN}{DN}$, & in conseguenza $PM \cdot QN :: CM \cdot DN$, & $\sqrt{PM} \cdot \sqrt{QN} :: \sqrt{CM} \cdot \sqrt{DN}$. Dunque, poichè i tempi sono tra di loro in ragion composta, diretta de' [spazi] scorsi, e reciproca delle velocità; il tempo, che 'l corpo M impiega, farà a quello del corpo N :: $\frac{DN}{\sqrt{DN}}$, ovvero $\sqrt{CM} \cdot \frac{DN}{\sqrt{DN}}$, o $\sqrt{DN}$, cioè in ragion ludda-
plicata de' raggi.

B 2

Que₂

Questi quattro Corollari corrispondono a 4.
primi Teoremi del Sig. *Huygens*.

PROPOSIZIONE III.

* Sia il corpo *M* attaccato in *A* al filo *AM*, e detto corpo sia mosso in maniera, che nell'aere descriva la circonferenza, che ha per raggio *CM*, cioè, che 'l filo *AM* descriva la superficie di un Cono retto, formato dalla rivoluzione della retta *AM* intorno all'asse *AC* piantato verticalmente; egli è chiaro, che può considerarsi in tale stato il corpo *M*, come se fosse spinto da due forze, una orizzontale, che cerca allontanarlo dal centro *C*, e quella è la forza centrifuga; l'altra si drizza a spingerlo da alto al basso, e questa è quella del suo peso: or secondo i principj della *Mecanica*, poichè il corpo *M* ha preso la sua situazione, secondo la direzione *AM*, ne siegue, che la forza del peso farà alla forza centrifuga, come *CA* a *CM*; e che

perciò la forza centrifuga $\frac{CM \propto M}{CA} = \frac{2PM \propto M}{CM}$ (per

lo lemma), supponendo, che la velocità del corpo *M* sia uguale a quella, che avrebbe acquistata, cadendo dall'altezza *PM*; donde si deduce $PM = CM^2$

— . Se dunque si prenda *PM* uguale alla metà della terza proporzionale a *CA*, *CM*; egli è chiaro, che la velocità, con la quale il corpo *M* si muove nella circonferenza, che ha per raggio *CM*, sia precisamente uguale a quella, che avrebbe egli acquistata, in cadendo da questa altezza; e così detta

Fig. 2.

* Fig. 2.

velocità si esprimerà per $\sqrt{PM} = \frac{CM}{\sqrt{2}CA}$. Ma poichè il tempo si esprime per lo spazio diviso per la velocità; ne siegue, che 'l tempo, qual'impiega il corpo M a scorrere la circonferenza intiera, si esprimerà per $\frac{1}{\sqrt{2}CA}$; supponendo, che $\frac{1}{\sqrt{2}CA}$ esprima la ragione della circonferenza al raggio.

COROLLARIO I.

* Se il corpo N, attaccato col filo BN al punto B, si muova con un moto conico intorno alla verticale BD, cioè, che detto filo descriva la superficie d'un cono retto, qual'abbia per asse la verticale BD: E' si vede da quel che ho dimostrato, che 'l tempo, qual'impiega il corpo N a scorrere la circonferenza, che ha per raggio DN, s'esprima per $\frac{1}{\sqrt{2}BD}$. Sarà egli dunque al tempo, che 'l corpo M consuma a scorrere la circonferenza, quale ha per raggio CM: $\frac{1}{\sqrt{2}BD} : \frac{1}{\sqrt{2}CA} :: \sqrt{BD} : \sqrt{CA}$, cioè in ragione sudduplicata delle altezze. Questo è il Teorema 8 dell'istesso, in cui si comprende il 7.

COROLLARIO II.

* Se concepiscasi, che 'l corpo M cada da l'una doppia altezza di CA, la velocità, che egli avrà ac-

• Fig. 4.

B 4 Fig. 1.

qui:

quistata per detta caduta, sarà $\sqrt{2CA}$, & il tempo consumatovi in cadere, sarà per conseguenza

$\frac{CA}{\sqrt{2CA}}$, ovvero $2\sqrt{2CA}$; poicché con una tal velo-

cità uniforme avrebbe egli scorso nell'istesso tempo una linea quadrupla. Sarà dunque tal tempo a quello, che 'l corpo M impiega a scorrere la circonferenza, quale ha, per centro il punto C: : $2\sqrt{2CA}$.

— $\sqrt{2CA} : : 2r, c$, cioè, come il diametro alla circonferenza. Or concépendo, che 'l raggio CM sia infinitamente picciolo, la lunghezza AM del pendolo diviene uguale all'altezza AC; e per conseguenza il tempo, che un corpo mosso da un movimento conico impiega a scorrere la più picciola di tutte le circonferenze, che descrive egli intorno all'Asse verticale del Cono, sarà a quello, che impiega per cader da un'altezza doppia della sua lunghezza, come la circonferenza d'un circolo è al suo diametro. Questo è 'l Teorema 9.

C O R O L L A R I O III.

Se $BD=CM$, e che 'l tempo, qual consuma 'l corpo M a fare un giro intorno all'Asse AC, sia uguale a quello del corpo N intorno all'Asse BD, ne siegue per lo primo Corollario ⁶, che CA debba essere uguale a BD, ovvero CM, e così la forza centrifuga uguale a quella del peso. Questo è il Teorema 10: supponendo, che 'l raggio DN sia infinitamente picciolo.

CO

Fig. 2. e 4.

COROLLARIO IV.

* Il tempo del giro del corpo M intorno all'Asse CA è $\frac{c}{\sqrt{2}} \frac{CA}{\sqrt{2}}$; & il tempo, che detto corpo impiegarebbe a cader dall'altezza AM, è $\frac{2c}{\sqrt{2}} \frac{AM}{\sqrt{2}}$. Se dunque questi tempi siano uguali, si avrà $\frac{2c}{\sqrt{2}} \frac{AM}{\sqrt{2}} = \frac{c}{\sqrt{2}} \frac{CA}{\sqrt{2}}$; donde si deduce $AM = \frac{c}{2\sqrt{2}} \frac{CA}{\sqrt{2}}$. E' chiaro dunque, che se 'l seno CA dell'angolo AMC inclinazione del filo su l'orizzonte, sia al raggio, o seno tutto AM, come il quadrato inscritto in un circolo, è al quadrato della sua circonferenza; il tempo, che 'l corpo M impiega a fare un giro intiero intorno al suo Asse AC, farà precisamente uguale a quello, che e' consumerebbe, in cadendo da un' altezza uguale alla lunghezza del filo AM. Questo è il Teorema 11.

PROPOSIZIONE IV.

* Si dimostra nella Mécanica, che la forza, con cui il corpo M operà secondo la direzione AM, sia a quella del suo peso, con cui fa azione da alto a basso, come AM ad AC, e perciò $\frac{AM \times M}{AC}$ esprima la forza, con la quale il corpo M tira il filo AM. Per l'istessa ragione $\frac{BN \times N}{BP}$ esprimerà quella, con cui

11

Fig. 2.

Fig. 2. e 4.

Il corpo N tira il filo BN. Se dunque si supponga, che AC, & BD siano uguali tra di essi, come ancora i pesi de' corpi M, N; ne siegue, che le forze, con le quali detti corpi tireranno i loro fili, saranno nell'istessa ragione delle lunghezze AM, BN di detti fili. Questo è il Teorema 12.

PROPOSIZIONE V.

1.° Se un corpo M, attaccato in C al filo CM, descriva, in cadendo, il quadrante del circolo AMB terminato dalla verticale CB, e dall'orizzontale CA; è chiaro per lo lemma, (tirando MP parallela a CB), che la forza centrifuga sia $\frac{2PM \times M}{CM}$ in qualunque luogo stiasi il punto M. Se dunque si supponga, ch'è si ritrovi in B, la forza centrifuga sarà 2M; perciocchè allora PM è uguale a CM, ovvero CB: Ma deve ella essere accresciuta di quella del suo peso intiero (poicché CB è una linea verticale, o a piombo) per aver la forza totale, con cui il corpo M giunto da A in B, tira il filo CB. Questa forza dunque sarà tripla di quella del suo peso. Questo è il Teorema 13.

PROPOSIZIONE VI.

• Ritrovare la curva AM, che abbia per asse la verticale AP, la di cui proprietà sia tale, che, facendo muovere l'asse intorno a se stesso su de' perni E, F, con una forza capace di rilevare il

Fig. 5.

Fig. 6.

il peso M attaccato al filo MC , che cigne la sviluppata BC , il tempo, che 'l corpo M impiega a fare il giro intorno alla verticale EF , sia sempre l'istesso in qualunque luogo si trovi della curva AM .

Egli è chiaro, che la parte DM del filo MC descriva la superficie d'un cono retto intorno all'asse DP , in modo che il filo DM può considerarsi come appiccato in D , mentre il corpo M descrive la circonferenza, quale ha per raggio l'orizzontale MP . Perchè dunque il tempo, che consuma a scorrere detta circonferenza sia sempre l'istesso in qualunque luogo della curva AM , che 'l corpo M possa rinvenirsi; E' bisogna, secondo il primo Coroll. della 3. Propos., che l'altezza DP del cono sia in tutto uguale ad una linea data, a : Donde facilmente può conchiudersi, che la linea curva ricercata AM sia una Parabola, il di cui Parametro è doppio della linea data a ; perciocchè e' si fa, che la parte DP dell'asse, compresa tra la perpendicolare DM alla Parabola, & una applicata MP all'asse, sia sempre uguale alla metà del Parametro.



MANIERA GENERALE

In determinare le forze, le velocità, i spazi, & i tempi in tutte sorti di movimenti rettilinei variati a distrezione, essendo data una sola di dette quattro cose.

DEL SIG. VARIGNON.

• **P**osti tutti gli angoli rettilinei della Fig. 1, retti: siano 6 qualunque curve TD, VB, FM, VK, FN, FO, di cui le tre prime esprimano per mezzo della loro ascissa comune AH lo spazio scorso da un qualunque corpo, mosso a piacere lungo AC. Sia parimente il tempo impiegato a scorrerlo, espresso dall' ordinata corrispondente HT della curva TD: La velocità di detto corpo in ciascun punto H, dall' ordinate ancor corrispondenti VH, VG delle curve VB, VK: quello che egli ha di forza verso C in ciascun punto H, indipendentemente dalla sua velocità (che da ora innanzi chiamerò *Forza centrale* per la tendenza al punto C, come centro) s'esprimerà parimente per le ordinate corrispondenti ancora EH, FG, FE delle curve, FM, FN, FO.

Quindi è, che la curva TD, alla quale terminano le ordinate HT in T, si chiamerà la *Curva de' Tempi*: Le due Curve VB, VK, alle quali le ordinate corrispondenti, & uguali VH, VG terminano in V, si diranno le *Curve delle Velocità*: In
fine

1700. 30. Gennaio.

sine le 3 Curve FM, FN, FO, alle quali le ordinate corrispondenti ancora, & uguali FH, FG, FE, terminano in F, si chiameranno le Curve delle Forze.

Posto ciò; siano i spazj scorsi $AH = x$, i tempi impiegati a scorrerli $HT = AG = t$, le velocità in H (che chiamerò finali) $HV = AE = GV = v$, le forze centrali corrispondenti $HF = EF = GF = \gamma$. Si avrà da ciò dx per lo spazio scorso da una velocità quasi uniforme v per ciascuno istante; dv per l'accrescimento di velocità, che si è fatto; ddx per quello spazio, che si scorre in virtù di questo accrescimento di velocità, & dt per questo istante.

A buon conto, consistendo la velocità nella ragione dello spazio scorso per un movimento uniforme a' tempi impiegati a scorrerlo; si avrà $v = \frac{dx}{dt}$ per una prima regola, la quale darà $dv = \frac{ddx}{dt}$, facendo dt costante.

Inoltre i spazj scorsi da un corpo mosso da una forza costante, e continuamente applicata, quale appunto si concepisce per ordinario essere il peso, essendo in ragion composta di detta forza, e de' quadrati de' tempi impiegati a scorrerli; si avrà parimente $ddx = \gamma t^2$, ovvero $\gamma = \frac{ddx}{dt^2} = \frac{dv}{dt}$; Locche fa un'altra regola $\gamma = \frac{dv}{dt}$, la quale con la precedente $v = \frac{dx}{dt}$ soddisfa a tutto quel, che si propone qui a risolvere.

REGOLE GENERALI

De' movimenti per linee rette.

$$1. \quad v = \frac{dx}{dt}$$

$$2. \quad y = \frac{1}{w} \left(\frac{ddx}{dt^2} \right)$$

LISO . Presentemente io dico , che essendo date a discrezione una delle 6 sopradette Curve , si possano sempre dedurre le 5 altre per mezzo delle due regole ; supposte le risoluzioni , e le integrazioni necessarie delle equazioni in quistione .

La pruova di questa Proposizione è facile; perciocche, se si abbia qualunque ragione variabile, o costante, per cagion di esempio, delle velocità VH (v) alli spazj (corsi AH (x) , cioè l' equazion della curva delle velocità BV.

1. Questa equazione, in cui le variabili sono x , & v , darà il valore di v in x , e nelle costanti, qual valore (reg. 1.) formerà con $\frac{dx}{dt}$ un' altra equazione, nella quale vi faran solamente le x , t , e le costanti, la quale in conseguenza sarà quella della Curva de' tempi DT, le di cui ordinate corrispondenti HT (t) esprimeranno i tempi necessari, per venire da A in H.

2. L'equazione data della Curva VB, donerà ancora il valore di dv in x (io vi comprendo parimente le dx), e nelle costanti, qual valore (reg. 2.) formerà con ydt un' equazione, nella quale vi faran

ran tre sorti di variabili y , x , & t . Ma quella della curva de' tempi DT ritrovata, dando parimente i valori di x in t , e di t in x ; se sostituiscasi l'uno dopo l'altro ciascuno di detti valori di x , e di t , in questa equazione de' tre variabili; la sostituzione del valore x , non vi lasciando altro, che y , & t di variabili; detta equazione diverrà quella della Curva delle forze; e la sostituzione del valore di t , non vi lasciando parimente altro che y , & x di variabili, tal equazione diverrà ancora quella della curva delle forze FM.

3. Non avendo l'equazione ritrovata per la Curva NF altre grandezze variabili, che y , & t , darà ella parimente il valore di y in t , e nelle costanti, qual valore (reg. 2.) formerà con $\frac{dv}{dt}$ un'altra equazione nella quale t , & v , saran solamente grandezze variabili; & in conseguenza sarà quella dell'altra curva delle velocità VK.

4. L'equazione in fine della curva delle velocità VB data, facendo ancora il valore di x in v , e nelle costanti; e quella, che se n'è dedotta (num. 2.) per la curva delle forze FM, dando parimente un valore di x in y , e nelle costanti: Questi due valori di x , formeranno ancora un'equazione, quale non avrà altre grandezze variabili, che v , & y , & in conseguenza sarà ancora quella della terza curva delle forze FO.

Ecco come delle 6 Curve, che nella figura si veggono, essendo data la sola VB delle velocità, si possono le 5 altre didurre: Lo stesso parimente avverrà, se si voglia dare alcun'altra di dette linee, essendo la maniera di dedurle sempre uniforme. Locche &c.

Ejemp.

Esempio I. Per metter quest'uso in chiaro, gioverà l'esempio il più semplice: Supponiam dunque, (se si voglia) come nell'ipotesi del Galileo, intorno al peso, che gli spazj AH (x) siano come i quadrati delle velocità corrispondenti VH (v) in maniere che VB sia una parabola, il di cui luogo sia $x = vv$.

1. Si avrà $v = \sqrt{x}$. Dunque (reg. 1.) $\frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$, ovvero $dt = \frac{dx}{\sqrt{x}}$; locche darà $t = 2\sqrt{x}$, ovvero

$x = \frac{1}{4}tt$ per luogo della curva de' tempi DT. Sarà perciò questa curva una Parabola ordinaria, & i spazj AH (x) seguiranno parimente i quadrati de' tempi HT (t).

2. Donde si vede già, che faran quì i tempi, come le velocità; cioè AG (t) in tutto a GV (v) in ragion costante; & in conseguenza parimente VH sarà una linea retta, che passerà per A.

3. L'equazione data $x = vv$ della curva delle velocità BV, darà ancora $dv = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$. Dunque

(reg. 2.) $y = \frac{dx}{2dt\sqrt{x}}$. Ma si è ritrovato (num. 1.) $x = \frac{1}{4}tt$; locche dà $2\sqrt{x} = t$, & $dx = \frac{1}{2}tdt$. Dunque

$y = \frac{dx}{2tdt} = \frac{1}{4}$. L'istessa cosa si ritroverà ancora per mezzo della sola equazione $x = \frac{1}{4}tt$ della curva FM, in facendo dt costante; poicche allora, dando questa equazione $dxc = -$; la seconda regola

darà parimente $y \left(\frac{d^2x}{dt^2} \right) = \frac{dt^2}{2xdt} = \frac{1}{4}$. Donde

de

de si vede, che le ordinate uguali FH, FG, FE, debbano quì essere costanti; e le linee FM, FN, FO, rette parallele, la prima ad AH, e le due altre ad EG. Le forze centrali perciò del corpo mosso, che tali ordinate esprimono, devono essere quì sempre uguali, ovvero un' istessa in tutta la durata di queito moto, come ordinariamente si suppone del peso.

Si vede dunque, che in questa ipotesi de' spazj AH, come i quadrati delle velocità VH, cioè dove si suppone BV Parabola ordinaria, DT sarà ancora un'altra; e le 4 altre linee VK, FM, FN, FO; saranno altrettante rette, la prima delle quali passerà per A, la seconda sarà parallela ad AH, e le due altre ancora parallele ad EG.

Esempio II. Supponiamo ora, che la forza centrale del corpo mosso sia costante, come per ordinario si crede del peso: Le ordinate perciò uguali FH, FG, FE, quali esprimono tal forza, essendo sempre le stesse, e costanti; non solamente FM, FN, FO, faranno linee rette, la prima delle quali sarà parallela ad AH, e le due altre ad EG; ma ancora il valor di esse y , parimente costante. Per ca-

gion di esempio $= a$, darà (reg. 2.) $a = \frac{dv}{dx}$, ovvero $dt = \frac{dx}{v}$. Dunque (reg. 1.) $v = \frac{dx}{dt}$, ovvero $v dv = a dx$; locche dà $\frac{v^2}{2} = ax$, ovvero $vv = 2ax$

per luogo della Curva delle velocità BV, la quale deve in conseguenza essere quì una Parabola, come si era supposta nel primo esempio. Servirà dunque il suo luogo $2ax = vv$, come parimente nel primo esempio, a ritrovare que' delle linee DT, KV. Et in conseguenza venendo la forza centra-

Memor. 1700.

C

le

Te del corpo mosso, supposta ancora costante, si avrà la natura delle 6 linee FM, FN, FO, BV, DT, KV.

Si ritroveranno nell' istessa maniera le medesime cose in tutte altre ipotesi, senz' altra differenza, che nella difficoltà del calcolo, che qui imbarazzerebbe: E perciò questi due esempj bastano.

OSSE R V A Z I O N E.

Prima di por fine, è bene l'avvertire, che senza alcuna novella ipotesi, le due regole antecedenti ne diano alla prima la *Prop. 29. del lib. 1. del Signor Newton de Phil. nat. Princ. math.* In fatti queste due regole danno $dt = \frac{dx}{v}$; $dt = \frac{dv}{g}$, e per conseguenza $\frac{dx}{v} = \frac{dv}{g}$, ovvero $y dx = v dv$; locche dà parimente (s, significa somma) $y dx = \frac{1}{2} vv$, ovvero $v = \sqrt{2 y dx}$: Cioè in generale le velocità VH come le radici quadrate de' spazj compresi tra AH, FH, e la curva MF; qualunque siano le forze y (FH). Come il Signor Newton ha dimostrato nella prima parte di detta *Prop. 29.*

Di là ne siegue ancora, e dalla prima delle due regole antecedenti, che $dt = \frac{dx}{v}$: Donde si vede ancora in generale, che se VB, invece di essere una curva delle velocità; fusse tale, che VH sempre fusse in ragion reciproca delle $\sqrt{2 y dx}$, cioè in maniera, che da per tutto si avesse $VH = \frac{1}{\sqrt{2 y dx}}$ tenendo allora $VH \times dx = \frac{dx}{\sqrt{2 y dx}}$, si avrebbe pa-

parimente $dt = VH \cdot dx$, & in fine $t = rVH \cdot dx$,
cioè i tempi TH, come i spazj corrispondenti
compresi tra AH, HV, & VB: Come ha dimo-
strato ancora il Signor Newton nella 2. pars. della
detta Prop. 39.

O S S E R V A Z I O N I

SU LE PIANTE, CHE NASCONO NEL
FONDO DEL MARE.

DEL SIGNOR TOURNEFORT.

• **P**ER far distinzione tra le piante, che nascono
nel fondo del Mare, e quelle, che ne' lidi
di esso crescono, è bene, ad esempio di alcuni
Autori Latini, di chiamar le prime Marine, &
alle altre dar il nome di Marittime.

Tutte le piante Marine sinora osservate pos-
sono ridursi a quattro principali differenze, essen-
do elle, o molli, e pieghevoli, ovvero dure, come
pietre, o lignose, come Alberi, ricoperte però da
corteccia molliccia, o in fine dure al di fuori, e
ripiene d' una materia spugnosa.

Le piante molli Marine, alcune an foglia, &
altre nò; quelle, che le anno, si riducono alle spe-
zie di *Fucus*, & ad alcune altre di Corallina; quel-
le, che ne son prive, propriamente son le spugne,
l'*Alcyonium molle Imperati*, e simili. Sotto le pian-
te mari ne pietrose devono noverarsi le spezie di Co-
rallo, di Madrepora, e tutti i Funghi pietrosi; E
sotto le piante legnose ricoperte di corteccia mol-
liccia, tutte le spezie di *Lithophyton*. In fine l'*Al-
cyonium durum Imperati* dimostra, che nel Mare

C 2

vi

• 13. Febrajo 1700.

vi sian piante dure al di fuori, ma spugnose, e molto molli per l' indentro .

Tutte queste piante si nutricano in una maniera molto differente da quella , che le terrestri fanno . Ogn' un sà , che le ultime anno le radici , quali ricevono il sugo nutricevole da pori della Terra , che ne sono imbevuti ; essendo essi , come tante picciole conserve destinate per fornir loro una nutrizione convenevole . Sembra allo 'ncontro , che 'l fondo del Mare non contribuisca altro , che a sostenere le piante Marine : Sono elle fortemente attaccate a' scogli , e nascono sopra di durissimi selci , sopra a conchiglie , e sopra di tutti i Corpi , che nel fondo delle acque incontrano . La parte , che vi si attacca , non è capace di ricevere alcuna nutrizione , essendo ella incollata sù la superficie di durissimi corpi sordissimi , e molto secchi , quali appunto sono i scogli , le selci , & i nicchi . Non essendo perciò le radici di tali piante formate a procurarsi 'l loro nutrimento da pori de' Corpi , che le sostengono , per ordinario non sono esse fibrose , nè capellute , ma distese soventi volte , in maniera di piastrelle , o di foglietti , abbracciando con una molto ampia superficie fortemente i Corpi , sù de' quali son esse nate . * Teofrasto con qualche ragione ha detto , che le piante marine non abbiano affatto radici , ma che sian attaccate al fondo del mare , come il *Lepas* , qual' è una conchiglia chiamata in Francese *Occhio di Becco* , il di cui Animale è sì fortemente appiccato a scogli , che è difficile a staccarlo senza la violenza della punta di un Coltello . Fra tutte le cennate piante marine da me osservate , la *Madrepora ramosa Imperati* propriamente ha le radici fibrose , le quali debol-

men-

* *Lib. 4. cap. 7.*

mente s'insinuano ne' pori de' corpi , che la sostengono ; essendo piuttosto tanti cordoni attaccati sù la superficie delle selci , quali stringono fortemente , per meglio rassodare il rimanente della pianta.

Non ritrovando dunque dette piante il lor nutrimento sopra a' Corpi , dove nascono , devono esse procurarselo altronde ; & è molto verisimile , che sia questi quel limo salito , grasso , viscoso , mucilaginoso , simile alla gelatina , di cui il fondo del Mare è immastriciato , e che facilmente si scuopre dopo il riflusso delle sue acque ; perciocche difficilmente , e con gran pena può camminarsi per que' luoghi , che anno esse abbandonati , per cagion del limo , che li rende sdruccevolissimi . E' detto limo un deposito di tutto ciò , che le acque del Mare anno di più ghiaioso , & olioso , che precipita continuamente , come le poltiglie , che le acque dolci insensibilmente depongono nel fondo de' vasi , che le contengono , formando una specie di fango , che diceli *Terra Adamica* , molto propria per la produzione delle piante : Può ancora crederli , che oltre alla gran quantità de' pesci , e di piante , che di continuo muojono , e si corrompono nel mare , contribuisca ancora l' aere alcuna cosa ad accrescere detto limo , di cui parliamo ; perciocche si osserva , che la *Terra Adamica* rinvenghasi in maggior quantità ne' vali coperti semplicemente con una tela , che in altri suggellati ermeticamente .

Dunque il limo , che stà nel fondo del Mare , porge il nutrimento principale alle piante marine , e questo non può entrare , che per di fuori , insinuandosi ne' pori delle loro radici , o de' loro tronchi ancora . La direzione delle fibre delle radici si avvisa nel corallo , in molte specie di Madrepo-

re, e del *lithophyton*. E' verisimile ancora, che la Corteccia tartarosa, di cui son ricoverti i Coralli, serva a feltrare, e fornire alcun succo nutrizio; appunto come la barba delle piante, quali nascono in luoghi molto secchi, che procura loro alcun rinfresco; non essendo esse altro, che un ammasso di molte fila di bambagia, quali sono come tante lesche, che s' imbevono dell' umidità dell' aere.

Egli è frattanto molto difficile il concepire, come le piante marine, che son come legni, o pietre dure, possano nel mare nutrirsi così bene, che ve ne siano alcune, quali fermamente non sono attaccate a parte alcuna, se non se forse ne' primi giorni del loro nascere. Le spezie di coralli, e di Madrepora, i Funghi marini, la *Tubularia marina*, *rubra* L. B. sono così dure, come le pietre: Puol esser forse, che non le man tanto, quanto i denti degli Animali, le ossa degli Adulti, le corna, il cuore d' una vecchia Quercia, che l' Ebano, o' l' legno di ferro; e che siccome può farsi, che 'l succo nutrizio in questi corpi, incontrandosi in una tessitura strettissima, li renda sì duri, così in quelle, simigliante disposizione ritrovando, li stringa parimente, & indurisca. Ma che penserem noi di alcuni Funghi marini, che non simigliano ad alcun corpo, come quello, che dicesi Berretta di Nettuno? E' questo sì dita e mezzo alto, e 7 nella sua base largo, che insensibilmente si rileva, & in fine ritonda a forma di berretta, o di cupola a sfogli, disposti nel di fuori a mazzetti, le di cui lamine sono merlate a forma di cresta di Gallo, che rappresentano in certo modo una testa nascente inanellata. La struttura interiore è differente, essendo ella leggermente sca-

nalata , con sopra disperfi alcuni piccioli granelli , & alcune ponte ottuse , non più lunghe di una linea. Nel Mar Rosso si osservano molti di questi , simili nella struttura , come nel Seno Persico ancora ; ma per ordinario questi son molto piccioli , e niente somigliano alla Berretta di Nettuno . Quello , che *Clusius* ha chiamato *Fungus Saxeus Nili major* , è molto più piano , e simiglia agli ordinari nostri Funghi , quantunque per di fuori sia egli a sfogli. Se ne veggono alcuni , benchè rari , che anno un picciolo gambo , che li sostiene , il quale è molto fragile ; frattanto dee crederli , che nel loro nascere fossero attaccati al fondo del Mare per cosa limigliante ; e che secondo tutte le apparenze , qualora non anno più detto gambo , li nutriscano da alcun succo , che l'acqua del Mare in cui sono immerli , li somministra , & insinua ne' loro pori. Vediam noi alcune pietre molto più dure de' funghi , di cui parliamo , le quali divise assolutamente da tutti gli altri corpi , non si rimangono dal crescere per lo soccorso , che l'aere , e l'acqua piovana loro porge. Ho io una selce molto dura , che in crescendo nel fondo del Mare , ha con se inviluppata una porzione di conchiglia detta *Purpura testa nigra* : E pure egli è probabile , che detta selce sia nel Mar cresciuta , senza di essere attaccata ad alcun corpo .

Questi funghi pietrosi , che in una mirabil maniera sono organizzati , e che non cambiano mai nelle spezie dell' istesso genere , par che ne persuadono , che le selci abbiano i loro semi particolari , e questi che siano stati liquidi , quali appunto son i semi di molte piante marine pietrose , che or ora vedremo . Tutta la differenza , che si avvisa tra le piante marine , e le selci , si riduce a che gli or-

gani degli uni sian sensibilissimi, quando quelli degli altri non lo sono; ma chi può dubitare, che nelle pietre non vi sia una struttura interiore, ravvisando alcune vene particolari, secondo le quali più agevolmente si fendono, quali non sembra, che altra cosa sian, se non che la direzione delle loro fibre? Ho presso di me una pietra, nella di cui superficie con una lente ravviso un'infinità di piccioli buchi, che sembrano orifizj di svariati docci, da quali sembra esser composta. Ho parimente petrificazioni, quali dimostrano, che la prima formazione delle pietre, le più dure ancora, dipenda da una materia liquida; perciocche non può affatto concepirsi, che una pietra da fucile siasi formata nel vano d' un *Echinus* impietrito; quale non ha altra apertura, che una picciola buca, senza immaginare, che siavisi introdotto un liquore, & ivi congelato. Ne ho un' altra bellissima formata nel vano d' una conchiglia, chiamata da Rondelezio *Concha Crassa testa*: E' questa durissima, e rassomiglia un poco al Cristallo di Rocca; e pure e' bisogna, che la materia di questo corpo siavi scorsa, come in una forma, per l'apertura, che soggiano i due stipiti della Chiocciola, quale apertura non si distende più di tre, o quattro linee; poicche i due labri del rilievo in detto vano non sono molto distanti l' uno dall' altro. Potrebbe ancora immaginare, che forse la creta bianca in alcun tempo sia stata liquida; perciocche come possiam concepire, che alcune spezie di *Echinus* impietrite, quali anno una molto picciola buca, si ritrovino piene di detta creta dentro a terreni rossicci, e di natura affatto diffenti, come son que' di *Beerchere*, e di *Maintenon*, ove molto spesso ritrovansi ne' tempi, che

che si nettano gli acquidotti? Ma queste sorti d' inchieste richiedono una dissertazion particolare. Ritorniamo alle nostre piante Marine.

La tessitura di queste molli, come le spezie di *Fucus*, non sembra molto differente da quella delle piante ordinarie. Le spugne ne anno una, che sembra alle prime molto particolare; ma se con diligenza si disamini, non par che differisca dalle altre piante, se non se che il loro corpo fibroso, e reticolato è tutto scoperto; e quel delle piante ordinarie ha le maglie della rete dell' istesso corpo ripiene di una carne particolare, quale altra cosa non è, che un succo spessito ne' piccioli sacchi di dette maglie. Questo corpo reticolato si divide molto bene in quella spezie di spugne, che *Imperatus* ha detto *Spongia Velaris*. Nelle comuni egli è molto più ristretto: dall' America si recano spugne; le di cui reti somigliano in alcuna maniera a i punti di Malines: Ve ne sono altre, che fan sembiante d' un sasso, quali son votate in doccie; & alcune sono lunghe, e sode della figura delle nostre falciccie. Questo corpo reticolare maravigliosamente bene ravvisasi non solamente nelle spezie del *Lithophyton*, nel *Frutex Marinus elegantissimus Clusii*, & in quello, che io ho detto *Lithophyton reticulatum luteum maximum*, ma ancora nelle spezie di *Eschara*. Io ne ho una, qual non differisce dalla spugna in altro, che la sua rete nella consistenza è simile al corno.

Per quello s' attiene alla struttura delle piante marine pietrose, non differisce ella guari, come abbiain detto, da quella delle pietre. Non ci riman dunque altro a disaminare, che la fabrica di quelle, che son dure per di fuori, e molli per di dentro, come l' *Alcyonium durum Imperati*.

vero legnose, e coperte di una corteccia molliccia, comè le spezie di *Lithophyton*. L'*Alcyonium durum* non sembra diverso dalla spugna naturalmente rinchiusa in un guscio molto duro, l'esterior parte di cui è bianchiccia, e zigrinata: Questa pianta ritrovasi attaccata a scogli nel fondo del Mare intorno all'Isole di *Veret*, & a quelle di *Marsiglia*. Le spezie di *Lithophyton*, che nascono nel Mar Mediterraneo sembrano alle prime di essere scheletri, o le parti legnose delle piante morte nel fondo del Mare ricoperte da una sorta di corteccia Tartarosa, o limo indurito, che intieramente le cigne. La maggior parte de' curiosi è di questo avviso; ma facilmente si ricrederà, se ponga gli occhi sopra di quelle belle spezie di *Lithophyton*, che nascono nel Mar dell'Indie Occidentali. Sono queste piante composte da due parti; una è legnosa, e soda, con una picciola buca nel mezzo, qual sembra destinata per contenere alcuna spezie di midolla, quale forma il tronco, e le branche del *Lithophyton*, & è fragile; in accostandola però alla candela accesa, ella arde, e pute, come un pezzetto di corno, o come la penna degli Uccelli, senza rimaner cenere, come il legno, ma una sorta di carbone molto spugnoso, e fragile, come appunto fan le penne; donde io mi avanzo a credere, che detta parte contenga quantità di sal volatile. E' ella ricoperta d'una corteccia molle, la di cui tessitura in alcun modo è maravigliosa. In quella, ch'io ho detta *Lithophyton Americanum maximum pullum tuberculis sursum spectantibus obsitum*, è la corteccia bruna, grossa una linea, e mezza, foderata per di dentro da una membrana molto sottile, che forma un doccio, in cui il corpo legnoso di detta pianta è compreso,

come in una guaina; La corteccia è quasi spugnosa, e croccia sotto a' denti, come se si masticaſſe calcina temperata con molto ſabbione: Ella è coſtantemente diviſa nella ſua groſſezza in 8, o 9 nicchie, della lunghezza di circa una linea, nelle quali ſpeſſe volte ſi rinvenſono alcuni granelli neri molto rotondi di un terzo di linea di diametro, per un lato però compreſſi; che potrebbe far credere di eſſer eſſi i ſemi di detta pianta. La parte eſteriore di detta ſcorza è tutta piena di tumoretti, una linea lunghi, uncinati, con la punta rivolta in dentro; e ſpeſſo ſi oſſerva nella baſe di queſti piccioli uncini un forellino, che ſovente comunica con le nicchie pocanzi dette. Il *Lithophyton Americanum maximum cinereum cortice punctato*, non ſolamente differiſce dal ſudetto nel colore, ma ancora perche le nicchie della di lui corteccia ſono aperte per di fuori con una buca ritonda del diametro di un terzo di linea. Sembra detta ſcorza ancora nel maſticarla ſabbionofa, che gioverebbe molto al penſier di coloro, che credono di eſſer ella un limo indurito, meſcolato con ſabbia: Biſogna però, oltre alla ſtruttura regolare, e coſtante, pur ora diviſata, avvertire ancora, che la parte legnoſa delle ſpezie del *Lithophyton* è rilevata, e ſolcata, come da piccioli fili, o canaletti diſteſi in tutta la lor lunghezza, nelle quali la guaina membranofa delle parti molli eſattiffimamente ſi adatta; locchè non rinverrebbeſi ſù de' ſcheletri delle piante morte coperte di limo: Queſte allo 'ncontro divengono liſcie, per la forza dell' acqua del Mare, che di continuo le lava, nè ſi ricoprono più con altra corteccia. Ho fatte le ſteſſe oſſervazioni ſopra di molte altre ſpezie di *Lithophyton*, delle quali id parola nel libro *Inſtitutiones Rei herbariae*.

Do.

Dopo di aver disaminata la struttura delle piante marine, bramerebbesi alcuna contezza sicura intorno alla struttura de' loro fiori. Teofrasto nel suo quarto libro dell' Istoria delle piante sì spesso parla de' fiori di quelle, che nascono nel fondo del Mare, che sembra non poter noi dubitare, che non fioriscano; ma lo non sò altro Autore, che fuor di lui abbia fatta parola di questa sorta di fiori; e per qualunque cura, ch' io abbia tenuta nel divisar ciò ne' miei viaggi di Spagna, e di Portogallo, nommai ho ritrovata cosa, che mi abbia soddisfatta.

Per quel, che si attiene a semi di dette Piantte, molto difficile riesce lo scoprirle. Siam ben tenuti al Signor *Cestone* dotto Speciale di Livorno, per averne dimostrato, che quelle, che diconsi Olive di Mare sù le coste del *Mediterraneo*, etano i veri frutti dell' *Alga angustifolia Vitriariorum* C. Ba. avendone data la figura nel libro, che ha per titolo, *La Galleria di Minerva*. Le osservazioni, che si son fatte sù i coralli, dan luogo a proporre alcune conghietture sù la moltiplicazione delle Piantte Marine pietrose. Si è osservato, che l' estremità de' rami del corallo si gontjno e ritondino, e divengan una spezie di cassette divise in alcune nicchie ripiene di un latte agro, caustico, e viscoso: Scorre questo fuor delle sue nicchie, cade nell' acqua, e senza mischiarsi con esse, come farebbe appunto una goccia d' olio greve, qual è quello di cannella, o di lasso frasso, si attacca sopra di tutti corpi, che incontra, e facilmente (come propoli io nelle Memorie dell' Anno 1692) ^{vi}

* Vedi le Mem. dell' Accad. 1692. al tit. di Rilezioni Fiscali &c. pag. 105.

vi s' invischia alcun seme minutissimo , quale venendo a mignolare , produce una picciola punta rossiccia , che sviluppandosi , s' erge in una pianta di corallo . S' incontrano comunemente questi embrioni sù la maggior parte de' corpi , che si traggono dal fondo del Mare . Ho presso di me molti Funghi Marini , e molte conchiglie , che ne son ripiene ; e nel Gabinetto di Pisa si mostra una branca di corallo attaccata sopra di un pezzo di cranio umano . E' non ha molto , che intorno alla Jamaica rinvennessi un fiasco , che n' era tutto carico . I Signori Principi di Radzivil mi an fatto l' onore di assicurarmi , che avevano essi de' bellissimi nel loro Gabinetto , nati sopra svariate forti di corpi . Potrebbe si con ciò stendere queste conghietture sù le piante marine pietrose . L' umor che si ritrova ne' granelli del *Sargazo d' Aosta* , e nello spezie di *Aciparia d' Imperatus* , sembra destinato all' istesso uso . Ritrovandomi in *Gibilterra* , osservai , che detto umore , quantunque fluidissimo , molto difficilmente mescolavasi con l' acqua del Mare ; non potei però ravvisarvi alcun granello , o concrezione alcuna , che risomigliasse in qualche modo a quel che può dirsi seme : Frattanto l' esempio del corallo , e di molte piante ancora , che nascono sù la Terra , potrebbero con ragione far sospettare , che vi siano , benchè sfuggano da nostri sensi : I piccioli granelli , che ritrovansi sul lato della Pianta detta *Lenticula Palustris lacifolia punctata* , son ripieni di una polvere più sottile del fiore di solfo : L' istessa osservati nelle cassette del *Muscus terrestris clavatus* , & io non so , se i granelli della polvere delle *Alge* , e *Lichen* , stemperati nell' acqua potrebbero distinguersi : Non è perciò maraviglia , che vi sian
li-

liquidi, ne' quali si sciogliono semi, che non si possono cogli occhi divisare. Chi mai avrebbe credute prima de' Microscopi, che nella maggior parte de' liquori, vi si contenesse quantità sì grande di piccioli Animali? è facile, che la Natura abbia destinati i liquori delle piante Marine a portar i semi di esse nel fondo dell' acqua, per appiccicarli sù di altri corpi; poicche altrimenti si farebbero dispersi sù la superficie del Mare.

A V V E R T I M E N T I

SU LE OSSERVAZIONI DELLE
REFRAZIONI RITRATTE

DAL LIBRO INTITOLATO

*Refractio Solis Inocidui in Septentrionalibus oris
Jussu Caroli XI. Regis Suevorum &c. a Johanne
Bilberg, Holmia 1695.*

DEL SIG. DE LA HIRE.

IL Re di Svezia fè un viaggio sin a Torneo, Città posta nella parte Settentrionale della Svezia, verso il Solitizio Estivo dell' Anno 1694.; ma poiche egli giunsevi alcuni giorni dopo detto Solitizio, ordinò all'Autore di detto libro, che l'avea tenuto compagnia, di ritornarvi nell' Anno appresso col *Signor Andrea Spole* Professor di Matematica in *Upsal*, e di lui Collega.

A 7.

* 1700. 13. Febrajo.

A 7 Giugno 1695. s. v. osservaron in Torneo l'altezza meridiana del Sole con istrumenti divili per minuti, essere di $47^{\circ} 48'$. All' 8 la ritrovaron di $47^{\circ} 49'$. A 10, di $47^{\circ} 50'$. Conchiuse l'Autore da tali osservazioni, che l'altezza del Polo di detta Città fusse di $65^{\circ} 43'$, impiegandovi la paralasse, e nulla curando la refrazione, come quella, che s' credeva insensibile in tale altezza del Sole. Aggiunge egli, che avrebbe desiderato determinar l'altezza del Polo di detta Città per mezzo delle stelle, che a questo son intorno; ma che in tale stagione era impossibile, stando il Sole di continuo sù l'orizzonte.

Ma perche il principal loro disegno si era di osservare il Sole a mezza notte, quando appariva egli sù l'orizzonte dalla parte del Settentrione, tra li 10, e 11 di Giugno s. v., presero l'occasione dal sereno, in cui era quella parte dell'orizzonte. Allora però l'altezza meridiana del Sole essendo in Torneo di $47^{\circ} 50'$, se si tolga un minuto di refrazione, come quì stimati, e si scemino ancora $23^{\circ} 29'$ per la declinazione del Sole, rimarranno $24^{\circ} 20'$ per l'altezza dell'equatore, il di cui complemento $65^{\circ} 40'$, sarà l'altezza del Polo di detto luogo; & in conseguenza nel Solstizio eittivo il centro del Sole deve essere sù l'orizzonte $51'$, e l'orlo superiore $35'$, il quale intanto è apparso elevato più di $23'$. Dunque la refrazione era di $58'$. Locche è quasi il doppio di quel che quì appariva. Quando si supponesse la refrazione dell'altezza meridiana doppia di quella, che noi abbiam posta, si ritroverebbe un minuto meno la refrazione orizzontale; locche non è affatto considerabile, riguardo a quella, che si è determinata.

Detti Osservatori passarono più oltre verso il
Sec.

Settentrione; & a 14 dell' istesso mese, essendo a *Kangis*, ove sono le Fucine di ferro, e di rame, videro il Sole dalla Riviera elevato sù l'orizzonte, per l'altezza di 3 suoi diametri; ma secondo i loro itinerarj conchiuderebbersi dalla distanza de' luoghi, che le refrazioni orizzontali sarebbero tre volte più grandi di quì.

Le refrazioni in fine de' Paesi Settentrionali, se addivengano dalla natura dell' aria, che l'accresce di molto, rispetto a quelle de' nostri Paesi, e che i crepuscoli ancora quindi si facciano; non v'è alcun dubbio, che sotto al Polo il crepuscolo saravvi così grande verso 'l Solstizio d'Inverno, che molto chiaramente vi si potrà vedere, senza che nè pure la Luna vi sia: Locche riesce utilissimo a detti Popoli, che fanno il loro gran commercio in detta stagione, per la comodità de' viaggi sù 'l ghiaccio. Vi rimane però altra considerazione a fare di molto peso, e si è, che quella parte dell'aere, che cagiona le refrazioni, non abbia ragione alcuna con quella, che fa il suo peso; poicche tanto in *Stokolm*, che in *Parigi*, le mutazioni del Mercurio nel doccio del Barometro sono l'istesse, e le altezze ancora pochissimo an di divario.



R I F L E S S I O N I

SU LE OSSERVAZIONI FATTE NELLA
BOTNIA.

DEL SIGNOR CASSINI.

* **I** L Signor Residente di *Svezia*, avendomi fatto vedere il libro delle osservazioni fatte in *Botnia* vicino al circolo Polare Artico dal Re di *Svezia*, e suoi Matematici, vi feci alcune riflessioni, che li comunicai, perche egli le inviasse a coloro, che avean travagliato, ovvero assistito a tali osservazioni; Perciocche vi eran cose, che richiedevano miglior lume per poterne fare buon uso.

Io da tali osservazioni calcolai le refrazioni del Sole a modo mio, e le ritrovai un pò maggiori delle calcolate dagli Osservatori: Le posi in agguaglio con quelle, che avea ricavate dalle osservazioni fatte per ordine del Re nella *Cayenne* vicino all' Equinozziale, ove ritrovai le orizzontali minori di quelle; quantunque nelle altezze Meridiane del Sole, che in detto luogo sempre oltrepassano i 60 gradi, le refrazioni, che per una parte, e per l'altra non eccedono un mezzo minuto, differiscano tra di loro in pochi secondi, delle quali non saprei accertarmi nelle osservazioni. Onde è, che non vi fu differenza sensibile nell' uso, che io feci delle mie Tavole di refrazioni, quali impiegai nella riduzione.

Memor. 1700.

D

du.

* 1700. 17. Febrajo.

duzione delle osservazioni di *Cayenne*.

Sotto il circolo Polare Artico, quelle, che si ricavano dalle Osservazioni di *Svezia*, sono poco minori del doppio di quelle, che noi osservammo ivi più regolarmente: Ve ne sono altre, che le finno maggiori del doppio, benché queste non siano delle più sicure; avanzando sempre più delli due tanti, e mezzo quelle, che noi ritraffimo dalle osservazioni di *Cayenne*.

Non ho voluto crivellare il Metodo, di cui si servirono i *Svedesi* per dedurre le refrazioni dalle loro osservazioni; avendo creduto migliore, col solo dettar quello, di cui ho fatto io uso, di ritrovarle un poço differenti: ho notati solamente i luoghi, dove incontrava alcuna difficoltà, per attenderne qualche dilucidazione, prima di farne il rapporto all'Accademia, alla quale m'era io obbligato su di sì fatti studj impiegare le fatiche, e l'inchieste.

Non avendo sinora ricevuta risposta alcuna, io presento un' estratto della scrittura, che loro inviavi in Latino, nel quale non lascio di fare alcuni usi delle osservazioni con maggiore applicazione, & esattezza fatte.

Le osservazioni del Sole, che 'l Re di Svezia, e suoi Matematici an fatte molto da vicino al circolo Polare, possono recare un sommo utile a l' Astronomia, alla Geografia, & alla Nautica, potendosi da quelle didurre le refrazioni del Sole ne' confini della Zona temperata, e della fredda. L'ho io disaminate con diligenza, nè mi rimarrà di riportare ciò che ne ho ricavato fin' oggi, e sotmetterlo all' esame di persone savie, che an fatte tali osservazioni.

Benché sianfi sperimentate alcune difficoltà nell' uso, che ne abbiám fatto, non per questo ci
fiam

siam rimasti di sceglierne quelle, che ci son sembrate le più certe; & abbiám ritrovato, che la refrazione orizzontale in detto luogo nel Solstizio estivo montava a quasi un grado; donde si potrebbero formar le Tavole delle refrazioni per le differenti altezze dell' aere in questo clima, le quali poste in agguaglio con quelle, che son proprie in questo Paese, potrebbero dare le refrazioni, che convengono a' Climi, che sono tra que' Paesi, e 'l nostro; donde un grande ajuto riceverebbe l'inchiesta delle vere altezze del Sole, e delle Stelle, qualor si fussero osservate le altezze apparenti.

Abbiám noi esatte osservazioni del Sole, e delle Stelle fisse per ordine del Re: fatte vicino all' equinozziale, donde ne abbiám tirate le refrazioni in diversi gradi di altezza. Ce ne siam noi serviti per ritrovar l'altezza dell' aria, che rifragne in detto Clima, e la proporzione della sua densità con la rarezza dell' etere contiguo; donde abbiám indi calcolata la refrazione orizzontale, e quella, che si convenga in tutti i gradi dell'altezza.

Abbiám ritrovato, che la refrazione orizzontale vicino all' equinozziale era due terzi, e poco più di quella del nostro Clima, e che la differenza, qual' era tra le refrazioni delle altezze più grandi, scemava con maggior proporzione; sicchè erano esse pressò che simili nell' altezza di 60 gradi. Farò qui rapporto di qualche ho potuto ricavar dalle osservazioni fatte nel Settentrione da' Matematici del Re di *Svezia*: forse che ho io calcolato con maggior sottigliezza di quel che bisognava; ma ho stimato di non dovermi trasandar cosa alcuna.

Io mi servo della obliquità della Eclittica, quale appunto ho ritrovata su le prime con le mie osservazioni, confermata da quelle, che i Matema-

tici del Re an fatte nella *Cayenne*. Mi servo ancora della regola delle refrazioni celesti, con la quale essendo date due refrazioni, osservate in diverse altezze, prese in un istesso luogo, ritrovo con la Trigonometria le refrazioni, che convengono a tutti gradi di altezze per detto luogo; donde ho conosciuto di esser elle sensibili oltre a' termini, che se li eran dati, e che finissero solamente nel Zenit. (Da detta regola osservo, per quanto si può ella avverare, che la refrazione, qual conviene a 48 gr. ne' Paesi Settentrionali, monti ad un minuto, e mezzo). Mi servo in fine del diametro del Sole, qual appunto dalle mie osservazioni risulta nel solstizio estivo.

Io suppongo, che questo Solstizio nell' Anno 1695. sia avvenuto in *Bologna* a 20 Giugno, ad ore 21, e 42' dopo mezzo giorno, quale appunto il Signor Mezza Vacca l' ha computato nelle sue Efe-meridi ricavate dalle mie Tavole. Il globo di *Blacus* mette Torneo piu Orientale di *Bologna* 11. gr., cioè 44' di ora. Dunque il Solstizio in Torneo è avvenuto a 20 Giugno, 22 or., 26' dopo mezzo giorno,

I N T O R N E O 1695.

A 7. Giugno s.v. la maggiore altezza del

Sole	478 48"
------	---------

A 8. Giugno	478 49'
-------------	---------

A 10. Giugno	47 50
--------------	-------

Avendo riguardo alla declinazione, le differenze di queste altezze accordano nel minuto.

Se si serva dell' ultima osservazione 22 or. 26' fatta prima del Solstizio, bisogna considerare la variazione della declinazione, che a tal tempo conviene, qual' è di 12", che bisognerà sottrarre dall' obli-

bliquità dell' Eclittica di 23 gr. 29', 0", e si avrà la declinazione del Sole per lo mezzo giorno de' 10 Giugno s.v. di 23 gr. , 28', 48".

A 10. Giugno.

Altezza Meridiana apparente del Sole	47° 50' 0"
Parallasse del Sole, che conviene in tale altezza	7
Altezza corretta per la Parallasse	47 50 7
Refrazione	1 25
Altezza variabile del Sole	47 48 42
Declinazione del Sole	23 28 48
Altezza dell' equinozziale	24 19 54
Altezza del Polo in Torino	65 40 6
Nella pag. 42 vien posta	65 43 0

Dopo i 10 di Giugno a mezza notte osservarono, che quasi i tre quarti dell' orbita del Sole erano sù l'orizzonte, & un quarto sotto, di maniera che il centro del Sole innalzavasi sù l'orizzonte un quarto della sua orbita, cioè 7' 55", supponendo il diametro di esso di 31' e 40", come appunto è nel solstizio estivo.

La bassezza dell' equinozziale sotto all' orizzonte verso il Settentrione, qual' è uguale all' altezza dell' equinozziale sù l'orizzonte verso mezzo giorno, è di

24 19 54

Se si tolga la declinazione, qual era allora di

23 28 58

Si ha la bassezza del centro sotto l' orizzonte vero di

0 50 56

Parallasse orizzontale del Sole

10

Dunque la bassezza del centro del Sole sotto l'orizzonte artificiale

di

0 51 6

D 3

Ma

Ma il centro del Sole appariva alzata sù l'orizzonte di

o 7 55

Dunque all' altezza apparente del Sole di

os 7 55

La refrazione era di

o 59 11

Supponendo, che l'orizzonte sensibile fusse l'istesso, che l'artificiale, come si dice nella pag. 12, 44. Oltrecchè, avendo il Re (v. p. 12.) e suoi Matematici (v. p. 44) osservato il Sole da una Torre alta quasi 100 piedi, l'orizzonte fisico avrebbe dovuto apparire 10', o 11' sotto all'orizzonte artificiale.

Desiderarebbesi dunque, che si fusse osservata con istrumenti l'altezza, o la bassezza dell'orizzonte sensibile, o per lo meno l'altezza dell'orlo superiore del Sole sopra dell'orizzonte artificiale. Forse, che l'avran fatto, e non avendo incontrata differenza sensibile tra l'orizzonte apparente, e l'artificiale, non ne an tenuto conto, di maniera che noi possiamo avere per niente tal differenza.

IN PELLO.

In una Capanna di *Pello*, qual dicono esser distante 10 miglia antiche da *Torneo*, osservarono dopo le 11 a mezza notte, che l'orbita del Sole non solamente era intiera sopra l'orizzonte, ma che appariva ancora rilevata sù per due diametri di esso, cioè, come credon essi 60'; & aggiungono, che l'altezza del centro del Sole era di 45', donde sembra, che l'altezza di 60' fusse quella dell'orlo superiore del Sole.

Sottraendo da detta altezza di os 45' la refraction di *Ticone*, qual'è di 20', si terrebbe la vera altezza del centro del Sole di o 15'. Frattanto conchiu,

chiudono essi, che l'orlo inferiore del Sole, tolta la refrazione, era sopra l'orizzonte 15'.

Consumaron un giorno, e mezzo a ritornare da *Kengis* in *Torneo*, qual'è distante 16 miglia.

La latitudine di *Torneo*, secondo il loro calcolo è di

65 43'

La latitudine di *Kengis*

66 45'

La differenza è di

1 2

Di maniera che, supponendo, che il loro cammino fusse sotto la Meridiana, per ciascun miglio danno circa quattro minuti.

Se suppongansi le miglia antiche da *Torneo* a *Pello* essere dell'istessa grandezza di queste, e che la distanza sia proporzionale alla differenza della latitudine, si avrà la differenza della latitudine da *Torneo* a *Pello* di

03 39'

Ma l'altezza del Polo in *Torneo*, secondo essi, è di

65 43'

Dunque l'altezza del Polo di *Pello* sarà di

66 12

E l'altezza dell'equatore di

23 38

Ma a mezza notte dopo le 11 la declinazione del Sole fù di

23 29

Dunque la bassezza vera del centro del Sole sotto dell'orizzonte è di

0 9

Ma l'altezza apparente del centro del Sole era di

0 45

Dunque nell'altezza apparente di 03 45 la Refrazione era di

0 54

IN KENGIS.

Giunsero a 14 Giugno con molta pena alle miniere del ferro, e del rame di *Kengis*, e videro da Battelli, ove erano, il Sole alzato su l'oriz-

zonte per tre diametri della sua orbita.

A 15. 10 ore 15' avendo presa l'altezza del Sole col loro Astrolabio, computaron l'altezza del Polo di detto luogo un pò maggiore di 66^s 45'. Non ispiegano la maniera, che tennero per determinarla; ma perche avevano stabilita la latitudine di Torneo maggiore di 3 minuti, o intorno a questi, che non abbiám noi ritrovata nelle loro osservazioni, possiamo togliere tre minuti da detta latitudine stimata di 66^s 45', e determinare la latitudine di Kengis di

66^s 42'

La mezza notte appresso dopo li 14, la declinazione del Sole era di

22 25'

Ma la bassetta dell' equatore emendata è di

23 18

Dunque l'altezza vera del centro del Sole sù l'orizzonte è di

0 7

Ma l'altezza apparente del centro del Sole era di

1 15

Dunque nell'altezza apparente di 1^s 15', la refrazione era a Kengis di

1 8

In queste due osservazioni, essendosi veduto il Sole tutto intiero, e l'altezza di esso valutata per suoi diametri, è verisimile, ch'eglino abbian comparate queste due altezze col diametro verticale, qual'è nel circolo dell'altura, il quale per la refrazione si restringa, & allora questa ultima osservazione si accorderebbe meglio con le precedenti.

Rapportano essi, che in Kengis, ove il Sole vedevasi per tre diametri della sua orbita alzato sù l'orizzonte, si fosse intieramente veduto senza refrazione; ma non ben si comprende, come abbian potuto ciò conchiudere, poicche dal calcolo

pur

pur ora riferito, si vede, che la refrazione sia maggiormente in *Kengis*, che negli altri due luoghi precedenti, quantunque l'altezza sia maggiore.

Si bramerebbe ancor sapere, come intender si debba qualche dicono (v. p. 70.) che nella capanna di *Pello* si era veduto l'orlo inferiore del Sole prima della refrazione elevato 15 minuti sù l'orizzonte; poicche avevano essi osservato il centro del Sole innalzato 45 minuti sù l'orizzonte, donde sottraendone la refrazione, che e' suppongono di 30 minuti, si avrebbe l'altezza del centro del Sole corretta, per la refrazione di 15 minuti, e non già l'altezza dell'orlo inferiore di esso, quale per questo calcolo dovrebbe toccare l'orizzonte.

Si ha parimente qualche difficoltà sù di qualche (p. 44.) è notato, che l'orbita del Sole non solamente appariva giugnere sù l'orizzonte, ma che era alta da questo per due diametri di detta orbita; perciocche siam menati a concepire, che tra l'orlo inferiore del Sole, e l'orizzonte, vi era la distanza di due diametri; se non fossimo avvisati diversamente da qualche si dice (nella pag. 70.) dell'altezza del centro di 45 minuti.

Qualche noi osserviamo quì, merita di esser posto in chiaro, se detti Signori, quali an faticato per dette osservazioni, o che vi anno assistito, lo voglian fare.

Per disaminare la refrazione di un minuto 25", che noi abbiamo dati all'altezza apparente di 47° 50', ci servirem noi della proporzione dell'altezza dell'aere rifragnente al semidiametro della Terra, quale supponiam essere come 6095. a 10,000,000, la quale all'altezza di 7° 55", ov-

vero dalla distanza del Zenit di $89^{\circ} 52' 5''$, dà l'inclinazione del raggio visivo alla superficie dell'aere di $87^{\circ} 59' 44''$; avendovi aggiunta la refrazione osservata in Torneo di $59' 0''$, si ha l'inclinazione del raggio esteriore all' istessa superficie di $88^{\circ} 58' 44''$; e come il seno di $89^{\circ} 52' 5''$ è, al seno di $87^{\circ} 59' 44''$, così il seno di $428 10'$ complemento dell' altezza di $473 50'$ al seno di $428 8' e 7''$.

E come il seno di $87^{\circ} 59' 44''$ è al seno di $88^{\circ} 58' 44''$; così il seno di $428 8' 7''$ è al seno di $428 9 32'$, la differenza, che è $1' 25''$, è la refrazione nell'altezza data.

Nell' istessa maniera si ritrova la refrazione orizzontale in Torneo di $59^{\circ} 18'$.

Confidiam noi più alle osservazioni di Torneo, che alle altre, perciocche l'altezza del Polo si è presa con maggiore esattezza, che negli altri luoghi, e perciò ne abbiain noi tirata la refrazione orizzontale.

Importerebbe molto l'osservare in Torneo, nel luogo, dove si è veduto il Sole a mezza notte, se siavi alcuna differenza tra l'orizzonte sensibile, e l'artificiale.

E per non essere obbligati impiegare l'altezza dell'aere rifragnente, dedotta dalle osservazioni fatte altrove, bisognerebbe prendere in Torneo le altezze meridiane del Sole, qualora egli è verso il mezzo di Scorpione, e di Aquario, quando è in Torneo alzato 7 ovvero 8 gradi, per poterle comparare con le orizzontali, e dedurne l'altezza dell'aria, che rifragne, e la proporzione della densità di essa con quella dell'etere, che sono i due elementi necessarij per diffinire le refrazioni in tutte le altezze.

S U 'L

*Perpendicolare adattamento osservabile in tutti i
Tronchi, in molte radici, e, per quanto può farsi,
in tutti i rami delle Piante.*

DEL SIGNOR DODART.

* **M**olto ben si vede, quanto bisogni, che le Piante sian dritte, e poste a piombo, per sostenerli più facilmente, e per reggere al peso de' loro frutti: Qui però si cerca sapere non già 'l fine, perche ciò facciasi, ma il come, e per qual cagione.

† Il fatto assoluto ne fornisce di circostanze molto particolari, degne di essere osservate, tutto che fossero inesplicabili; perciocche la sola istoria della natura forma la maggiore, e più considerabil parte della Fisica.

I Quasi che tutti i Tronchi, e le radici nascono piegati sotto Terra; frattanto i Tronchi n'escono dritti, & un grandissimo numero di radici si profondano a piombo fuggendo l'aere, e tendono sempre al basso.

2 * Le Piante, che escono per traverso da un suolo a pendio, li drizzano, tolto che vengono all'aere, e si adornano contro a detto terreno declive, donde sorgono fibre molto ferme.

3 * In

* 1700. 20. febbrajo.

† 1. Esposizione generale del fatto.

* 11. Circostanze del fatto, che lo rendono più considerabile v. la 1. fig. della 2. Tav.

3 * In contrario se il proprio lor peso le faccia piegar giù , poco indi si raddrizzano , in facendo una seconda curvatura senza rettificar la prima.

4 Se un Tronco d' alberò giovane sia, dalla natural perpendicolare uscito per alcuna violenta cagione , egli nella punta si drizza , e ripiglia la sua perpendicolare . Ho io sù la discesa di *Mendon* a *Chaville* nel Parco veduti molti esempj † di raddrizzamenti molto più violenti : Perciocche affai giovani Pini essendo stati abbattuti da tempesta sù di un pendio più , o meno inchinato , tutte le sommità di detti Alberi si son rilevate a piombo, facendo per conseguenza tutte con la linea de' Tronchi ciascuna un angolo acuto più , o meno grande , secondo che 'l pendio, sù di cui il Tronco fu abbattuto , era più , o meno inchinato . Io ne recai buon tempò è molte mostre all' Assemblea, che ragunavasi allora nella Biblioteca Reale , come può ricordarsene la Compagnia .

Ma senza ricorrere a questi casi straordinarij , che sì fortemente provano l'inchinazione , di cui si parla , qualche avviene in quasiche tutti i rami, n'è egli una bastante pruova ; perlocche nascono tutti dal Tronco per traverso , e si raddrizzano , la maggior parte almeno, verso l'estremità : Ravvisasi pur l'istesso negli altri rami , che da fianchi delle branche sorgono in molti alberi , come nel Frassino .

Secondo quel che si è detto dunque osservansi due raddrizzamenti nelle Pianta , uno quasi inevitabile , e perpetuo del tronco , e della radice sotto terra , e l'altro dell'istessi tronchi , & in qualche maniera delle branche , e de' rami nell'aere.

Per

* Vedi la 2. fig. della 2. Tav.

† Vedi la 3. fig. della 2. Tav.

* Per quel che s'attiene al primo, ogn'un sì; che la maggior parte delle Piante si seminano di per loro; e che le seminate da Lavorieri, o Giardinieri son fatte in maniera, che il solo caso dà a tutti i granelli in cadendo il loro sito nella Terra, che li cuopre, e soprattutto a' semi di figura accostanteli alla sferica. La positura del germe, cioè della radicetta nel granello, è regolata in maniera, che essa, e la sua piantuccia, cioè il germe della radice, e l'embione di tutto il rimanente della Pianta, son sempre nell'istesso luogo del granello, & in una medesima situazione, così riguardo ad esso granello, come l'uno a rispetto dell'altro; In molti semi, come la civaja, la punta della radicetta è rivolta verso il luogo, donde viene al granello, che l'è Madre, il succo per la Pianta; e la direzione della piantuccia nell'istesso granello è opposta per lo meno nella sua origine a quella della radicetta. Tuttociò è molto regolato; ma la caduta de' granelli nella terra, e la situazione di essi, si deve al caso; E' perciò impossibile, che sia egli uniforme: I granelli cadono differentemente, e le maniere, con le quali vengono essi coperti di Terra, o s'affondano, fan cambiare ancora la loro positura: Frattanto uniformemente tutti pingono i loro tronchi in alto, e le loro radici a basso; & egli è notabile, che dette direzioni opposte del Tronco, e della radice siano perpetue, & uniformi, o che i granelli germogliano nell'acre, o nel Terreno. I Fabricatori di Cervogia fan germogliare nell'acre tutt'il grano, di cui si servono per far la Birra,

* III. *Prova della necessità delle due direzioni differenti da quella, che la situazione del granello dà al Tronco, & alla radice.*

ra, ammonticciandolo spesso ne' luoghi alti, dopo di averlo bagnato, nella qual positura i granelli germogliati an tutto il loro germe con la punta a basso. Ho io veduta l'istessa cosa nelle ghiande delle quercie ammassate in un luogo umido sopra di un terreno calpestato bene, e poco proprio a ricevere i loro germogli.

O che i granelli siano ammonticchiati all'aere, o seminati in terra, egli è raro, e quasi impossibile ritrovare questi allogati in modo, che la loro radicetta sia giù, e la piantuccia sopra; Perciocchè quantunque studiamente si piantassero detti granelli uno per uno; & i Giardinieri instrutti della situazione della radicetta (di che son poco) volessero disporre tutti i semi in maniera, che la punta della radicetta riguardasse giù, e la piantuccia sopra; non ne potrebbero venire a capo nella maggior parte delle piante, e forse in tutte; ma almeno nella cavaia; perciocchè in questa la linea della radicetta fa una piegatura con quella della piantuccia, che stà rincurvata nella nicchia, quale fra i due lobi del granello s'avvisa ugualmente incavata nell'uno, e nell'altro lobo; positura che tien forse ogni piantuccia indentro della maggior parte de' granelli, se non vogliam dirla in tutti. * Inoltre i semi piatti di per se cadono quasi che tutti su 'l lato; & i soli granelli, che an lanugine, o pappe, sembrano fatti per seminarli di per loro a piombo, cioè nel verso naturale; perciocchè tutti detti semi sono attaccati alla Pianta per la lor punta, che è quanto dire per l'estremità opposta a quella, che è lanuginosa; e la punta del germe riguarda (come di molte piante si è detto) il luogo, per dove il granello

* Vedi Tav. I. Fig. A, & Fig. +.

nello ancora attaccato alla pianta riceve il suo nutrimento da essa, donde viene, che la punta della radice rignardi il punto di questo attaccamento. Or questo fa dirimi piantati a verso naturale tutti i semi con pappe, che di per loro si seminano colla radice in giù: Ma ciò non può avvenir delle semenze disseminate dal vento, fuorchè in un sol caso, cioè qualora, essendo trasportate da leggerissimo vento, in istante cadano a piombo nel momento di sua calma; questo caso però è raro, com'egli è raro, che 'l vento seminatore cessi di botto, poco prima appunto, che detti granelli sian prossimi a prender terra. Inoltre quando essi son caduti, ancorche il terreno fusse molto ben disposto, per dar luogo, che la punta di un corpo sì leggero, e che sì lentamente cade, entrasse nel terreno bastantemente per sostenerli un poco su'l suo piombo, fin che il vento ricominci a spazzar la terra, e la polvere lo copra poco appresso, e la pioggia l'affondi nel terreno, e le loro pappe corrompa, e che la propria figura, o conica, o cilindrica, faccia piegarli incontenente su 'l loro lato; pure, malgrado tutte queste differenti situazioni cotanto inevitabili, e sì poco favorevoli alla direzione delle radici, tutte queste prendono la parte di sotto, & i tronchi quella di sopra, senza divariar mai. Bisogna dunque, che i tronchi si raddrizzino sempre, e le radici si affondino, ancorche i granelli non si ritrovino piantati nel verso lor naturale.

* Sembra egli, che la ragion meccanica di questo

* IV. *Congetture sopra le cagioni di questa doppia direzione, e i sopra la cagione della direzione del Tronco in alto, & a piombo.*

sto primo raddrizzamento potrebbe essere, che, ogni accrescimento essendo una spezie di progressione, e questa insensibile, qual si faccia per traverso de' corpi, che circondano il granello; debba detta progressione tendere verso quel luogo, dove il corpo, che cresce, cioè la pianta, incontri minor ostacolo; ond'è, che in un terreno uniforme siavi sempre minore ostacolo per lo Tronco verso la perpendicolare in alto, che in qualunque altra linea, perciochè vi è minor terreno a penetrare.

* Ma non è questa la cagione della direzione del Tronco in alto, poicché sperimentasi l'istessa direzione ne' semi, che germogliano fuor del terreno; nè detta ragione può adattarsi alla progressione de' tronchi, nè delle radici de' granelli ammonticchiati, che germogliano nell'aere; perciocchè donde viene, che in qualunque situazione ogni granello pinga il suo Tronco verso l'alto, giacche nell'aere per qualunque verso non incontra resistenza alcuna? e donde nasce, che niuno germe prenda altra direzione, che quella di sotto, in qualunque situazione, che 'l granello si ritrovi, mal grado gli ostacoli, che si fanno innanzi al germe de' semi piantati? Non è dunque la maggiore, o minore agevolezza del valico da mettersi in conto, per indovinar la cagione di tal direzione. Divien ciò più chiaro ne' granelli, che germogliano nel terreno, e principalmente in que' delle piante, che penetrano diritto al fondo, come l'*Erygium*, la *Bursa Pastoris*, e tante altre: dove che i tronchi, o rivoltati su'l lato orizzontalmente, o abbassati, si raddrizzano all'insù, come per prender aere, essendo loro questo cammino più facile di quel di
forare

* V. Questa congettura non può ammettersi.

forare la profondità della Terra ; la radice per contrario anche de' granelli piantati all'insù , fatta la cruccia , prende la parte bassa , & affonda nel terreno ; locche è incomparabilmente più difficile di quel di penetrare la superficie , in prendendo la perpendicolare in alto.

* Può facilmente osservarsi un'esempio di questo strano rivolgimento ne' legumi grossi, quale è la Fava , guardando la figura della prima Tav. A.B. C. D. Si vede in questo solo esempio quel che in tutti i legumi avvenga , e probabilmente in tutti i semi ancora . A , dimostra la Fava sbucciata posta in situazione , tenendo il germe di sua radice , la punta a basso : B la Fava piantata nell'istessa positura , che mena a basso la sua radice , e 'l gambo in alto : C la fava piantata di piatto , adattando a manubrio la sua radice , per pignerla a basso , e 'l gambo in alto : D la Fava piantata all'insù , formando la doppia cruccia , una per rivolgere il gambo in alto , e l'altra per abbassar sua radice.

Tal rivolgimento apparirà più maraviglioso dalla sperienza , che siegue . Per veder fin dove giugneste l'ingegnoso adattamento delle radici a prender la parte di sotto , scegliei sei ghiande , quali erano state piantate all'insù , cioè col calice di sotto , e la punta di sopra (perchè dalla punta di tal seme esce per ordinario il germe) ; * & in questa positura eran germogliate , e 'l germe allungato divenuto radice , si era ripiegato stretto su 'l corpo della ghianda , quasi per prender terreno : come nella Fig.B. Ripiantai quelle sei ghiande stesse in

Mem. 1700.

E

una

* Vt. esposizione più particolare , & esempi del fatto , di cui si cerca la cagione.

* Vedi Ill. Tav. Fig. A.

una situazione opposta alla prima, cioè con la punta della radice in alto, & a piombo quanto più mi fu possibile, come nella *Fig. C*; e copertala di terra, premuta ancora mediocrementemente, affinché essa da per tutto toccasse detta ghianda, la lasciai in tale stato per due mesi; dopo di che avendola scoperta, ritrovai, che tutte le sue radici, avendo fatta una seconda croccia, come se si fossero avvertite ugualmente di questo contrario traspiantamento, che l'avrebbe fatto uscire all'aere, se avessero esse seguitate a crescere in questa seconda positura.

Naturalmente s'iam menati ad investigar la cagione di un sì strano effetto, così della radice; che della contraria direzione del suo Tronco. L'ho io cercata, ma a buon senno credo di non averla scoperta; perciocchè quantunque fusse vero ciò, che imprendo a dire, e' bisognerebbe per intieramente soddisfare allo spirito di un Fisico, con cui non si ciaccia, che potesse dirseli per minuto la *Mecanica*, in virtù della quale dette cose avvengono. Questo appunto è quel che io conosco superiore sì fattamente alle mie forze, che oso dire, che altri incomparabilmente più abile di me non ne verrebbe a capo: Non lascierò io perciò di non dirne quel che mi è caduto in mente su di tale affare.

Egli è chiaro, che'l raddrizzamento del Tronco sotto terra, non addivenga solamente dalla maggior facilità, che incontra nel bucar la terra da basso in alto, secondo la perpendicolare; poicché questa cagione non tiene per le radici, come quì sopra

* *VII. altra congettura più probabile della cagione delle due direzioni opposte.*

sopra si è detto, e bisogna ricorrere ad altre. Vediamo se la differente sostanza, o struttura delle fibre ne' Tronchi, e nelle radici potrebbe un tal' effetto produrre. Se così fosse, bisognerebbe, che le fibre del Tronco avessero sostanza, o tessitura, propria a raccorciarsi per quella parte, che riguarda il Sole, dove dissipazione del loro succo dal calor di questi più si facesse, e che queste istesse fibre fossero capaci di stendersi per quel verso, che riguarda il profondo della Terra, tanto per l'introduzione del vapore nelle cellette delle fibre disposte secondo la lunghezza di esse, che per l'ammollamento del loro corpo inumidito dal vapore istesso, che lo tocca. Per lo contrario bisognerebbe, che le fibre delle radici fossero di tal sostanza, o struttura, che l'umido sotterraneo solubile di continuo, e soluto in atto, gonfiasse, & in conseguenza accorciasse le fibre della radice, le più esposte all'ascendimento di detti vapori; intendo per le fibre, che si ritrovano situate secondo la linea della loro lunghezza, la più bassa, & in conseguenza la più esposta al salimento de' vapori. Bisognerebbe ancora, che la sostanza, o tessitura delle fibre opposte le rendesse proprie a rallentarsi da quel verso, che riguarda il Sole, o per la rarefazione del succo, e dell' aere, che contengono, o per l'accortamento delle loro fibre da quella parte, che riguarda il profondo della Terra. E pur con tutto ciò bisogna confessare, che dette ragioni non soddisfarebbero alla quistione, come le radici possano penetrare attualmente, & effettivamente a fondo, malgrado la resistenza della Terra secondo tal direzione, se non si considerasse la Terra istessa fino ad un certo punto compressa, che non rimanga di esser porosa, per dar libero il passo a corpi così delicati, come è

E 2

una

una radice nascente; tanto più, che essendo arrendevole, piegasi per tutti versi, e s'infinna ne' pori più vicini alla perpendicolare, ver di cui è costretta a tendere, per le cagioni quì sopra cennate.

Più difficile è l'indovinare, come possa farsi il secondo ripiegamento della radice piantata al roverscio del primo; perciocche s'incontrano due novelle difficoltà opposte all'eventq di tale speranza; una nasce dalla situazione della radice, con la punta in alto, & a piombo; l'altra dalla resistenza della Terra, (quantunque ella sia mediocrementè ricalcata), e dalla sua opposizione al secondo ripiegamento.

Per quel che s'attiene alla positura della radice a piombo con la punta in alto; i vapori della Terra ascendendo perpendicolarmente, e leggierramente sdruciolando uguali per tutte le parti, lungo detti perni rivolti, non possono insinuarsi più per un lato, che per un'altro, per accorciar le fibre più da una parte, che dall'altra, & in questa maniera farli fare a poco a poco la cruccia da quel lato.

Ma poiche egli è difficile di allogar esattamente detta radice a piombo da basso in alto, o di ritrovarla sì diritta, che ella non si discosti dal perpendicolò più da un lato, che da un'altro, o in un luogo più che in ogni altro; non rimane altro, che ad indovinare, come possa farsi, che la radice circondata dal terreno per tutti versi, e tenuta in una situazione roversciata, abbia potuta superare detta resistenza del terreno, per ripigliare il cammino opposto a quella, per cui s'era voluto indrizzare con una situazione opposta alla natural sua direzione.

Egli è molto probabile, che questa seconda
direz.

direzione siasi presa come la prima, per un'insensibil ripiegamento dell'estremità della prima crocia, qual sia stato cagionato dall'accortamento delle fibre più esposte al movimento perpendicolare da giù in sù de' vapori della Terra; e che tal raccorciamento, accrescendosi viappiù, secondo la curvatura, s'avvicina più alla linea orizzontale, & è maggiormente esposta all'ascendimento di detti vapori, le fibre non cessino di raccortarsi, se non se allora, che la punta rivolta al basso, in essa diritto imbocchino l'istessi vapori. Perciocchè egli è chiaro, che i vapori, dopo questo, alzandosi a perpendicolo, s'adattin tutti, non ad altro, che a radriazare detta radice contrò tutti i piccioli ripiegamenti, che l'obliquità de' pori della Terra fa soffrire, per ritrovar la maniera di penetrar nel fondo. Picciola attenzione fa ciò veder meglio, e dimostra più chiaramente, e più speditamente di quel che un lungo discorso non suole.

Del rimanente i germogli, che nell'aere si fanno, e tendono verso la Terra, dimostrano, che la direzion delle radici non addivenga dal contatto della Terra, ma da soli vapori acquidosi elevati dalla Terra, o più tosto dall'acqua in essa contenuta, come si vede da granelli ammonticellati, inumiditi, e nelle fabbriche della Birra germogliati, e ne' granaj ancora molto discostati dalla Terra.

Qual'è frattanto questa sostanza, o struttura, che il Tronco giri in alto, e la radice a basso, & in che consista tal differenza, che dà loro una direzione cotanto opposta, sì costante, & uniforme? E' for-

E ?

VIII. Come questa conghiettura sia desideravami necessari per l'intera soluzione del Problema proposto.

se, perche ciascuna fibra della radice è attortigliata, e quelle del Tronco son diritte? o perche ciascuna fibra dell'uno, e dell'altra essendo contorte, quelle della radice le son molto meno di quelle del Tronco, e per conseguenza dan più agio alle particelle dell'acqua agitate, che compongono i vapori, e maggior luogo all'effetto, cioè al raccorciamento, che devè indi seguire nella superficie inferiore della radice, permogliante orizzontalmente, o diversamente inchinata all'orizzonte! L'aere contenuto ne' succhi differenti del Tronco, e delle radici, ha egli forse qualche parte in un'effetto così maraviglioso? E' egli in maggior quantità nella radice? ha egli in queste maggior molla per concorrere al dilungamento della superficie superiore con i vapori, che raccorciano la superficie inferiore, e per tal concorso s'inchini la radice a basso, quando lo richiede la di lei situazione per prender terreno? Opure fassi dalla sostanza delle particelle elementari, di cui le fibre di dette due parti son composte, o dalla differente struttura assoluta, o rispettiva di dette particelle, o de' loro intervalli, che tal'effetto si produca? A me tutto ciò è oscuro, & amo molto meglio attenermi al piacere di ammirare questo certo effetto, perpetuo, e maraviglioso, di cui non ne so la cagione, che lusingarmi di sapere quel che affatto non so. Confesso, che bramerei conoscer detta cagione; ma la mia ignoranza non lascia di recarmi un'altro piacere, che mi rifà con usura di quello, che ignorando la cagion naturale d'un'effetto, che sorprende, potrei sentire; perciocchè questa oscurità, & ignoranza, in cui sono, fa tralucere, e rende ancora quasi sensibile, e palpabile una cagion suprema, la di cui arte, e potere vince infinitamente tutti i miei pensieri, e tutte le
mie

mie conghietture , come quelle de' più addestrati , e più ingegnosi fra tutti gli Uomini , che sono stati , o che mai saranno.

E' questo per lo primo raddrizzamento de' tronchi sotto terra ; per quello , che faffi nella parte la più flessibile de' tronchi in fallo , esposti all'aere , è molto probabile , che nascano dall'imprefione delle cause esterne , come dal Sole , e dalle pioggie ; perciocche la linea superiore del tronco piegato è più esposto alla pioggia , & alla rugiada , & al lume del Sole ancora , e delle altre Stelle , di quel che non è l'inferiore. Or l'una , e l'altra di queste due cagioni in una certa struttura di fibre mena ugualmente a raddrizzare detta parte più esposta per l'accortamento , che elle aspettano successivamente in detta parte , ciascuna a suo modo , qualor ciascuna vicendevolmente predomina : Poicche l'umidità gonfia , e raccorcia col gonfiare , & il calore dissipa , & accorta con la dissipazione. Non si cerca quì intanto , come ho detto , a dterminare qual possa essere questa struttura , per rendere le fibre capaci di tal'effetto . A me basta di vederne un' esempio volgare nelle minùge de' strumenti di Musica , nelle quali si avvisa , che due cagioni così opposte , quanto e' secco , e l'umido , possano produrre l'istesso effetto , raccorciando dette corde quasi ugualmente l'uno , e l'altro eccesso , quantunque esse fossero distese per le due estremità . Quelle del legno son solamente attaccate per una parte alla Terra , & an libera quella estremità , che sporge all'aere , e se lo scambievole contatto , secondo la loro lunghezza , tiene in esse luogo di attaccamento ,

E 4

tut-

* IX. Conghietture su'l raddrizzamento de' Tronchi delle branche , e de' rami.

tutte quelle, che sono esposte alle cause esterne, capaci di accortarle, posson produrre tutte insieme l'istesso effetto, non essendo valevole il loro contatto ad impedire di essere raccorciate tutte insieme, e costringere le altre fibre, che non sono alterate dall'istesse cagioni, a seguitare il moto, che mena a raddrizzare la parte flessibile dell'Albero; & essendo così, li due eccessi di secchezza, e di umidità, scambievolmente succedendosi, ciascun deve produrre un durevole raccorciamento, che v'è accrescendosi successivamente da cagioni quantunque opposte, senzache per tal verso, una distrugga l'effetto dell'altra.

Non occorre altro, che adattare l'istesse cagioni alle piante, che nascono trasversalmente in un terreno a pendio; poicche se dette piante anno le fibre del tronco molto sode nell'uscir dalla terra, per sostenere, e (per così dire) per sentir l'effetto di queste due cagioni, tosto che avranno bastante lunghezza, per fare una piegatura, si raddrizzeranno, e disporranno contro il suolo declive in una positura favorevole a detto effetto, come vediamo farli dalla Parietaria, dalla Matricaria, dall'Antirrhinum, e d'alcune altre piante, quando in simigliante maniera nascono.

Che se per lo contrario il Tronco è molto tenero, troppo acquoso, e greve, sì che non possa secondare a dette cagioni, e sopra tutto al calor del Sole; il suo proprio peso farà farli una piegatura in giù, sino a tanto che essendo il tronco dilungato, e per l'età rassodato, sia reso dall'azion del Sole capace di sufficiente contrazione, per fare una seconda piegatura, che a un dappresso l'adatta al natural perpendicolo, e rende proprio in tal positura a produrre sino i cesti, i fiori, e le spighe de' granelli;
come

come io l'ho osservati qualche volta nel *Sedum*
Vermiculatum, e nel *Telephium*.

Da tutto ciò si divisa la cagione della piegatura aguta dell'estremità de' Tronchi de' giovani Pini abbattuti su 'l pendio di una costa, e della giusta proporzione, che s'incontra tra l'apertura degli angoli aguti, formati per detto raddrizzamento della sommità con l'inclinazione de' Tronchi all'orizzonte; e perche il raddrizzamento cagionato dall'accortamento delle fibre finisca, quando son adattate al perpendicolo: Poiche essendo allora tutte quasi che ugualmente al calore, & al lume esposte, e la pioggia cadendo a piombo da per tutto, o indifferentemente da tutte parti, e l'ascendimento del succo in dirizzandosi per la perpendicolare, suppliscono all'ineguaglianza, che s'incontra nella linea del tronco, che riguarda il Settentrione, quale giammai il Sole direttamente ferisce, come quella, che riguarda Mezzo giorno, che sempre direttamente illumina.

Vedesi in fine, perche i rami, quantunque sporgano trasversali dal tronco, si dirizzino verso l'estremità nelle piante, le di cui fibre siano flessibili; e come i loro germogli laterali prendano l'istessa disposizione, quali presentandosi spiegati; & indi i loro fiori, e le frutta ricevan succo dell'aere, che devono filtrare, e trasmettere, o per loro proprio nutrimento, o forse per quello della radice; come io ho tentato di provare nella Memoria sopra la nutrizione, & accrescimento delle piante, letta nell'Assemblea a 9. Dicembre 1699.

SPIEGAMENTO
DELLE FIGURE
INTORNO ALLE PIANTE CENNATE,
E' l loro perpendicolo.

TAVOLA PRIMA.

- A. Fava posta nel verso naturale con la radicetta.
 2. in giù. La piantuccia 1 nascosta tra i due lobi.
 3. Un fagotto, che tien luogo di secondina nella Fava, per preparare il nutrimento, che lui viene dal guscio, per lo gambo, o cordone 4.
- † La Fava aperta per mezzo. 1 Piantuccia in nicchia: 2 Radicetta posta all'insù. 3 Nicchia, che contiene l'altra metà della piantuccia.
- B. L'istessa piantata a natural verso. 1 Piantuccia, in cui la piegatura non sia ancor raddrizzata. 2 Radice.
- C. Fava piantata di piatto. 1 Piantuccia, che ha fatta la sua seconda piegatura, come per levarli in alto, e che non è stata lungo tempo nell'aere, per lasciar la prima.
- D. Fava piantata all'insù. 1 Piantuccia, che si raddrizza, e fa la sua cruccia, come per salire in alto, non essendo molto stata nell'aere, per lasciare la sua prima piegatura. 2 Radicetta, che si abbassa, con far pagimente la cruccia per l'ingiu.

SECONDA TAVOLA.

I. FIGURA.

A Parietaria, &c. che si raddrizza in un Muro, o in altro piano verticale.

II. FIGURA.

B Gambo del *Sedum minus teretifolium*, &c. che si abbassa, e di poi si raddrizza in un Muro, • in altro primo verticale.

III. FIGURA.

CaDb. Ec 3 Giovani piante abbassate su di tre piani diversamente inchinati all'orizzonte.
 ad. bfcg L'estremità tenere, e pieghevoli di detti giovani Pini perpendicolari all'orizzonte, che formano 3 angoli aguti di svariata ampiezza.

TERZA TAVOLA.

- A. Ghianda piantata all'insù. La punta A è la parte, donde esce il germoglio.
 B L'istessa ghianda, che butta le radici in giù.
 C L'istessa trapiantata, che rivolta la punta della radice dirizzata a perpendicolo in alto.
 D L'istessa con la radice ripiegata la seconda volta in giù, dopo trapiantata.

OS.

O S S E R V A Z I O N I
SU LA QUANTITA' DEGLI ACIDI
ASSORBITI DAGLI ALCALI TERREI.
DEL SIG. HOMBERG.

• **E**GLI ha qualche tempo, che riferj un modo da esattamente misurare i gradi delle forze de' spiriti acidi, per mezzo di un nuovo Areometro; locche ha fatto desiderare parimente una misura delle forze degli alcali, cioè quanto acido possa essere assorbito da tal'alcali conosciuto, & adoperato ne' remedj. Cosa, che potrebbe essere di alcun utile a Medici, quali secondo le malattie, devono ricettarlo a loro Infermi: E poiche la maggior parte di questi, che nella Medicina impieganti, son di que*, che diconsi alcali terrej; & allo 'ncontro avendo io riferite le mie osservazioni su de' sali alcali sì fissi, che volatili; quì non farò parola di altri, che solamente di detti alcali terrej, in disaminandoli.

Per giugnervi, io ho imbevuto i principali di questi alcali di spiriti acidi, le di cui forze aveva prima misurate con l'Areometro, mettendo in agguaglio il peso di essi con quello dell'acqua di Fiume.

Gli Acidi tutti non sono di una istessa natura, disciogliendo alcuni certi corpi, che gli altri non toccan punto; perlocche ordinariamente se ne fan due

• 1700. 20 Febrajo.

due spezie, una delle quali comprende l'acque regie, l'altra le acque forti.

Fuò egli avvenire molto bene, che gli acidi, quali mettono in disordinanza la nostra Machina, simiglino talvolta alcuni alle acque regie, & altri alle acque forti; locche sembra accordarsi con le osservazioni fatte in alcune malattie, di cui guariscasi sicuramente con l'applicazione di alcuni alcali, che non cedono affatto, o con infinita difficoltà ad a tri rimedj, come avviene del mal Venereo, che col Mercurio si cura, e del venen delle Vipere, cui si dà con gli alcali urinosi un pronto compenso.

Essendo perciò gli acidi di natura differente, ho creduto, che stia bene a disaminare i nostri alcali terrei, non già con una sola spezie di acidi; perlocche di cialcuna di dette spezie n'ho scelto uno, cioè lo spirito di nitro, per le acque forti, e lo spirito di sale, per le regie.

Ho tolta la flemma a detti due spiriti, sicché uno scioglieva assai bene l'oro, l'altro l'argento, e disaminatili in questo stato con l'Areometro, & agguagliatili con l'acqua di Fiume, era il di loro peso in uguale ampiezza, come diciannove per lo spirito di nitro, e diciassette per lo spirito di sale, a sedeci per l'acqua di Fiume; cioè, che in una istessa ampiezza l'acqua giugneva al peso di un'oncia, lo spirito di nitro a quello d'un'oncia, & un grosso, e mezzo; e quel di sale ad un'oncia, e mezzo grosso.

Ridussi in polvere l'alcali terrei sequenti, cioè occhi di Gambari, Corallo, Perle, Madreperle, Belzuar Orientale, Occidentale, il Calculo Umano, i gusci d'Ostiche, & il Corno di Cervo calcinato, la Calcina viva, e la spenta, il Bolo, il Tripoli, e Terra siggillata.

Un'

98 *Memorie dell'Accademia Reale*

- Un'oncia del cennato spirito di nitro sciolse.
 4 grossi, 9. granella d'occhi di Gambari all'istante.
 3 grossi, 7. granella di Corallo prontamente.
 2 grossi, 63. granella di perle con prontezza.
 2 grossi, 58. granella di Madreperle ancora così.
 1 grosso, 36. granella di Belzuar Orientale lentissimamente.
 1 grosso, 60. granella dell'Occidentale con minor lentezza.
 2 grossi, 28. granella di calcolo umano lentamente.
 3 grossi, 20. granella del guscio d'Ostriche all'istante.
 3 grossi, 28. granella di Corno di Cervo calcinato senza sboglimento sensibile.
 2 grossi, 36 granella di calcina viva prontissimamente.
 2 grossi di calcina spenta molto prontamente.
 1 oncia del detto Spirito di Sale ha sciolto.
 3 grossi d'occhi di Gambari prontamente.
 2 grossi 26 granella di corallo prontamente.
 1 grosso 56 granella di perle così ancora.
 1 grosso 60 granella di madreperla con prontezza.
 46 granella di Belzuar orientale lentissimamente.
 51 granella di Belzuar occidentale molto lentamente.
 1 grosso, 24 granella di calcolo umano lentamente,
 2 grossi, 12 granella di gusci d'ostriche con prontezza.
 2 grossi, 21 granella di corno di Cervo calcinato, senza sbagliamento sensibile.
 2 grossi, 55 granella di calcina viva prontissimamente. 2 grossi

2 grossi, 49 granella di calcina spenta molto speditamente.

Il Bolo, la Terra sigillata, e quella di Tripoli non sono stati nè dallo spirito di sale, nè da quel del nitro sciolti.

Molta considerabil differenza quì si avvisa tra le forze scioglienti dello spirito di sale, e quella del nitro, essendovi tra' corpi sopradetti alcuni, che lo spirito di nitro ha sciolti per doppio di quel che non ha fatto lo spirito di sale; e generalmente di tutti essi, lo spirito di nitro ne ha la più considerabil parte disciolti dello spirito di sale.

La cagione di tal differenza dee rifondersi in parte alla svariata quantità de' sali volatili acidi, che formano detti spiriti, quali si osservano doppij a un dappresso nello spirito di sale, come può vedersi nella disamina da me fatta di essi, inserita nelle nostre Memorie dell'anno passato: E poichè ciascuna punta di detti sali acidi, è un vero coltello, dal maggior numero di questi deve attendere un vie più maggiore effetto.

Devesi ancora rifondere la differenza di tal soluzione in qualche parte alla svariata figura delle punte di detti acidi; perciocchè incontransi corpi, che si sciogliono nello spirito di nitro, e non già in quel di sale; & altri, che in quel di sale si solvono, e non già in quel di nitro: lo mi riferbo ad altra occasione una tal disamina, frattanto credo, che non possa determinarsi la figura degl'acidi dalla figura de' sali, donde si son cavati per mezzo della distillazione, come volgarmente fassi; perciocchè detti sali formansi dagli acidi con li loro alcali; vedendo noi, che l'istessi acidi prendon diverse figure, qualor si fissano secondo i differenti alcali, che anno disciolti: Per cagion
d'elem-

ed' esempio lo spirito di nitro, dopo la soluzione dell' argento, si fissa in lamine sottili, larghe, e triangolari; dopo quella del rame, i suoi cristalli sono grossi, lunghetti, & esagoni; & allorache si è egli satollato del sal di Tartaro, riducesi in lunghi aghi, quali sono la vera figura del nitro: Dunque ci dee bastare di solamente supporli di figura tale, che si convenga a quegli effetti, che essi producono, senza por mira alle figure de' loro sali, da quali la violenza del fuoco l'ha svelti.

Nel discioglimento de' nostri alcali, ho io osservato, che detti due spiriti, debolissimamente, e con pena abbiano sciolti i Belzuar, e le pietre umane, a paragone degli altri alcali, quantunque la maggior parte della loro sostanza sia un sal volatile alcali, come l' analisi fatte dimostrano, qual produce sempre una maggiore effervescenza cogli acidi, di qualche le Chiocciole, o altri alcali semplici terrestri facciano.

Stimo, che tal lentezza nasca dalla quantità del denso, e grossolano olio, qual fa una gran parte della sostanza di dette pietre, che involgendo l' alcali urinoso, trattiene per alcun tempo gli acidi ad operare sù di questi alcali; e perciocchè non così facilmente sù di tali materie grasse, gli acidi vagliono, è convenuto di metterli in un forte moto, riscaldandoli sù'l fuoco: Essendosi così detta materia oliosa alla fin disciolta, ha tinta a rosso la soluzione, & è stata più carica quella, che con lo spirito del nitro si è fatta, dell' altra, che con quello del sale si è procurata; facilmente perche lo spirito di nitro in tutti i scioglimenti produce un tal rossore, e perche ancora ne ha egli disciolta maggior quantità dello spirito di sale.

Venendo adoperata ne' remedj da' stranieri la cal-

calcina viva, ho stimato bene il disaminarla tra nostri alcali terrestri: Sciogliesi ella con molta effervescenza ne' due spiriti acidi, sempre però in minor quantità nello spirito di sale, che in quel di nitro.

In tal dissoluzione notabil cosa è, che ugualmente la calcina viva, e la spenta vengono sciolte, con la sola differenza, che in quella l'effervescenza è molto più pronta, e violenta, che questa. Locche apparentemente falli da' vani delle picciole parti della calcina viva, che non sono ancora riempiti d'aere, o dall'umido di esso, come que' della spenta; e che perciò le punte degli acidi incontrando minor resistenza nel penetrare, e riempire detti interstizj nella viva, che nell'altra, vi entrano esse con maggior velocità, e risvegliano perciò una più subita effervescenza, & un più vivo calore. Con tutta la vivezza però, gli acidi non isciolgono nè punto, nè poco più, o meno l'una, che l'altra; ond'è, che io conghieturo, che tutti e due siano uguali alcali, contro il comun sentimento, che abbiamo della calcina; qual tiene, che la spenta, sia il capo morto della calcina viva, quasi che se ne fosse dispersa, e perduta la sua principal parte alcalina, che supponesi volatile.

E' sembra, che le nostre osservazioni distruggano questa opinione; perciocche se la viva contenesse una materia alcalina volatile, oltre al suo alcali terrestre; bisognerebbe maggior quantità di acido da ingollarli, di qualche si converrebbe nella calcina spogliata del preteso alcali volatile; avendo noi di già osservati, che gli alcali volatili arrestino molto acido, e più degli alcali terrestri.

Brattanto la calcina viva, producendo considerevolissimi effetti, più che la spenta, fa crede-

Memor. 1700.

E

Te,

re, che contenga materie attive, di cui l'altra è spogliata: E s'imo, che facilmente potran rifonderu tali effetti alle particelle ignite, ovvero alla materia del fuoco, introdotta con la calcinazione; la quale in tutto quel tempo, che è unita alla calcina, fa dirla viva; essendo però molto volatile, a poco a poco se ne disbriga, lasciando la sola pietra calcinata, cioè spogliata di tutto ciò, che 'l gran fuoco è capace di portar via dalla pietra; & allora chamasi spenta.

Abbiam noi esempj incontrastabili, ne' quali si avvisa, che la materia del fuoco s'introduca in certi corpi, che per lunga pezza vi si fermi, & accresca il di loro peso, come nel regolo d'antimonio calcinato allo specchio ardente: Nè li può dire che detto accrescimento di peso nel regolo, facciasi da sali volatili, o dall'olio del carbone introdottisi fra gl'interstizj di esso in questo caso. Dovendo dunque ammettere l'introduzione delle particelle del fuoco, che rimangono nel corpo del regolo, e 'l rendono più greve di quel che non era prima della calcinazione; io non veggio riparo da dovere ammettere l'istessa cosa nella calcina viva; qual supponendosi, che contenga dette ignite particole molto attive, possiam ben comprendere, come ella sarà valevole a produrre alcuni effetti, qualor non avrà fatta perdita di queste; e che non li produrrà, quando che dette parti ignite l'avran lasciata: E poicche le particelle del fuoco non sono di una materia alcalina, cui è proprio il frenar gli acidi, la calcina viva non ha ritenuta maggior quantità di spirito acido, di quel che la spenta ha fatta.

Ho io aggiunto agli alcali la polvere de' nicchi di ostriche, su l'istessa mira di esami-

nar-

narla, perciocchè con sommo felice avvenimento io l' ho adoperata in molte Persone, cui lo stomaco guasto facea somma pena: Lo spirito di nitro, come quel di sale ancora ne an disciolta maggior quantità, a proporzione degli altri alcali dell' istessa natura, cioè delle perle, de' coralli, e delle madreperle.

Io credo, che la facile lor dissoluzione nasca in parte, dall' esser dette conchiglie ripiene nella lor sostanza di un sal comune, che chiaramente si sente sù la lingua: Questo sale tien mezzo disciolto il nicchio, qual per altro, essendo molto tenero, e scitolabile, facilmente accoglie le punte degli acidi, e sì tosto solvesi, quando che la sostanza delle perle, e delle madreperle, non avendo alcuna mescolanza di tal sale, & allo 'ncontro essendo corpi asciutti, e durissimi, lo scioglimento di essi è più duro.

Credo ancora, che detta facile soluzione delle ostriche, faccia, che i stomacchi guasti dagli acidi, sentano sì gran profitto da esse, a cui potrebbe aggiungerli la quantità del sale, che contengono, quale a mio credere, non è un semplice sal marino, ma un sale provegniente dall' animal dell' ostrica, o per lo meno un sal, che abbia ricevuto sommo cambiamento in detto animale: Locchè vien confermato dall' odor forte, e dal saporoso piacere, oltre al salino, che si ha dall' acqua istessa, che ritrovasi ne' vani de' nicchi, che compongono l' ostrica, qualor si rompa, prima che sia molto disseccata.

Si preparano dette conchiglie dell' ostriche diversamente; ma perche tale apparecchio può alterarle, e corromperle, particolarmente quando si voglion calcinare al fuoco, ho voluto io aggiunger-

re quì la maniera , di cui mi son servito nell' appar-
recchiarle .

Prendi quella parte del nicchio , che è con-
cava, buttando via l'altra metà , che è piana: mon-
dala bene di tutte l'esteriori sozzure , e falla sec-
care per alcuni giorni al sole: Essendo ben dissecca-
ta , pestala in un mortajo di marmo, che facilmen-
te riducesi in polvere, qual di nuovo esponi al sole,
per meg io asciuttarla , e ripesta di nuovo , sicche
tutta la polvere passi per fino staccio . La dose è da
20 granella fino a 30 , in cinque , o sei cucchiaj di
di vino bianco , o d'acqua di melissa nel mattino a
digiuno , proseguendo a prenderla per tre settima-
ne , ovvero un mese.

P A R A G O N E

D E L L E A N A L I S I

*DEL SALE AMMONIACO , DELLA SETA,
E DEL CORNO DI CERVO .*

DEL SIGNOR TOURNEFORT .

N On vi ha, a mio credere, tra le materie a noi
conte , alcuna , che renda tanto sal volatile
in soitanza , quanto il Sale ammoniaco : In me-
scolando detto Sale con quel di Tartaro , o con la
calcina , e distillandoli con moderato fuoco , se ne
trae , come ogn' un sà , lo spirito del sal volatile ;
arrestando detta calcina , o tartaro , la parte acida
del

• 1700. 6 *Marzo*.

del Sale ammoniaco, fan, che la parte volatile disbrigata si sublimi. Quindici oncie di detto sale malcolate con 20 oncie del Sal di Tartaro, dan 10 oncie di sal volatile, due terzi appunto dell'ammoniaco: Oltre a ciò se ne ricavano 3 oncie, e mezza di spirito. Il capo morto pesa 20 oncie, e mezza, cioè mezz' oncia più del Sal di Tartaro impiegato. vi: Che perciò ha molto del verisimile, che le tre oncie, e mezza dello spirito facciansi in parte dalla flemma, che tien il Sal di Tartaro, la quale scioglie per quanto può il Sal volatile ammoniaco, unito ad un solfo penetrantissimo; perciocchè niuna apparenza di vero ha, che le 15 oncie de Sal ammoniaco non contengano altro acido, che una mezz' oncia. Il Sal di Tartaro per molto asciutto, che paga, contien sempre molta flemma, e tosto s'inumidisce, se si metta sù 'l fuoco in una paletta di ferro, per seccarlo di nuovo; e se tutto caldo, come egli è, in togliendosi dalla paletta, prima di esser penetrato dall' aere, s'impieghi come sopra, lo spirito volatile del Sal ammoniaco, non così facilmente si scevera.

Il Corno di Cervo, dopo del Sale ammoniaco, è tenuto in conto per una materia, che renda la maggior quantità di Sal volatile: Ma più ne sorprende, che la seta cruda, qual non ha nè odore, nè sapore, lo superi di molto.

Quindici oncie di Seta cruda minutamente tagliata, posta in una storta a lentissimo fuoco, producono due oncie, e due grossi di Sal volatile in sostanza; quando che 15 oncie di Corno di Cervo, distillato, egli ancora, non ne rendono altro, che mezz'oncia, e mezzo grosso: lo spirito volatile della Seta giugne a tre oncie, e mezza; Dal Corno di Cervo se ne anno quattro oncie, e 7 grossi,

F 3

cioè

cioè un oncia, e tre grossi di vantaggio.

Pošto ben tutto in agguaglio, è certo, che ugual quantirà di Corno di Cervo, appena produce la metà del Sal volatile, che dà la Seta. Per rin- vigorire un oncia, e 3 grossi di flemma, e render- la assai penetrante, sicche possa darseli il nome di spirito da Chimici, vi bisogna poco Sal volatile. Il capo morto del Corno di Cervo è stato nove oncie, e due grossi; e quella della Seta cinque on- cia, e cinque grossi; donde si avvisa, che 'l Cor- no di Cervo contenga maggior quantità di materia terrestre della seta.

Si è pocanzi detto, che lo spirito volatile di Corno di Cervo, sia una flemma colma di Sal volatile, unito ad un solfo penetrantissimo; la sperienza, che siegue, sembra molto favorevole per dimostrarlo.

Se si versi lo spirito di vino sù lo spirito di sal ammoniaco, o sù lo spirito di seta, si ravvisa tosto una concrezione salina molto considerabile: Nello spirito della seta, questa è chiaramente sepa- rata in gruppi ben grossi di Sale: In quello del Sale ammoniaco, il Sal volatile è diviso estrema- mente, e sù le prime con pena si divide, se sia una massa salina, ovvero solforosa; perlocche se l'è dato il nome di *Offa Helmentii*; tosto però ogn'un si ricrede, che sia tutta salina, perche in- tieramente si discioglie, se sopra vi si versi l'acqua. Per quel che si attiene al solfo penetrante, e sottile, qual si ritrova nello spirito volatile, e' sembra, che bastantemente si manifesti coll' insoffribile odor suo.

Le concrezioni saline, che formansi con la me- scolanza dello spirito di vino, e delli spiriti vola- tili, potrebbero risponderli all' acido dello spirito
gi

di vino, quale, in unendosi col sal acro, forma molti sensibili gruppi; ma perche noi non abbiamo indizj molto forti, per dimostrare, che nello spirito di vino vi sia veramente l'acido, sembra più verisimile, che detti adunamenti nascano indi dall' unione de' solfi dello spirito di vino con quello de' spiriti volatili. Supposto, che tali solfi si aggavignino insieme, e tra di loro si leghino, come dello spirito di vino avviene, che distacca i solfi di quali che tutti gli altri corpi, non deve sembrare fuor d'ordine, che le parti saline, quali er. no perfettamente ben sostenute dalla flemma de' spiriti urinosi uniti a loro solfi, in qualche maniera precipitino all'istante, che 'l solfo, qual serviva, come di ale nelle parti acquose, ne vien separato.

Lo spirito volatile della seta, rettificato con l'olio di Cannella, o con altro olio essenziale, forma le vere goccie, che dicono d'Inghilterra. Il Signor *Lifter* della Società Reale savilimo Medico di Londra mi ha comunicato tal segreto, che molto si nasconde ancora in detta Isola. Il Re Carlo II. con danari l'ebbe da un Chimico chiamato G....

La sperienza ha dimostrato, che dette goccioline, come il sal volatile della seta ancora, rettificato, e profumato con alcun olio essenziale, siano adattatissimi per le affezioni soporose, e per i vapori, adoperandoli interiormente, o facendoli odorare agli Ammalati; non ho però conosciuto, che debban preferirsi alle preparazioni del Corno di Ceruo, del Sal ammoniaco, nè allo spirito, nè al Sal volatile olioso ordinario, se non se forse per l'odore, qual' è molto meno sgradevole, e per conseguenza più proprio alle persone delicate.

P R O B L E M A.

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

Dati i tre lati d' un Triangolo rettillneo, ritrovar la superficie, o l'Aja.

Questo Problema è uno de' più curiosi , e de' più utili ancora di tutta la Geometria pratica , per la misura delle superficie , delle quali non possono averli gli angoli . Qualora però si posson misurare i lati di un Triangolo , sempre più facilmente , e più giustamente con tal modo , più che per altro , può venirli in cognizione della superficie ; perciocchè non vi ha bisogno d'Instrumento diviso per gradi , nè delle Tavole de' seni , bastando un semplice passo , o catena per tutta l'operazione . Ritrovo in *Mezio* , che attribuisce questo Problema a *Teone* , una molto semplice soluzione , quantunque la dimostrazione sia intrighatissima , & infinitamente composta . Tutti gli altri , che ne anno scritti , an seguitato l'istesso Metodo . Ecco quì un' altra costruzione , con una dimostrazione molto semplice , qual serve a dimostrar nell'istesso tempo la costruzione , di cui per ordinario si servono.

Sia il Triangolo proposto *A B C* , tre lati del quale *a b c* sian conosciuti : Io dico , che

$$\sqrt{\frac{1}{2}abb + \frac{1}{2}aacc + \frac{1}{2}btcc - \frac{1}{4}a^4 - \frac{1}{4}b^4 - \frac{1}{4}c^4} =$$

alla superficie del Triangolo.

* 1700. 6. Marzo.

DI.

D I M O S T R A Z I O N E .

Sia prolungato , s' e' bisogna , un de' lati del Triangolo, come BC , sopra del quale sia tirata AD perpendicolare dall' angolo opposto A , e sia AD = x , e CD = y : Sarà $bb - yy = xx$, e parimente $aa - cc - 2cy - yy = xx$, donde nasce l'equazione $bb - yy = aa - cc - 2cy - yy$, qual si riduce a $aa - bb$
 $aa - bb - cc$
 $+ aa + cc = 2cy$, ovvero $y = \frac{aa + cc}{2c}$, & in

conseguenza AD sarà = $bb - \frac{cc}{\sqrt{aa - bb - cc}}$,

la quale moltiplicata per $\frac{1}{2}c$, dà per superficie del Triangolo l'istessa radice, che si è proposta .

Per lo metodo ordinario però, e' bisogna prendere la metà della somma de' tre lati, e da questa metà dedurne ciaschun lato , donde si anno tre residui , che con l'istessa metà fan quattro quantità ; e se dal prodotto di dette quattro quantità, l'una per l'altra , se n'estragga la radice quadrata , si terrà la superficie del Triangolo.

Così nella polizione poc'anzi fatta .

Le 2 prime quantità.

La metà de' tre lati è $+\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$

La diff. di a da detta metà $-\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$

Le 2 seconde.

La diff. di b dalla medesima , è $-\frac{1}{2}b + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}c$

La dif. di c dall'istessa , è $+\frac{1}{2}b + \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}c$

Fratt.

Frattanto se le due prime quantità si moltiplichino l'una per l'altra, perciocchè anno l'istesso termine con differenti segni, il prodotto sarà $+\frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}bc - \frac{1}{4}aa$.

Per l'istessa ragione, il prodotto delle due seconde quantità sarà $-\frac{1}{4}bb - \frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}bc + \frac{1}{4}aa$.

In fine per compire la moltiplicazione, bisogna l'un per l'altro moltiplicare questi due prodotti, ciascun de' quali anno l'istessi termini, ma con segni contrarj, fuorchè bc ; è 'l prodotto sarà $-\frac{1}{16}b^4 - \frac{1}{16}c^4 - \frac{1}{16}a^4 + \frac{1}{16}bbcc + \frac{1}{16}bbaa + \frac{1}{16}aacc$, che è l'istesso del ritrovato con la regola precedente, la di cui radice quadrata, farà la superficie dell'angolo proposto. Locche &c.

PROSEGUIMENTO

DELLE ANALISI

SU L' IPECACUANA

DEL SIGNOR BOULDUK.

IN parlando dell' Ipecacuana griggia, promisi ultimamente di continuar le mie osservazioni sù le due altre; quali ho fatte con l'istesso ordine, e tenute l'istesse proporzioni.

Osservai per mezzo della distillazione, che la bruna contenea minor quantità d'ollo, e che l'ultima porzion dello spirito, che per violenza del fuoco veniva fuora con detto olio, quantunque notabilmente acido, sembravami, che contenesse molte parti volatili, & in maggior quantità della grig-

griggia, in ugual porzione di spirito.

Avvalorò questo giudizio, la mescolanza, che io feci dell' uno, e dell' altro spirito col sal di Tartaro; poicche le particelle volatili della bruna scapparono via con maggior vivezza, e ferirono in altra maniera l' odorato di qualche non fece lo spirito della griggia.

Da questi due fatti, ho stimato inoltre, che se detta Ipecacuana bruna conteneva minor quantità di parti oliose della griggia, avesse ancora minor numero di parti resinose; & in secondo luogo, che se quest' ultima porzion di spirito sembrava di esser piena di più parti volatili, quindi avvenisse la maggior violenza ne' suo' effetti. Potrebbe questa osservazione aggiunger molto peso al sentimento di coloro, quali credono, che la virtù solutiva de' medicamenti si facesse da un certo sal volatile; e che perciò fossero più, o meno violenti, secondo che maggiore, o minor quantità di detti sali volatili contenessero. La quistione è molto sottile ancora, e richiede esser confermata con esperienze più sensibili, quali non trascurerò nelle occasioni, e ne' miei lavorj.

Questo è 'l più essenziale, che io ho potuto avvertire sù l' Ipecacuana bruna, comparata con la griggia in distillandole: mi rimane a dirvi qualche m'abbian prodotte le differenti estrazioni, che ne ho fatte, secondo le maniere da me tenute, e pocanzi esposte sù la griggia, sempre comparando l' una con l' altra.

Sù le prime, ho ravvisati l' istessi prodotti, cioè un estratto resinoso, & un salino; l' uno, e l' altro però di essi in minor quantità nella bruna, che nella griggia; e consequentemente la seccia di quella più pesante della seccia di questa.

E pe-

E' però bene di rinnovar tali proporzioni . Da otto oncie d' Ipecacuana griggia, ho ritratto, con lo spirito di vino , dieci dramme di estratto resinoso : Da una ugual quantità della bruna , se ne son tenute sole sei dramme .

Dal capo morto di questa griggia spogliato solamente del suo estratto resinoso , per un mestruo acquoso , se ne son ricavate due oncie di estratto salino ; L' istessa feccia della bruna non ne ha prodotto altro , che cinque in sei dramme . Il capo morto della griggia spogliato dell' uno , e dell' altro estratto , era del peso di quattro oncie , e per contrario quest' ultimo giugneva sino a quasi sei oncie : Donde si dimostra , che i principj attivi abbondano più , e sono in maggior quantità nella griggia , che nella bruna .

Si confermò questo fatto con l' estrazion , che siegue , opposta alla prima .

Io mi era servito nella precedente dello spirito di vino , e di poi dell' acqua ; in questa però tutt' all' opposto , ho prima impiegata l' acqua , indi lo spirito di vino , sù la mira , che lo ho sempre avuta , di potere con un istesso disciogliente solvere, così le parti resinose, come le saline, principalmente quando le prime non predominano sù le seconde, per le ragioni nelle mie prime osservazioni recate .

Ho notato dunque , che otto oncie dell' Ipecacuana bruna mi an prodotte , per mezzo di un solvente acquoso , un oncia, e tre dramme d' estratto ben sodo , e ben legato ; & il rimanente ben disseccato , con l' ajuto dello spirito di vino , m' ha date sole 24 granella d' estratto resinoso ; quando che simil quantità della griggia , per questo istesso solvente acquoso , m' avea fornito di tre oncie , •

mez-

mezza di estratto, & il rimanente con lo spirito di vino 36 granella di estratto resinoso: Da quali intieri fatti, facilmente si deduce, che l' Ipecacuana bruna tenga molta minor quantità di parti attive, e molta maggiore di parti terrestri di quelle che non tiene la griggia.

Frattanto egli è fermo, che la bruna sia più attiva, e più violenta, che la griggia; locchè n' intriga, e sembra paradossò. Ecco un mio pensiero.

E' si sà, che le virtù attive, nè dal peso, nè dalla massa de' corpi si misurano; poicché que', che anno minor ampiezza, talvolta son dotati di maggior forza, & attività, *Vis maxima in minima mole*. Noi allo 'ncontro abbiamo osservato, che l' ultima porzion dello spirito distillato dalla bruna, era più pungente, e feriva più vivamente i sensi, di quella della griggia: Perchè non avran eglino l' istessa attività ne' nostri corpi, irritando le parti interiori, e con maggior violenza agitando gli umori? Gli estratti della bruna, sono, per vero dire, in minor quantità, ma la virtù di essi puol esser più concentrata, & in conseguenza più attiva.

Rimetto a savj libero il campo, perchè possano dirne, e più giustamente pensarne, attendendo le osservazioni, che mi verran fatte di avvertire sù gli effetti di tutte queste parti così divise, come ancora della terza spezie d' Ipecacuana, per poterle suggerire,

S P E R I E N Z A

DELLA REFRAZION DELL' AERE

FATTA PER ORDINE DELLA SOCIETÀ
REALE INGLESE.*Riferita dal*

SIGNOR CASSINI FIGLIO.

* **V**ien questa sperienza inserita negli atti Filosofici, con questi termini. Noi prendemmo un cilindro fonduto, fig. 1 ABCD, e tagliammo una delle sue estremità perpendicolarmente all' asse *ax*: L' altra estremità AB era inchinata a detto asse circa $27 \text{ e } 30'$; Sieche la perpendicolare a quello piano inchinato, formava con l' asse del cilindro *ax* l' angolo PCA di quasi $62 \text{ e } 30'$. Erano queste estremità appoggiate su di un istrumento di rame de' Pulitori di cristalli, & intorno a ciascuna di esse vi si era addattato un orlo stretto, e sottile di rame *bbbb*. Si saldò sopra del cilindro in E un doccio di rame EF, & al di sotto un' altro doccio CH; l' ultimo di questi era lungo tre dita, e largo sei. Su' l' Pancone *ddd* si congegnarono due altri assi LL a lui perpendicolari, e tra di essi paralleli. In ciascuno di questi due assi s' era intagliato un arco di circolo uguale alla circonferenza del cilindro, in maniera che quando il doccio GH era en-
tra-

* 24. Marzo 1700.

trato in una buca , qual' era nel mezzo del Pancone ddd , il cilindro si adattasse in detti due archi , e rassodasse ivi con saldatura , in maniera che l' asse ax rimanesse parallelo al Pancone ddd , e rilevato sù di esso, di quasi un dito , e mezzo . L' estremità perpendicolare del cilindro DC era turata da un cristallo , obiettiva di 76 piedi , oo ; e l' altra estremità AB da un vetro piano FF con somma diligenza pulito , e scelto a bell' arte , perche potesse egli trasmettere con tutta distinzione gli oggetti , non ostante la grande obliquità , che con i raggi visivi aveva . Gli orli bbbb erano stuccati per un lato esattamente intorno all' estremità del Cristallo , & erano per l' altro lato appiccati esattamente all' estremità del cilindro , perche potessero resistere alla pression dell' aere .

Invece di un Racino , come nell' esperienza di Torricelli , noi adoperammo un sifone rivolto di rame figur. 2MNO , saldato sù l' asse GGG. Uno de' bracci di detto sifone era perpendicolare alla Tavola , e l' altro NO inchinato , e sostenuto vicino all' estremità superiore O , da picciolo sostegno KK .

Piantammo dunque il cilindro , come nella fig. 2 , sopra una Tavola fissa sul pancone . Il doccio GH passava per una buca , che si era fatta a detta Tavola , e l' di lui asse l' era quasi parallelo , e l' Pancone Dddd era inchiodato a questa Tavola . Il doccio ne dell' occhiale ss con l' oculare era adattato al vetro obiettivo , & in detto doccio si era posto un capello nel comun fuoco di questi due cristalli nell' asse del cilindro continuato . Inchiodammo sù l' Pancone sotto del cilindro l' asse gggg , sù di cui era il sifone incurvato , & unimmo M & H (cioè , l' estremità del braccio superiore del Sifone .

fone con l'estremità del doccio inferiore saldato nel cilindro) inferendo in essi un doccio di vetro T , le di cui giunture erano perfettamente stuccate, e ricoperte con pezzetti di Vescica, ligati con filo forte : Si era parimente ligata una Vescica per di sotto alla giuntura in M , e dopo averla ripiena d'acqua, si era ligata ancora per di sopra in N , affinchè l'aere in niun modo potesse introdursi per i pori, o per le aperture dello stucco, se alcuna ve ne fosse mai stata.

Polimo un filo nero sopra uno pezzetto di carta bianca, qual'era sù di una picciola Tavola, e l'allogammo nell'asse del cilindro Cx prolungato. Rieppimmo i docci, e 'l cilindro di Mercurio, & avendo turato il doccio di sopra F con un picciolo turacciolo di rame K , e chiuso nelle altre giunture, fecimo scorrere il Mercurio in O , nella Vescica V , sinattanto, che si fermò sospeso nell'ordinaria altezza, come nel Barometro, lasciando i spazj di sopra tra i vetri oo , & ff voti d'aere. Ritrovammo dunque, che l'oggetto, qual prima appariva nell'asse in a , si era notabilmente rilevato sopra; lo spinfimo indi da a in x , sinattanto, che egli si vidde in x .

Poicche l'asse del raggio visivo Xa , qual'è parimente asse del cilindro, cadendo perpendicolarmente sù lo spazio voto del cilindro, passa per questo senza alcuna refrazione; uscendo però obliquamente nell'aere, rompesi verso la perpendicolare pc , e riceve una nuova direzione verso x . Lo spazio ax sottende l'angolo di refrazione, qual noi misurammo, e rinvennimo, come siegue.

L'altezza dell'oggetto al di sopra dell'asse del raggio visivo ax , era $\frac{22}{100}$ di un dito, la distanza dall'oggetto al cilindro era di circa 612 dita,

daa;

donde si ha l'angolo della refrazione acx di due minuti, e 23 secondi. L'angolo dell'emersione PCA per la costruzione del cilindro era di 62 e 20'; dunque l'angolo dell'incidenza pcx era di 62 e 27' 37'.

Quindi in generale, secondo le conosciute leggi della refrazione, essendo i seni degli angoli d'incidenza di 100000.

I seni degli angoli d'emersione sono 100036. e la potenza refrangente dell'aere denso di 36.

Intendo propriamente per potenza refrangente di un corpo trasparente quella, per cui i raggi obliqui della luce son torti dalla loro direzione, qual vien misurata per le differenze proporzionali, osservate sempre tra seni degli angoli d'incidenza, e que' di emersione.

Questa proprietà non sempre è proporzionale alla densità, o per lo meno al peso del mezzo refrangente; perciocchè la potenza, che refragne nel vetro, a quella dell'acqua, come 55 a 34; quando che il peso è, come 87 a 34, cioè, che 'l quadrato delle potenze sono a un da presso tra di loro, come i loro pesi: Vi sono ancora alcuni fluidi, che quantunque più leggieri dell'acqua, an pur essi una maggior potenza refrangente; così quella dello spirito di vino, secondo l'esperienza del Signor Hook (*Microg. pag. 220.*) è a quella dell'acqua, come 36 a 33; e reciprocamente il peso di quella a quello dell'acqua, come 33 a 36, ovvero $36\frac{1}{2}$. La potenza però dell'aria, e dell'acqua, par che tengano la proporzione direttamente de' loro pesi, come nell'agguaglio della Tavola seguente. I numeri, ch'esprimono la refrazione dell'acqua, son tirati da 9 osservazioni fatte in differenti angoli d'incidenza dal Sig. Gascoigne, che n'è l'Inventore.

Memor. 1700.

G

I se-

I seni degli angoli d'incidenza per traverso dell'acqua, e dell'aere venendo supposti

100000 100000

I seni degli angoli corrispondenti fuor dell'acqua, e dell'aere, son come

134400 a 100036

La potenza refrangente dell'acqua a quella dell'aere è dunque, come

34400 a 36

Se suppongasi, che 'l peso dell'acqua sia a quello dell'aere, come 900 a 1, saranno essi tra di loro, come

34400 a 38

Ma se suppongasi come 850 a 1; saranno tra di loro come

34400 a 40

Può quindi conghietturarsi, che la densità dell'acqua, e dell'aere son proporzionali alle loro potenze refragenti, e se con le sperienze, da farsi in appresso per mezzo del Cilindro voto di aere in differenti angoli d'incidenza in diversi cambiamenti di aere, potrà ciò confirmarsi; sarà più che probabile, che le potenze refragenti dell'atmosfera, siano da per tutto in tutte altezze sù la Terra proporzionali alle loro densità, e rarità: Nè farebbe difficile il ravvisare perciò qual via debba fare il lume a traverso dell'atmosfera, per terminar l'ombra della Terra; e 'l disaminare in qual distanza debba la Luna stare, per soffrir l'eclissi, la di cui durata sia stata osservata.

Questa determinazione è molto considerabile nell'Astronomia, da ricompensare l'affanno, che soffrirebbe, in perfezionando detta nuova speranza.

Ri-

Riflessioni sù le precedenti osservazioni.

Nell' ultima lettera di mio Padre , qual anno inserita nell' *Efemeridi di Malvasia dell' Anno 1661.* Il seno dell' inclinazione dell' etere è al seno dell' inclinazione dell' aere , come 100000 a 100028;⁴ in maniera che la potenza refragante , che da tal supposizione risulta , è di 28;⁴; quando che secondo l'ultime sperienze fatte in *Londra* , si è ritrovata di 36.

Puol essere , che tal differenza nasca dall' altezza dell' aere , qual' è più grande in *Londra* , che in *Bologna* , come più elevata sù la superficie del Mare . L'aere ancora di *Londra* , che sembra un poco più grossolano di quel di *Bologna* , può contribuire all' accrescimento della di lui potenza refragante .

Secondo l'esame delle refrazioni osservate in Torneo nella Botnia , il seno dell' inclinazione nell' etere è al seno dell' inclinazione nell'aere , come 100000 a 100045 , & in conseguenza la potenza refragante , che risulta da tali refrazioni , è di 45.

Se sopra di queste sperienze fatte in Inghilterra può farli conto , gioverà a confirmare , che le refrazioni dell' aere sian maggiori , quanto più son vicine al Polo ; poiche in *Bologna* , che ha 44⁸ 30' di altezza , la potenza refragante è di 28;⁴ ; In *Londra* , dove l'altezza è di 51⁸ 30' , ella è di 36 ; & in *Torneo* , dove l'altezza è di 65⁸ , e 40' , è ella di 45 . Non corrisponde precisamente a proporzione alle differenze delle altezze del Polo ; Perciocche dalle osservazioni fatte nella *Cayenne* , la potenza refragante giugne a quasi 27 , poco differente da quella di *Bologna* osservata di 28;⁴.

**DEL MOTO
IN GENERALE
PER TUTTE SORTI DI CURVE, E DI FORZE
CENTRALI,**

*Così Centrifughe, che Centripete, necessaria,
a corpi, che le descrivono.*

DEL SIGNOR VARIGNON.

A 30 di Gennajo io diedi una maniera generale in determinar le forze, le velocità, i spazj, & i tempi, essendo data in tutte sorti di movimenti fettilinei variati a piacere una sola di dette quattro cose; o piuttosto una sola ragione di due di essi presi a discrezione: ora quest' istessa maniera io porgo per tutte sorti di movimenti in linee Curve, cioè molto più generale; poicche deducesi quindi tutto ciò, che riguarda i moti per linea retta. Ne risulta parimente una formola semplicissima delle forze centrali, o Centrifughe, o Centripete, sù le quali poggia le fondamenta l'eccellente Opera del Signor *Newton de Phil. natur. princ. mat.* La brevità delle Memorie non permettono, che io mi distenda quanto quì si converrebbe sù l'uso di tal regola, per iscoprir i pesi de' Pianeti, riserbandomene l'inchiesta per un'altra volta, contento solo di far quì vedere con quanta agevolezza ne porga gli esempj, che reco, presi la maggior parte dal Signor *Newton*, cioè dalle pro-

po-

posizioni 7, 8, 9, e 10 del suo 1. lib., che son comprese negli art. 11, 19, 12, 9, che sieguono. Ne ho tolto quello delle Forze centrali tendentino al fuoco delle sezioni Coniche, per riserbarlo alla Memoria del peso de' Pianeti, di cui sarà egli una parte.

I. Pongansi quì dunque l'istesse cose intiere, come nella Memoria de' 30 Gennajo, cioè l'istessi nomi, e tutti gli angoli rettilinei (ch'ivi si veggono) retti, toltone gli angoli in C: Invece però di concepire il corpo mosso da A in H per la retta AH, immaginiamlo, che si muova da EG in L lungo della Curva QL, le di cui ordinate siano gli archi circolari HL descritti dal centro C, e le ascisse AH; in maniera che il luogo delle sei curve, che egli avea nella precedente Memoria, ve ne sieno quì presentemente sette, cioè QL, TD, VB, FM, VK, FN, FO, la prima delle quali QL con la sua lunghezza esprima (da EG fino ad L) lo spazio scotso. Sia ancora il tempo impiegato a scorrerlo espresso con l'ordinata corrispondente HT della Curva TD: la velocità del corpo mosso (in ciascun punto L) con le ordinate parimente corrispondenti, & uguali VH, VG delle curve VB, VK: la sua forza centrale in L, cioè quella forza, che egli ha assoluta in L verso il centro C, con le ordinate corrispondenti ancora, & uguali FH, FG, FE delle Curve FM, FN, FO.

Quindi è, che dette Curve si diranno ancora, come nella Memoria de' 30 Gennajo, DT curva de' tempi, VB, VK curve delle velocità FM, FN, FO curve delle forze, & inoltre QL Curva de' cammini.

G 3

II.

Fig. 11

II. Sian parimente $AH = x$, i tempi $HT = AG = t$, le velocità $HV = AE = GV = v$ e le forze centrali assolute $HF = EF = GF = y$: Sia inoltre lo spazio scorso $Ql = s$, $AC = a$, $CH = r$, & $Rl = ds$. Da questo si avrà ds per lo spazio scorso da una velocità uniforme v in ciascun istante; dv per l'accrescimento della velocità, che si è fatto; dds per quello spazio, che si scorre allora, in virtù di tale accrescimento di velocità, & dt per l'istesso istante: Si avrà parimente $a = x + r$, locche dona $dx = -dr$, per differenza di tutto positiva.

III. A buon conto non consistendo la velocità, che nella ragione dello spazio scorso con un moto uniforme al tempo impiegato a scorgerlo; si avrà $v = \frac{ds}{dt}$ per una prima regola, la quale darà $dv = \frac{d^2s}{dt^2}$, facendo dt costante.

IV. Inoltre se s'immaginino due archi HL, bl indefinitamente l'un l'altro prossimi, con i loro raggi CL, Cl , il primo de' quali CL incontri bl in R , e che da questo punto R si concepisca parimente RP perpendicolare sopra di Ll ; rinverrassi, che la forza assoluta HF (y) in L verso C , essendo a quel che 'l corpo mosso ne riceve da essa, secondo $Ll :: LR \cdot LP :: Ll (ds) LR (dx)$. Questa forza secondo Ll sarà $= \frac{y dx}{ds}$. Ma li spazj scorsi

da un corpo mosso con forze costanti, e continuamente applicate, qual per ordinario si crede il peso, essendo in ragion composta di dette forze, e de' quadrati de' tempi impiegati a scorgerli; si avrà parimente $dds \frac{y dx}{ds} = ds^2$, Dunque $y = \frac{d^2s}{ds^2} = \frac{d^2x}{(v dt)^2}$

$\left(\frac{vdx}{dx}\right)$; locche forma ancora una regola, quale aggiunta a quella dell' *art.* 3. sodisfa a tutto ciò, che si propone qui a sciogliere, o che le ordinate HL siano rette, o circolari; poicche la distanza del centro C in questa regola non entra.

REGOLE GENERALI DE' MOTI PER LINEE CURVE.

$$1. \quad v = \frac{ds}{dt}$$

$$2. \quad y = \frac{v^2 ds}{ds^2} \left(\frac{vdx}{dx} \right)$$

V. Per quel che si attiene all'uso di queste due regole, dico ora, che delle 7 Curve diviliate sopra, essendone date due qualunque, cioè l'equazioni di due prese a piacere, si potran sempre ritrovare le 5 altre, supposte l'integrazioni richieste, e la soluzione delle equazioni, che potrebbero incontrarsi.

VI. E' facile la pruova di questa proposizione; perciocche se, per cagion di esempio, si abbino l'equazioni delle Curve de' cammini, e de' tempi QL, & DT.

1. La prima di dette equazioni darà le ds , e la seconda le dt in x (vi comprendo parimente le dx) & in costanti: Sostituiti i valori di ds , e di dt nella prima delle Regole generali, la cambiaranno in una equazione, in cui non vi sarà altro, che v ,

G 4

& π

& x di variabili; & in conseguenza sarà la Curva delle velocità VB: E qui è bene ad avvertire, che non incontrando alcuno ostacolo (*ipotesi*) ne altra forza, fuorché la centrale, e 'l moto del corpo L, cominciato una volta, secondo una direzione a qualunque angolo, con quella di detta forza, si avrà qui per tutto, secondo il Sig. Newton (*Phil. Nat. princ. Mat. lib. 1. sect. 2. Th. 1.*) le dt , come le rdz , ovvero $dt = rdz$; di maniera che una sola delle equazioni delle Curve QL, DT; potrà qui dar l'altra con quella della Curva VB.

2. Questa Equazione della Curva VB con quella di DT dando parimente x in v , in t , e nelle costanti; ne risulterà ancora un'altra, nella quale non vi sarà altro, che v , & t , e le costanti, qual per conseguenza sarà l'altra Curva delle velocità VK.

3. Avendo parimente l'equazioni delle Curve QL, DT, VK, si avran ancora i valori di dt , dv in x , in dx , e nelle costanti; quali valori sostituiti nella seconda Regola generale, prenderanno un'equazione, in cui y , & x saran sole variabili; & in conseguenza sarà la Curva delle Forze FM.

4. Questa equazione della Curva FM, e quella di DT data, doneran parimente x in y , in t , e nelle costanti; donde risulterà ancora un'equazione, la quale avendo y , & t solamente variabili, sarà quella d'un'altra Curva delle forze FN.

5. L'equazioni in fine rirrovate di FM, e di VB, daranno ancora x in y , in v , e nelle costanti; donde verrà parimente una, la quale avendo v , & y variabili, sarà quella della terza Curva delle Forze FO, qual'era ultima a ritrovarsi.

VII. Se in luogo delle Curve QL, & DT si darà
fora

fero due qualunque altre, per cagion di esempio VB, NF, cioè le loro equazioni.

1. Queste due equazioni dariano v in x , ovvero x in v , & y in t (vi comprendo parimente le loro differenziali, e le costanti), i valori delle quali v , & y sostituiti in $ydx = vdv$, che dà la comparazione delle due Regole generali, formeranno un'equazione, la quale avendo solamente x , & t variabili, sarà quella della Curva TD:E se sostituiscasi il valor solo di v in x nell'equazione $ydx = vdv$, diverrà quella della Curva FM: Così se'l valore di x si sostituiscasi in v , e di y in t , detta equazione diverrà quella della Curva VK.

2. Avendo così l'equazioni delle Curve VB, DT, FM, si avranno ancora i valori di v , t , & y in x , e nelle costanti, quali valori sostituiti nella seconda Regola generale, ne faranno una equazione, che contenendo x , & s solamente variabili, sarà quella della Curva QL; sostituendo $a - v$ (art.2.) in luogo di x .

3. Riman solamente la Curva FO, che si ritroverà, come qui sopra (num.5.art.6.). Egli è chiaro, che l'istessa cosa avverrà di qualunque altra di tali Curve date a due a due. Locche, &c.

VIII. Questa dimostrazione fa chiaramente vedere tutti i differenti usi, che possono farsi delle precedenti Regole; non concedendomi però la brevità delle Memorie, l'entrar nel molto minuto delle cose, io mi restringerò a leggermente parlare intorno a quel che si attiene alle forze centrali, rese cotanto celebri dal Sig. Newton, e Sig. Leibnitz per Padattamenti, che ne han fatti a Pianeti, e per iscovrirne i pesi, riguardo al Sole, nell'ipotesi di Kepler: Basterà ancora la seconda di queste Regole per tutto ciò, come cerco a dimostrare cogli
esem.

106 *Memorie dell'Accademia Reale*
 esempj, che sieguono, per la conformità delle mie
 soluzioni, con quelle del Signor *Newton* in tut-
 to ciò, che sarà comune: Riserbandomi altrove
 l'esempio del Signor *Leibnitz*, come quello, che è
 d'Astronomia.

DELLE FORZE CENTRALI,

Che tendono ad un'istesso punto.

IX. *Esempio 1.* * Sia l'Ellisse ordinaria ALB, di cui C sia centro, al quale tendano tutte le forze, o pesi del corpo L, che la descrive. Per ritrovarli, siano ancora $CL=r$, l'arco $RL=ds$ descritto dal centro C, $AH=x$, $AL=s$; Siano inoltre l'Asse maggiore $AB=2a$, e'l suo Parametro $=p$.

La natura di questa Ellisse darà $dz = \frac{aspdr}{\sqrt{2ar - asp \times asp - prr}}$ per sua equazione al centro, la quale darà $ds^2 = (dz^2 + dr^2) = \frac{2a^2 prr - 2ap r^2 + aspprr}{2ar - asp \times asp - prr}$

$\times dr^2$. Dunque $\frac{ds^2}{dz^2} = \frac{2aar - 2r^2 + asrr}{a^3 p}$, ovvero $\frac{2as - 2rr + ap}{a^3 p} = \frac{ds^2}{r dz^2}$ (*num. 1. art. 6.*) $= \frac{ds^2}{r dz^2}$.

Et in conseguenza ancora facendo ds costante, $\frac{ds^2}{ds ds} = \frac{-p dr}{a^3 p} = \frac{4rdx}{a^3 p}$, ovvero $\frac{ds^2}{ds ds} = \frac{-p dr}{a^3 p}$ (*art. 2.*) $= \frac{4rdx}{a^3 p}$, ovvero $\frac{ds^2}{ds ds} = \frac{-p dr}{a^3 p}$ (*art. 4. Reg. 2.*) $= y$. Dunque le forze, ovvero

i pesi

* Fig. 2.

i pesi (y), che tendono al centro dell'Ellisse C, son come le distanze CL (r) da detto centro al corpo L, che la descrive, ovvero come i Diametri corrispondenti di detta Ellisse. Donde si vede parimente, che la linea delle forze FM (Fig. 1.) deve essere quì (Fig. 2.) una retta MO, la quale prolungata passerà per lo centro C.

X. L'istessa cosa ritrovassi per la Parabola, supponendo A infinita, e perciò CL(r) ancora infinita, e parallela al suo Asse AB: donde si vede, che le forze centrali saran quì tutte uguali; quindi prendendo per tale il peso de' corpi, cioè per costante, secondo le direzioni parallele, la lor curva di proiezione dovrebbe essere una Parabola nel voto, ovvero in un mezzo (se fusse possibil mai), qual non ritardasse, nè accrescesse il lor movimento, come Galileo la ritrovò. Per l'Iperbole, il solo cambiamento de' segni negativi dell'equazione al centro dell'Ellisse nell'art. precedente, ne farà parimente una

al suo centro ($dt = \frac{aapdr}{\sqrt{a^2r^2 + aap \times aap + p^2r}}$), la quale

darà parimente $y = \frac{a^3p}{-2r}$, cioè le Forze centrali ancora, come diametri corrispondenti; Ma in vece delle Centripete, com'erano quì sopra, diverranno quì centrifughe.

XI. *Esempio. II.* * Sia il semicircolo ALC: Si cerca qual Forza centrale, che tenda al punto C, sia necessaria al punto L, per far questo descrivere. Siano ancora CL, ovvero C/ $=r$, & AC= a : Se si facciano le rette AL, Al; si avrà AL= $\sqrt{a^2-r^2}$, & $-rdr$.

* Fig. 3.

$$\frac{dr}{\sqrt{aa-rr}} = Rr \text{ (art. 2.)} = dz, \text{ ovvero } \frac{dz \sqrt{aa-rr}}{r} =$$

$$dr : \text{ Dunque } \frac{aa-rr}{rr} \times dz^2 + dz^2 = dr^2 + dz^2 = ds^2 ;$$

$$\text{locche dà } \frac{dz^2}{ds^2} = \frac{aa-rr}{rr} + 1 = \frac{aa}{rr}, \text{ ovvero } \frac{aa}{ra} =$$

$$\frac{dz^2}{rrdz^2} \text{ (num. 1. art. 2.) } \frac{dz^2}{ds^2}. \text{ In facendo dunque } ds$$

$$\text{costante, si avrà } \frac{2dzds}{ds^2} = \frac{-4aarrdr}{rr^2} \text{ (art. 2.)} = \frac{4aardr}{rr^2}$$

$$\text{ovvero } \frac{2aa}{r^2} = \frac{deds}{ds^2 dr^2} \text{ (art. 4. reg. 2.)} = 1, \text{ cioè, che}$$

le Forze centrali tendentino al punto C sian quì in ragion reciproca della 5 potenza de' loro raggi CL: Donde si vede parimente, che la linea delle Forze FM (Fig. 1.) debba quì essere (Fig. 2.) una Iperbole del 5 grado tra le Asimptote ortogonali AC, CO, il di cui luogo sarà $grs = 2ab$, prendendo a , per unità, & r (CH) per sue Ascisse.

XII. *Esempio III.* Sia la Spirale Logaritmica QL, il di cui centro sia C, al quale tendano le Forze, o i pesi del corpo L, che la descrive. Per ritrovarli sian le cose, come quì sopra (art. 2.) ; la natura di questa spirale darà $Rl(ds)$. $Ll(ds) :: a.b$.

$$\text{ovvero } \frac{ds}{dz} = \frac{b}{a}, \text{ oppure } \frac{bb}{aar^2} = \frac{ddds}{rrdz^2} \text{ (num. 1.}$$

$$\text{art. 6.)} = \frac{ds^2}{dr^2}; \text{ e facendo } ds \text{ costante, } t^2 \frac{2dzds}{ds^2} =$$

$$\frac{2abdsdr}{aar^2} \text{ (art. 2.)} = \frac{2bbds}{aar^2}, \text{ ovvero } \frac{bb}{aar^2} = \frac{deds}{ds^2 dr^2} \text{ (art. 4.}$$

(art. 4.)

(*ars. 4. rep. 2.*) = y : Cioè le forze centrali, che tendono al centro C della spirale Logaritmica, sono in ragion reciproca de' cubi delle loro ordinate corrispondenti (CL). Donde si vede parimente, che la linea delle Forze FM (*Fig. 1.*) deve quì esser ancora un'Iperbole cubica tra le Asimptote ortogonali al centro C , una delle quali è AC : Poicché il di lui luogo è $yr = aabb$, prendendo quì ancora a per unità, & r (CH) per le Ascisse di detta Iperbole.

XIII. *Esempio IV.* * Eben quì ad avvertire, che quest'istessa ragione di Forze s'incontri ancora nella prima Spirale iperbolica; per averla però generale per tutte sorti di spirali, così paraboliche, che iperboliche, siano CL DL una Spirale di tutti generi (io ne ho parimente una infinitamente più universale; ma l' dettarla quì, sarebbe cosa molto lunga), di cui C sia il centro, come ancora dell' arco b/R , e del circolo $DEFD$ corrispondente a quella rivoluzione, che più piacerà di detta spirale: Poste l'istesse cose quì sù dette (*ars. 2.*) cioè, che i raggi delle Forze $CL = r$, l'indefinita $Ab = x$, $Ll = ds$, & $Rl = dz$; sia inoltre la circonferenza $DEFD = q$, & il di lui raggio CD , ovvero $CE = a$.

Si avrà la somma di Ee (sEe) per le Ascisse di detta circonferenza dal principio delle rivoluzioni; loçche darà $c. sEe :: a^m r$, ovvero $cr^m = a^m \times sEe$ per l'equazione di dette Spirali in generale: Dunque in $cr^{m-1} dr = a^m \times Ee$; ma $Cl(r)$.

$Ce(a) :: R/(dz)$, $Ee = \frac{adr}{r}$; Dunque parimente

maxi.

* *Fig. 5.*

$$mcr^{m-1} dr = \frac{a^{m+1} dz}{r}, \text{ ovvero } \frac{a^{m-1} dz}{mcr^m} = dr,$$

$$\text{locche dà } \frac{a^{2m+2} \times dz^2}{mmccr^{2m}} + dz^2 = dr^2 + dz^2 = ds^2,$$

$$\text{ovvero } \frac{a^{2m+2}}{mmccr^{2m+2}} + \frac{1}{rr} = \frac{ds^2}{rrdz^2} \text{ (num.1.)}$$

$$\text{art.6.)} = \frac{ds^2}{ds^2}, \text{ e facendo } ds \text{ costante } \frac{2dsdds}{ds^2} =$$

$$\frac{-2m - 2 \times a^{2m+2} + 2r2m + rdr - 2rdr}{(art.2.)} =$$

$$\frac{mmccr4m + 4r^4}{2m + 2 \times a^{2m+2} + 2mmccr^{2m}} \times dx, \text{ ovvero}$$

$$\frac{mmccr^{2m+3} - m + 3}{m + 1 \times a^{2m+2} + mmccr^{2m}} = \frac{dsdds}{dxds^2} \text{ (art.4.)}$$

reg.2.) = y: Cioè in generale, che le forze centrali tendentino al centro C di tutti i generi di Spirali, tanto paraboliche, quanto iperboliche, devono essere in tutto, come queste frazioni corrispondenti. Donde si vede ancora, che il luogo della Curva delle Forze FM (Fig. 1.) sarà quì y =

$$\frac{m + 1 \times a^{2m+2} + mma^4ccr^{2m}}{mmccr^{2m+3}}, \text{ prendendo ancora}$$

a=1, & r (CH) per l'ascisse di detta Curva.

XIV. Donde si vede, che la Spirale d'Archimede, avendo m=1, le forze centrali tendentino al loro

loro centro C, debbano essere, come le frazioni
corrispondenti $\frac{3a^2 + ccr}{ccr^2}$.

XV. Allo 'ncontro, avendo la prima Spirale
iperbolica $m = -1$, ella avrà $y = \frac{ccr - 2}{ccr} = \frac{r}{r}$;
cioè, che questa Spirale avrà le sue forze centrali
tendentino in C in ragion reciproca de' cubi de'
loro raggi, come la Spirale logaritmica (art. 12.);
siccome nel principio di detto esempio si è detto.

XVI. Ecco a mio parere sufficienti esempi del-
le forze centrali tendentino ad un'istesso punto;
vediamo ora alcuno di quelle, che si drizzino, se-
condo le direzioni parallele.

DELLE FORZE CENTRALI,

Che tendono secondo le direzioni parallele.

XVII. Poiche (num. 1. art. 6.) in tutte queste i
spazi LC $\left(\frac{rdz}{2} \right)$ sono come le dt , questo caso
delle direzioni parallele, facendo LC (r) infinita,
e perciò costante, si avran parimente in questo
stesso caso le dz , come le dt , ovvero $dz = dt$. Posto
questo.

XVIII. *Esempio V.* * Sia l'Ellisse ALB descrit-
ta dal corpo L, le di cui Forze centrali, o pesi ten-
dano secondo LC parallela a qualunque de' suoi
Assi AB, che si vorrà, de' quali E sia la metà, o
centro dell'Ellisse.

Stan-

* Fig. 6.

212 *Memorie dell'Accademia Reale*

Stando fermi i stessi nomi di sopra (art. 2.) questa Ellisse avrà le sue ordinate $HL = z$, sue Ascisse $AH = x$, gli archi $AL = s$, $LR = dx$ (= dr). In maniera che prendendo l'asse $AB = 2a$, e l'Para-

metro $= p$ sarà il suo luogo $z = \frac{\sqrt{2apx - px^2}}{2a}$, qua-

le differenziata, darà $dz = \frac{apdx - px dx}{\sqrt{2apx - px^2}}$, ovvero

$\frac{dx \sqrt{4apx - 2px^2}}{4apx - 2apx^2} = dx$, & in conseguenza ancora

$\frac{ap - px}{4apx - 2apx^2} \times dz^2 + dz^2 = dx^2 + dz^2 = ds^2$; ovvero

$\frac{4apx - 2apx^2}{p \times d + x^2} + 1 = \frac{ds^2}{dx^2}$ (art. 17.) = $\frac{ds^2}{dx^2}$: Dun-

que prendendo ds per costante, si avrà $\frac{2dxdz}{ds^2} =$

$\frac{4a^2 dx}{p \times d - x^2}$ ridotta nell'ultima differenza, ovvero $\frac{2a^2}{p \times d - x^2}$

$\left(\frac{2x^3}{p \times LG} \right) = \frac{dxdz}{dx dz^2}$ (art. 4. reg. 2.) = y , cioè, che

le Forze centrali secondo LC faranno quì, come $\frac{1}{LG^3}$, ovvero in ragion reciproca de' cubi delle ordi-

nate (LG) all'altro Asse ED dell'Ellisse proposta. Donde parimente si vede, che la curva delle forze FM (Fig. 1.) sarà quì (Fig. 6.) una Iperbole cubica tra le Asimptote Ortogonali AE, EQ, il di cui luo-

go sarà $FH \times HE = \frac{2a^3}{p}$, prendendo $a=1$.

XIX. 2.

XIX. L'istessa ragione di Forze si ritroverà ancora per lo circolo, facendo $p=2a$ nel luogo dell' Ellisse; e per l'Iperbole, rendendo tutti i segni di detto luogo positivi: Essendo però a infinita nella Parabola; il valor precedente $\left(\frac{2a^3}{p \times a-x}\right)$ delle For-

ze centrali diverrà $= \frac{2a^3}{pa^3} = \frac{2}{p}$, cioè costante, come si è ritrovata nell'art. 10. Ecco in due parole queste istesse forze per detta prima Parabola tra quelle di tutti i generi di Parabole, e d'Iperbole tra l'Asimptote.

XX. Esempio VI. * Ritonendo nella Fig. 7. i nomi stessi, e tutto il rimanente di sopra, sia $mm=x$, il luogo di tutte le Parabole NL, e delle Iperbole tra l'Asimptote all' infinito; si avrà $mz^{m-1} dz=dx$, & $mmz^{2m-2} dz^2+dz^2=dx^2+dz^2=ds^2$,

ovvero $mmz^{2m-2} + 1 = \frac{ds^2}{dz^2}$ (art. 17.) $= \frac{ds}{dz}$; e fa-

cendo ds costante, $\frac{ds}{dz} = 2m-2 \times mmz^{2m-3} dz$

(per cagion di $mmz^{m-1} dz=dx$) $= \frac{2m-2 \times mmz^{2m-3} dz}{ds dz}$

Dunque $\frac{mm}{mm-1} \times 2^{m-1} = \frac{ds}{dx}$ (art. 4. reg. 2.) $= y$

cioè, che le Forze centrali, secondo LC parallelo all'Asse AC sono in tutti questi generi di Parabole, come le 2^{m-2} corrispondenti: Donde parimente si vede, che $y = \frac{mmz^{m-1} \times 2^{m-1}}{mm-1}$ (per cagion di $x=2^m$)

$\frac{mmz^{m-1} \times x}{mm-1}$. Sarà qui il luogo della Curva delle Forze FM.

Memor. 1700.

H

XXI. Don-

* Fig. 7:

XXI. Donde ancora si vede, come sopra (*art.* 10, e 19.) che nella Parabola ordinaria, qual'ave $m=2$, le forze centrali (y) di rette così sono costanti da per tutto, & uniformi; e che in conseguenza la Curva delle forze FM si cambierà in una linea retta parallela all'Asse AC.

XXII. Nella Cicloide ordinaria verticalmente rilevata su la base si ritroverà parimente, che le Forze centrali tendenti verso di detta base, secondo le direzioni parallele verticali, ovvero parallele al suo Asse, siano in ragion reciproca de' quadrati delle distanze da questa istessa base al corpo, che descrive detta Curva. Ma questo è sufficiente, perche si conosca l'uso della seconda regola (*art.* 4.) nella inchiesta delle Forze centrali, per la descrizione di tutte sorti di Curve, così Geometriche, che Mechaniche, ne' corpi, che le descrivono; La brevità delle Memorie allo 'ncontro non fa, ch'io entri al minuto di tutte cose; ond'è, che io non aggiungerò altro intorno all'uso della prima regola, che quello mi fornisce e la presentemente della ragion de' tempi delle cadute de' corpi, de' pesi costanti, e delle direzioni parallele, lungo detta Cicloide rivolta, in maniera che queste direzioni sian tutte parallele al suo Asse, e questo a cagion della semplicità di una nuova dimostrazione, che da loro movimento Isocroni risulta, e dall'agevolezza, con la quale la Curva Sincrona del Signor Bernoulli di Groningue ancor se ne deduce.

XXIII. *Esempio VII.* * Sia dunque secondo suole un Corpo di peso costante, e di direzioni parallele all'Asse verticale SQ della Cicloide rivoltata GLQ, il di cui circolo generatore sia SFXQ, e
det-

* *Fig. 3.*

detto corpo cada lungo da K in L tutti e due punti preli a discrezione. Secondo tale Ipotesi di Galileo, la Curva AV delle Velocità farà una Parabola, il di cui luogo $v = \sqrt{x}$ esprimerà per le sue ordinate v (VH) le Velocità di questo corpo in ciascun punto L corrispondente di detta Cicloide. Si richiede la Curva ATD de' tempi impiegati a cadere da un qualunque punto K in fin al fondo Q di detta Cicloide, cominciando detta caduta da K.

Siano dunque, come nell'art. 2. $AH = x$ $HT = s$, & $HL = z$, $QL = s$; Siano inoltre $AQ = a$, $SQ = 2b$; & $HQ (a-x) = m$ variabile. Posto ciò, si avrà

$HX \sqrt{2bm - mm}$, e l'arco $QX = s \frac{bdm}{\sqrt{2bm - mm}}$, & in conseguenza $z, (HL) = \sqrt{2pm - mm} + s \frac{bdm}{\sqrt{2bm - mm}}$;

Donde risulta $dz = \frac{2pdm - mdm}{\sqrt{2bm - mm}} = dm \frac{\sqrt{2bm - mm}}{m}$, &

$dz^2 = \frac{2b - m}{a - x} \times dm^2$ (a cagion di $m = a - x$) = $\frac{2b - a + x}{a - x} \times dx^2$; locchè dà $ds (\sqrt{dx^2 + dx^2}) = \frac{\sqrt{2b - a + x}}{a - x}$

$\times dx^2 + dx^2 = -dx \times \frac{\sqrt{2b}}{a - x}$; E poichè (ipotesi)

$v = \sqrt{x}$, & (reg. 1.) $v = \frac{dx}{dt}$, si avrà parimente

$\sqrt{x} = \frac{dx}{dt} \frac{2b}{a - x}$, ovvero $dt = dx \sqrt{\frac{2b}{ax - x^2}}$ =

$\frac{2\sqrt{2b}}{a} \times \frac{dx}{\sqrt{ax - x^2}}$. Dunque integrando, e descri-

H 2

ven.

vendo il semicircolo AZQ, si avrà $t(HT) = \frac{2\sqrt{2b}}{adx} \cdot \frac{AZ}{a}$
 $\times \frac{2\sqrt{ax-x^2}}{a} = \frac{2\sqrt{2b}}{a} \times \frac{AZ}{a} = \frac{AQ}{a} \times 2\sqrt{2Q}$ per
 i tempi della caduta da K in L, & in conseguenza
 per tutte le ordinate, facendo $HT = \frac{AZ}{AQ} \times 2\sqrt{2Q}$
 cioè in ragione degli Archi corrispondenti AZ del
 semicircolo AZQ: La linea ATD, che passerà per
 tutte l'estremità T di tali ordinate, sarà la curva
 de' tempi ricercata in questo esempio, che servirà
 a determinare, o a confrontare i tempi di una istes-
 sa caduta per differenti Archi di detta Cicloide, e
 reciprocamente.

L'istessa cosa dedurrassi ancora dalla prima
 precedente regola (art. 4.) , in supponendo sola-
 mente, che l'Arco QL sia doppio della corda QX;
 perciocchè, essendo detta corda $= \sqrt{2ab - 2bx}$; Si
 avrà parimente l'arco cicloidale $QL = 2\sqrt{2ab - 2bx}$
 col suo elemento $ds = \frac{ab}{\sqrt{2ab - 2bx}} dx$
 $\sqrt{\frac{ab}{a-x}}$, & il rimanente come quì sopra .

XXIV. Di là siegue ancora una nuova manie-
 ra di dimostrare le cadute Ilocrone di tal peso ,
 com'è supposto in questa Cicloide rivolta. In pruò-
 va di ciò , che nella caduta da AK in HL , lungo
 questa Cicloide così rivolta , i tempi HT siano da
 per tutto uguali (art. 23.) ad $\frac{AZ}{AQ} \times 2\sqrt{2Q}$, ne siegue
 che i tempi QD dell' intiera caduta da K in Q,
 lungo KLQ sarà $= \frac{AZQ}{AQ} \times 2\sqrt{2Q}$, cioè costante, e
 sempr.

sempre l'istessa, qualunque sia il punto K della Cicloide GLQ; poichè in qualunque altezza AQ, col detto punto K corrisponda, la ragione di AZQ, ad AQ, che è quella d'una semicirconferenza circolare di qualunque diametro, sarà sempre l'istessa. Dunque da qualsivoglia altezza K, che un corpo di peso costante, e con direzioni parallele all' Asse SQ d'una Cicloide rivolta GLQ cada lungo di detta Cicloide, sempre giugnerà nel di lui fondo Q in tempi uguali; e per conseguenza tali cadute saran tutte Isochrone, come ho dimostrato all' Accademia in molte maniere differenti: tutte da quelle del Signor *Huygens*, e da queste.

XXV. La più generale però fra tutte viene espressa con questa equazione $as = sv$ (dedotto dall' agguaglio delle parti simili degli archi da doverfi scorrere, de' quali il Signor *Bernoulli* Professore in *Groninghe* si è servito negli Atti di *Lipsia* del 1698. pag. 267. per muovere l'Isocronismo delle cadute, secondo l'ipotesi del *Galileo* nella Cicloide rivolta, de' quali ancora io mi servj nel 1697. nell' Accademia per lo stesso soggetto), nella quale s significa l'arco compreso dal fondo sino a tal punto, che si vorrà nella curva richiesta, t , il tempo impiegato a scorrere, v la velocità acquistata su 'l fin di detto arco, o della caduta, & a l'unità. Esprime, dico, questa equazione in generale una Curva, lungo la quale cadendo un corpo, da qualunque punto (di essa curva cominci) giugnerà egli sempre al fondo di essa in tempi, che non solamente saranno uguali, ma in quella ragione, che più piacerà, qualunque l'ipotesi delle direzioni, e de le velocità si abbia, che in cadendo acquisti: In maniera, che, facendo t costante, per cagion di esempio $t = a$ per lo caso delle cadute in tempi uguali, si avrà

ancora per esse $v = s$; quale equazione, qualunque ipotesi facciasi del peso, darà sempre la Curva, lungo la quale le cadute, secondo detta ipotesi, faranno Isocrone; e reciprocamente qualunque curva si proponga, questa equazione determinerà sempre l'ipotesi del peso, o della variazione delle velocità necessarie per rendere questa Curva Isocrona.

Per cagion di esempio, per ritrovare la Curva GLQ, qual fusse Isocrona nell'ipotesi del Galileo, per l'accelerazione de' corpi, che cadono: sia la caduta lungo tal curva, cominciata da uno de' suoi punti L a piacere, donde l'orizzontale LH incontri in H la verticale HQ, quali siano parimente chiamate z , & m . L'ipotesi di Galileo, per l'accelerazione de' corpi, che cadono, darà $v = \sqrt{m}$, locche quì determinerà l'equazion generale $v = s$,

in $\sqrt{m} = s$: Donde risulta $\frac{dm}{2\sqrt{m}} = ds = \sqrt{dm^2 + dz^2}$,

& in fine $dz = dm \sqrt{\frac{1}{4m} - 1} = dm \sqrt{\frac{1}{4m} - \frac{m}{m}}$

qual'è una equazione ordinaria nella Cicloide, di cui il diametro del circolo generatore sarebbe il quarto del Parametro della Parabola espresso per $v = \sqrt{m}$. In maniera che essendo detto Parametro arbitrario, si vede, che ogni Cicloide ordinaria farà la Curva Isocrona di quest'ipotesi del peso, o dell'acceleramento della caduta de' corpi.

Essendo data reciprocamente una qualunque Cicloide ordinaria, se si voglia ritrovare l'ipotesi del peso, o dell'acceleramento ne' corpi, che cadono, propria a renderne le cadute Isocrone, lungo tal curva; essendo la sua equazione $dz = dm \sqrt{\frac{1}{4m} - 1}$

$$\frac{\sqrt{a^2 - ms}}{\sqrt{ms}} \text{ il suo elemento } (ds) \text{ farebbe } = \frac{dm}{2\sqrt{ms}},$$

locche (integrandola) darebbe $\sqrt{ms} = s = v$.
 Donde si vede, che le velocità (v) acquistate su
 l'fin delle cadute, dovriano allora essere, come
 le radici delle altezze HQ (m); come per ordina-
 rio si suppone con Galileo.

XXVI. Se si voglia parimente in uno le ipotesi
 del peso, o delle velocità richieste, per rendere
 Isocrona qualunque si vorrà dello tre Cicloidi di
 basi rette; Si prenda GLQ per una delle tre a pia-
 cere; la di cui base SG sia alla semicirconferenza
 SFXQ del suo circolo generatore: g, f , e tutto
 il resto, come quì sopra; Si ritroverà parimente,
 prendendo $SQ = 2b$, & $HQ = m$ per altezza di
 qualunque punto L; dove cominci la caduta; lun-
 go quella delle tre Cicloidi rivolte, che si vorrà,
 di cui GLQ rappresenterà la *Dilungata*, se $g < f$;
 l'*Accorciata*, se $g > f$; e l'*Ordinaria*, se $g = f$: Si
 ritroverà, dico, in generale ancora per tutte e tre
 in uno; che le velocità proprie per renderle Isocro-
 ne, debbano essere come le somme corrisponden-

$$\text{ti agli elementi } = \sqrt{\frac{ab/f + 2bvg + bbg - 2v/gm}{2bm - mm}};$$

Donde si conosce in particolare per la Cicloide or-
 dinaria, che dà $f = g$; come dette velocità deb-

$$\text{bano effettivamente essere come } s \frac{dm}{\sqrt{2b}} = \frac{dm}{2bm - mm}$$

$$= s \frac{dm}{\sqrt{2b}} = 2\sqrt{\frac{dm}{2bm}}, \text{ cioè come le radici del-}$$

le altezze m (HQ) delle cadute, per rendere que-
 sta Cicloide Isocrona, come si è veduto finora.

XXVII. Ripigliando aneora GLQ per una Cicloide ordinaria; Se presentemente si prolunghi KA fino a rincontrare il semicircolo SXQ in F, e che se li meni la corda FQ, che incontri LV in E; si avrà (art. 23.) il tempo $\left(\frac{AZ}{AQ} \times 2\sqrt{SQ} \right)$ per KL, al tempo $(2\sqrt{SQ})$ per SQ, ovvero per FQ: : AZ. AQ. Dunque sapendo altronde, che in questa ipotesi di Galileo intorno all' accelerazione della caduta de' corpi, il tempo per FQ sia al tempo per FE: : $\sqrt{FQ}$, $\sqrt{FE}$: : $\sqrt{AQ}$, $\sqrt{AH}$. Si avrà parimente il tempo per KL al tempo per FE: : $AZ \times \sqrt{AQ}$, $AQ \times \sqrt{AH}$: : $AZ \cdot \sqrt{AQ} \times AH$. Cioè come l'arco AZ alla sua corda: In modo che qualora AK è in SG, ovvero A in S, allora gli Archi AZ, & SPX si ritrovino uguali fra di loro, & FE confuso con SH; si avrà ancora il tempo per GL al tempo per SH, come l'Arco SX alla sua corda: Et in conseguenza il tempo di tal caduta da G in Q lungo la semicicloide intiera GLQ, al tempo di simil caduta da S in Q lungo tutto il diametro SQ del suo circolo generatore; come la semicirconferenza SXQ al detto circolo al suo diametro SQ.

XXVIII. Siegue ancora da ciò, che essendo data una Cicloide parimente rivolta GLQ col suo circolo generatore SXQ, & una verticale costante, e determinata GP uguale, o minore di $\frac{SQ^2}{SXQ}$; Se si prenda sù la semicirconferenza SXQ di detto circolo l'arco SX mezzo proporzionale tra 'l suo diametro SQ, e questa verticale GP, e che indi si tiri l'orizzontale XL, che incontri la Cicloide in L; si avrà l'arco GL tale, che un istesso corpo, cadendo da G lo scorrerà nell' istesso tempo, che e' scorre-
rebbe;

rebbe GP, principiando per una parte, e per l'altra la loro caduta da G. Perciocchè nell'ipotesi del Galileo, di cui quì si tratta, il tempo per GP deve essere al tempo per SH :: $\sqrt{GP} . \sqrt{SH} :: \sqrt{GP} \times SQ . \sqrt{SH} \times SQ$ (costruz.) :: SX . $\sqrt{SH} \times SQ$. Cioè (art.27.), come il tempo per GL è al tempo per SH. Dunque i tempi per GL, & per GP devono essere parimente uguali tra di loro.

Essendo così, qualunque numero s'immagini di Cicloidi GLM per lo punto G, le di cui basi siano sù di GS prolungata; se in tal modo sottraggasi altrettanto dell'Arco GL, ciascuno di loro sarà sempre scorso da questo istesso corpo nel medesimo tempo, che impiegherebbe a scorrere GP: E la curva PL, che passerà per tutti i punti L, sarà la Sincrona; di cui il Signor Bernoulli di Groningue fa menzione negli atti di Lipsia nel mese di Maggio 1697.

XXIX. Poicche * (art.27.) il punto K, preso indeterminatamente sù la Cicloide GLQ, dà sem-

pre $\frac{AZ}{4Q} \times 2\sqrt{SQ}$ per lo tempo impiegato a cadere da

AK in HL, lungo KL; se si prenda alcun altro punto M a discrezione sù di questa istessa Cicloide, per cui si tiri MR parallela ad AK, & inoltre tal altra parallela NY a piacere, la quale incontri in Y il semircolo RZQ sù 'l diametro RQ descritto,

si avrà parimente $\frac{RT}{RQ} \times 2\sqrt{SL}$ per lo tempo impiegato a cadere da M in N, lungo MN, con una caduta principiata in M: Sicche detti tempi saranno ugua-

uguali, se sarà $\frac{AZ}{AZ} = \frac{RT}{RQ}$, cioè se gli Archi AZ , & RY saran simili.

Dunque cadendo un istesso corpo da K in Q , & indi da M in Q , cominciando le cadute in K , & in M , se si dia un qualunque punto L al di sotto di K , e se ne richieda un' altro N , tale, che detto corpo cadendo da M , scorra MN nell'istesso tempo, che cadendo da K correrebbe KL ; non occorrerebbe altro che fare le orizzontali KA , LH , MR , con i semicircoli AZQ , & RYQ intorno a centri E , & F su li diametri AQ , & RQ , il primo circolo de' quali; essendo incontrato in Z da LH , bisognerebbe tirare il raggio EZ , e farlo parallelo al raggio FY dell'altro circolo: Perciocchè tirando YN parallela ad RM , si avrà MN per arco della Cicloide ricercata, cioè tale, che cadendo un corpo da M lo scorra nell'istesso tempo, che cadendo da K egli scorrerebbe KL ; giacchè in tal maniera gli archi circolari AZ , & RY si ritroverebbero simili, come si è conosciuto bisognare qui sopra.

XXX. Questa è la maniera di servirsi della prima regola dell' art. 4. , la quale n'ha forse fatto oltrepassar i limiti di una Memoria: Lasciando dunque ogn' altro esempio, non farò più parola dell' uso di dette due regole, che possono unite avere, come l'art. 5. 6. e 7. additano. In due parole solamente soggiungo, come si deducan da queste, quelle, che io diedi a 30. Gennajo per i movimenti in linee rette.

Ripigliamo la prima figura, & immaginiamo la linea LQ , secondo la quale si suppone, che 'l corpo si muova, non già come una Curva, ma come una retta, qual si confonde con AC : In tal ca-

sq

so annullandosi HL, si avrà $Ll (ds) = Hh (dx)$,
ove questi due elementi saranno in uno confusi.
Dunque rimanendo tutto 'l resto l'istesso, e le Re-
gole generali de' moti, per linee Curve dell'art. 4.
si cambieranno quì per i movimenti rettilinei in
quelle, ch'io diedì a 30. Gennajo: Et eccoli, in fa-
cendo ancora dt costante.

REGOLE GENERALI

De' movimenti per linee rette.

$$1. \quad v = \frac{dx}{dt}$$

$$2. \quad y = \frac{ddx}{dt^2} \left(\frac{dv}{dt} \right)$$

Lascio di quì parlar dell' uso di tali regole;
avendone bastantemente scritto nelle Memorie de'
30. Gennajo, per non diffondermi di vantaggio.



SPIEGAMENTO FISICO CHIMICO

DE' FUOCHI SOTTERRANEI, DE' TERREMOTI,
DELLE TEMPESTE, DE' BALENI, E DE'
TUONI.

DEL SIGNOR LEMERY.

• **M**Io disegno è, di dare per mezzo di una operazione Chimica sensibile idea di ciò che avvenga nelle Nugole, qualora nelle tempeste si aprono, per produrre i lampi, e i tuoni: Prima però di esporre detta operazione, è bene di trattar della materia, che produce effetti sì violenti, con disaminar sua natura, & origine.

Non può mettersi con ragione in dubbio, che la materia del baleno, e del tuono, non sia un solfo infiammato, è slanciato con molta violenza. Non abbiain noi cosa più accensibile, e di maggior moto, quanto che il solfo; e l'odore istesso del tuono sensibile in tutti que' luoghi, per dove egli passa, molto ben dimostra la sua natura: Non cadendo quistione su di ciò, convien presentemente ricercar l'origine di detto solfo; e non essendo egli verisimile di essersi formato nelle Nugole, bisogna, che, disciolto in vapore, vi sia stato trasportato.

Sem-

• 1700. 21. Aprile.

Sembrami , che da quella istessa materia , donde falsi il tuono , addivenga ancora il Terremoto , le Tempeste , & i fuochi sotterranei : Nel mio libro della Chimica ho io spiegata la cagione di queste gran mosse , con l' occasion d' una preparazione particolare sù 'l ferro , detta Croco di Marte , da molti anni publicata ; e poicche'l mio spiegamento s' è incontrato molto giusto , nella nuova impressione di esso vi ho aggiunte altre sperienze , quali servono a confermare qualche si era già detto : Prego la Compagnia a non tenere a male , che io in ristretto riferisca l' une , e l' altre , & a concedermi , che raccolga , quanto potrà farsi succintamente , li principali spiegamenti già fatti , e l' unisca a questo che ho quì l' onore di far oggi . Servirà tal unione a far comprender meglio il mio discorso , & ad istruir coloro , che non an letto punto il mio libro intorno a tale affare . Ecco dunque le prime sperienze ,

Si faccia una mescolanza di parti uguali di limatura di ferro , e di solfo polverizzato , riducendola con acqua in una pasta , lasciandola in digestione senza fuoco per due , o tre ore . Avvien da ciò una fermentazione , & un gonfiamento con calor considerabile , qual fermentazione s'ende in più luoghi la pasta , e vi fa delle screpolature , per dove escono vapori semplicemente caldi , qualora la materia è in mediocre quantità ; ma se questa sia in grandezza considerabile , come di 30 , o 40 libbre , allora s' accende sensibilmente .

La fermentazione accompagnata con calore , e col fuoco istesso , che in questa operazione avviene , nasce dalla penetrazione , e da violento sfregamento delle punte acide del solfo contro le parti del ferro ,

Sem.

Sembrami adattatissima questa sola esperienza a spiegar la maniera, come nelle viscere della Terra si facciano le formentazioni, i scuotimenti, egl' incendj, quali avvistano nel Monte *Vesuvio*, e nell' *Etna*, & in molti altri luoghi; incontrandosi sotto di essi il ferro col solfo; che unendosi, e penetrandosi l'un l'altro, avvien da ciò una violenta formentazione, che produce il fuoco, come nella nostra operazione. Or egli è facile il dimostrare, che nelle Montagne sudette siavi del solfo, e del ferro; perciocchè estinte le fiamme, osservasi nella superficie della Terra il solfo, e nelle screpolature, per dove il fuoco è passato, materia simile a quella, che dividesi dal ferro nelle Fucine.

Eccovi le seconde esperienze fatte, dopo l'ultima edizione del mio libro, quali sosterranno le prime, e l' mio ragionamento ancora.

Ho posto di detta mescolanza di limatura di ferro, e di solfo quantità differenti in fiaschi alti, e stretti, sicchè la materia vi sia stata più compressa di qualche possa farsi ne' Catini; la formentazione perciò, e l'infiammamento è addivenuto più forte, e rilevata la materia con qualche violenza, ha scagliata in pezzetti attorno una parte del fiasco.

Nella State io posi 50 libbre dell' istessa mescolanza in un gran vaso, che seppellj in un fosso scavato in campagna, coprendolo prima con panno, & indi con terreno sino all' altura di circa un piede: Otto, o nove ore dopo m' avvidi, che 'l terreno si gonfiava, riscaldavasi, e screpolava, indi ne uscirono vapori solforosi, e caldi, & in seguito alcune fiamme, che slargarono le aperture, e dispersero intorno al' luogo una polvere gialla.

piatta, e nera: La Terra si mantenne calda lungo tempo, qual io raccolsi, dopo di esserli raffreddata, non avendo ritrovato nel vaso altro, che una polvere negra, e greve, cioè la limatura del ferro spogliata di una porzion del suo solfo: Avrei potuto mettere maggior quantità di terreno sù 'l vaso, se non mi fosse caduto il dubbio, che la materia, per difetto d' aere non si fusse accesa. Ebbe n' iglior riuscita questa operazione nella state, che nel verno, per lo calor del Sole, che risveglia maggior moto nelle parti insensibili del ferro, e del solfo.

Non par dunque necessario il richiedere altronde ciocche possa mettere in moto nelle mine il solfo, & infiammarlo, poicche la sola unione col ferro produrrà molto bene questo effetto, come nella nostra operazione si è veduto.

Ma quì mi si presenta una difficoltà, cioè, che queste grandi formentazioni, & incendj sotterranei, non possono farsi senz' aere; & è difficile il comprender bene, come questi possa trapelar profondamente nella Terra.

Si risponde a tal obbiezione, con avvertire, che nella Terra vi sian molte fessure, e condotti invisibili a noi, e principalmente ne' Paesi caldi, ove per ordinario avvengono tali movimenti sotterranei; perciocche riscaldando il gran calor del Sole, e calcinando, per modo di dire, il terreno di più luoghi, vi fa delle profonde fessure, per quali l' aere può introdursi.

Li Terremoti probabilmente son cagionati da un vapore ingenerato dalla formentazion violenta del ferro, e del solfo, che si converte in un vento solforoso, che apresi le vie, e gira per dove può, sollevando, e scuotendo il terreno, sotto cui

cui passa: Se tal vento venga ad esser ristretto, senza poterli aprir valico per iscappar via, tã per lungo tempo durare il terremoto con sommi sforzi, fin attanto che perda egli il suo movimento; ma se incontri alcuna apertura, per donde uscir possa, slanciafi con somma impetuosità; e questa è quella, che dicono *Ouragan*, & i latini *Typhon*, noi *Turbinio*, che squarcia la Terra, & apte Voragini, di radica Alberi, & abbatte case, gli Uomini istessi non potrebbero difenderli dal furore, se non fossero avveduti a prontamente buttarsi bocconi in terra, non solamente per ischivar di esser trasportati, ma per isfuggire ancora di respirar tal vento solforoso, e caldo, che li soffogherebbe.

I Fuochi sotterrani avvengono dall' istessa esalazione solforosa; & i differenti effetti, che produce, possono farsi da molte cagioni, o dalla materia più abbondante, & in conseguenza da fermentazion più forte, per quell' aere, che li è di sopra più immischiato; o dalle screpolature maggiori incontrate nella Terra, donde an potuto le fiatoe tramandarsi, le quali impetuosamente levandosi, an dilatate più le aperture, e dato luogo ad infiammarsi tutta la materia, che è nel profondo della Terra, e di eruttar sì abbondante fuoco, che ha ricuoperti, e talvolta inondati con le ceneri i villaggi vicini.

I fuochi volanti, e que' che si veggono su di certe acque ne' paesi caldi, traggono apparentemente la loro origine dall' istessa cagione; ma perche il vapor solforoso è debole, e 'l maggior suo moto, in seltrandosi pe' l traverso del terreno, e nel passar per le acque, si rallenta, si leva da essi una leggier fiamma spiritosa errante, qual non è ali-

alimentata da quantità molto grande di materia, per esser durevole.

E' verisimile, che le acque calde minerali, come quelle di *Borbon*, di *Pichi*, di *Balaruc*, d' *Aix*, sian tali per i fuochi sotterranej, ovvero delle Terre solforose, e riscaldate, per dove esse passano; perciocche qualora dette acque sono in riposo, dividon da se porzioni di solfo, e depongono a' lati de' bacini.

Può farli ancora, che alcune acque minerali traggono il lor calore da una calcina naturale, che incontrano per via nell'interiore della Terra; questa però è una pietra calcinata da fuochi sotterranei.

Le colonne d'acqua, che rizar si veggono talvolta su'l Mare, e che recano a Marinaj un tristo presagio d'imminente naufragio, fanli apparentemente da detti venti solforosi, spinti violentemente da terreni, che son sotto al Mare, dopo le fermentazioni simili alle già dette.

I venti solforosi, che fan le fortunate tempeste, con tanta veemenza s'elevarno, in iscappando da sotto terra; che porzion di essi monta sino alle nugole; e questo è quello, che forma la materia, e la cagione de' tuoni; perciocche intrigandosi tra le nugole detto vento, che contiene un solfo esaltato, e venendo battuto, e compresso fortemente; acquista egli un moto molto grande, donde si accende, e forma baleni, squarciando le nugole, e lanciandosi con infinita rapidità: Questo è quel furioso moto, che cagiona il fragor del tuono, che sentiamo; perciocche uscendo violentemente detto solforoso vento da un luogo stretto, dove egli era compresso, scuote orribilmente l'aere, e con velocità straordinaria si aggi-

za, come appunto fa la polvere nell' uscir da un cannone, ove sia ella stata accesa.

Può quì dirsi ancora, che un sottil nitro, quale naturalmente sempre è nell' aere diviso, si lighi al solfo del tuono, & accresca la forza del suo moto, e della sua azione; come appunto avviene, quando al solfo comune si unisca il nitro, che produce un molto maggior violento effetto, in rarefacendosi, di qualche non fa quando egli è solo.

Quello vento solforoso del tuono, dopo di essersi raggirato nell' aere per qualche spazio di tempo, a poco a poco rallenta il suo moto, donde è, che il tuono sia più violento, e più dannoso all' istante, che esce dalle nugole, che quando ha nell' aere scorso parte de' suoi giramenti: Egli in fine dopo di aver fatto tanti rumori, accenzioni, e rovine, si riduce in nulla, non lasciando pe' luoghi, dove e' passa, altro, che un odor di solfo, simile a quello, che la tempesta detta *Qurga* rimane.

Per quel che si attiene alle pietre de' folgori, quali la comun vuole non discompagnate mai da tuoni, sembrami l' esistenza di esse molto dubbia, & io inchino molto a credere, che non mai vi siano state veramente; quantunque assolutamente non sia egli impossibile, che montando rapidamente sino alle nugole i venti solforosi, come si è detto, trasportino con seco delle materie pietrose, e minerali, quali rese molli, uenendosi per mezzo del calore, formino quella, che dicono pietra del tuono, ma di queste non se ne incontran mai re' luoghi, ove il tuono sia caduto; e quando anche se ne fosse ritrovata alcuna, potrebbe più facilmente credersi, che si fosse questa
for-

formata da una materia minerale fonduta da solfo acceso del tuono nella Terra istessa; che pensare di essersi detta pietra generata nell'aere, o nelle nugole, e slanciata col tuono.

Rimane una difficoltà, e si è, come il vento solforoso, che io ho supposto materia del tuono, possa tra le nugole, che son composte d'acqua, accendersi & essere compresso, senza estinguerli; perciocchè e sembra, che l'acqua di esse dovrebbe impedire al solfo, che non si accendesse, o per lo meno smorzarlo, essendo allumato.

Per rispondere a tal difficoltà, dico, che essendo il solfo di sostanza untuosa, non sia sottoposto all'azion dell'acqua, come le altre, e che possa egli in questa accendersi, e bruciarvi ancora, come la canfora, e molte altre materie solforose esaltate. Facilmente però puol esser avvenuto, che porzione di detto solfo si sia immerso in una molta quantità d'acqua, che forma le nugole, e che vi sia in quella estinto con una forte detonazione, simile appunto a quella, che produceli, qualora s'immerga nell'acqua alcuna materia solida roventata nel fuoco, contribuendo forse così al rumor del tuono; ma l'altra parte del solfo, la più sottile, e più disposta al moto, accresca tutta, si slancia fuori. Proverà questo mio ragionamento la sperienza, che mi concederà la Compagnia, che io faccia in sua presenza: ch'è questa.

In un recipiente di mezzana capacità, cui se li era tagliato il collo, mettei tre oncie di ottimo spirito di vetrinolo, e 12 oncie d'acqua comune, feci per poco riscaldare tal mescolanza, & in varie volte vi buttai dentro un oncia, o una, e mezza di limatura di ferro, che produ-

se sboglimento, con vapori bianchi: accostasi una candela accesa all'imboccatura del recipiente, e 'l vapore si mise in fuoco, e nell'istesso tempo se un violente, e lucido baleno: Molte altre fiata ancora l'avvicinal, e sempre avvenivano simiglianti baleni; comè prima, nel qual tempo sovente detto vaso riempivasi d'una fiamma, che penetrava, e circolava fino al fondo del liquore, e talvolta avea molta considerabil durata nel collo del recipiente.

In questa operazione vi son molte circostanze, che meritano attenzione; la prima si è, che lo sboglimento, quale nel buttare la limatura del ferro nel liquore avviene, nasce ella dalla dissoluzione, che si fa d'una porzion di ferro dallo spirito di vetriuo o; perche faccianli però i fulmini, e lo scioglimento più forte, è necessario di tramischiar l'acqua con detto spirito nella proporzion cennata; poicche se questo fusse puro, e non dissempato, e diviso per mezzo dell'acqua; le sue punte invero si attaccherebbero alla limatura del ferro, ma vi si strignerebbero, e premerebbero l'un contro l'altre in maniera, che il loro libero moto verrebbe impedito a far sufficiente azione, nè seguirebbe perciò il fulminare.

La seconda è, che devesi riscaldare un poco il liquore, per eccitar le punte del disciogliente, a penetrare il ferro; e produrre le fummigazioni; non è bene però, che 'l calor sia molto, perciocche i fummi molto velocemente ne uscirebbero, e quando si accosterebbe il lume, si accenderebbero questi nel collo solamente del recipiente, senza fulminare, qual con rumor si forma dalla resistenza, che incontra nel levarsi il solfo acceso sin dal fondo del vaso, e fa perciò molto sforzo, per romper l'acqua, e per disbrigarli.

La

La terza è , che necessariamente bisogna, che 'l solfo, qual sale in vapori, e s' infiamma, venga unicamente dalla limatura del ferro; poichè nè l'acqua, nè lo spirito di vetriuolo, ancorchè il più forte, come quello, che io ho adoperato, anno parti sulfuree, o infiammabili; il ferro sì, che ne ha molte, come ogn'un sa: questo dunque venendo rarefatto, e sviluppato dallo spirito di vetriuolo, si esalta in un vapore adattissimo ad essere acceso.

La quarta è, che i spiriti acidi del sale, del solfo, e dell' allume, producano in questa operazione l'istesso effetto dello spirito di vetriuolo; Lo spirito di nitro però, e l'acqua forte non eccitano affatto baleni.

L'operazione, di cui finora ho parlato, non è stata ella inventata solamente per la fulminazione, ma per la preparazione del sale, o vetriuol di Marte, così detto da Medici, che con istima fan uso: Se dunque si voglia trar profitto da quel che rimane nel recipiente, dopo la fulminazione, e' bisogna farlo bollire, seltrarlo, & indi farlo svaporare, fino allo scemamento de' due terzi, o de' tre quarti, per ritrarne indi in luogo fresco i cristalli; e li avrà il vetriuolo di Marte, che molto nella figura, nel colore, e nel gusto somiglia al vetriuol d' *Inghilterra*, quantunque sia più dolce, e senta più del ferro. E' egli buono aperiente, e la sua dose è da sei granelli fino a 20; se in maggior quantità si porga, suol muovere alcune nausee, non tali però, come l'ordinario vetriuolo produce.

Il vetriuolo di Marte propriamente è un vetriuolo naturale ravvivato; perciocchè lo spirito acido di questo, che n' era stato diviso dalla sua

terra per dissoluzione, entra con tale operazione ne' pori del ferro, lo scioglie, e vi si mesce; lo aggiungo a tutto ciò, che 'l ferro contiene un sal vetriolico attissimo a contribuire alla formazione di detto vetriuol di Marte.

Mettei in una Storta lotata 8 oncie di vetriuol di Marte, addattandovi un gran recipiente, e secondo è costume nella distillazione del vetriuolo ordinario, lo distillai, & n' ebbi 5 oncie, e 5 dramme di spirito acido chiaro, molto simigliante allo spirito di vetriuol comune, quantunque lasciasse sù la lingua un senso più astringente, e stitico: Tosto, che 'l recipiente si staccò dalla storta, sentissi un forte odor di solfo: giova detto spirito all' emorragie, & alle soccorrenze: Nella Storta io ritrovai una materia molto rarefatta, leggiera, e fragilissima, rossa, che solvevasi facilmente in bocca, d' un sapore astringente, che inchinava al dolce, quale è un bello, e buon croco di Marte aperitivo.

Mettei in un crogiuolo sù 'l fuoco un' alta porzion di vetriuol di Marte ridotta in Cristalli; la materia si fuse, svaporandone molta flemma, e vi rimase un vetriuol bianco, come avviene, qualora si fa calcina del vetriuol comune: Accrescei il fuoco sù di detto vetriuol bianco, & e' divenne rosso, come il Colcotar; donde può conchiudersi, che 'l vetriuol di Marte sia all' intutto simile al naturale.



O S S E R V A Z I O N I

SU LE SOLUZIONI, E FORMENTAZIONI,

*Che possin dirsi fredde, perciocchè si accompagna
no col raffreddamento di que' liquori,
ne' quali si fanno.*

DEL SIGNOR GEOFFROY.

* **L'**impiego, che io mi presi di, operando spiat la natura, e proprietà de' sali, allora che mi si concedè l'onore di essere ammetto nell'Accademia delle Scienze, mi ha fatte tentare molte sperienze, per esaminar le soluzioni di essi, e gli effetti, che le loro mescolanze con certi liquori producono.

Queste stesse replicate più volte, mi an dato luogo di osservar due cose, a mio credere, ugualmente importanti, e curiose.

La prima, che la maggior parte de' sali si sciolga in molti liquori, e li raffreddi, senza risvegliare sensibili formentazioni.

La seconda, che mal grado le formentazioni pronte, e violente, che seguono dopo la mescolanza di certi sali con alcuni liquori, pur tuttavia da essi non mai si scompagna un raffreddamento sensibilissimo del liquido, in cui avvengono.

Questi differenti effetti, che producono i sali ne' liquori, in cui si mischiano, mi fan dividere

I 4 In

* 21. Aprile 1700.

136 *Memorie dell' Accademia Reale*
in due Classi le loro dissoluzioni.

Nella prima comprendo i semplici scioglimenti freddi, cioè que'; che non sono uniti ad alcuna fermentazion sensibile, osservandosi solamente il raffreddamento del liquido; e nella seconda le fermentazioni fredde, o le soluzioni de' sali, con le quali si accompagna sensibile moto, e raffreddamento del liquore, in cui si fanno.

P R I M A C L A S S E

Delle semplici dissoluzioni fredde.

Versai in un Vaso una caraffa d'acqua comune, & immerli in detta acqua un Termometro ordinario di 18 dita, lasciandovelo per qualche tempo, affin di sperimentarlo; dopo di che egli si adattò a proporzionato grado della temperatura dell' acqua, buttai dentro di questa quattro oncie di sale ammoniaco, & il liquor del Termometro in men di un quarto d' ora calò due dita, e nove linee.

Rifeci indi detta sperienza col salnitro, e 'l cennato liquore si abbassò un dito, e tre linee.

Nell' istessa sperienza fatta col vetriuolo, il liquore discese presso a un dito.

Il sal marino lo fé calare sole 10 linee: E tutto il sale lentamente si sciolse, sicche questo parvemi il più difficile a solverli.

Tutti i sali alcali volatili, con la lor mescolanza raffreddavano l'acqua, abbassandosi il liquore del Termometro per alcune linee; osservai però, che a misura, che egli no più, o meno eran purificati, lo facevano più, o meno discendere: E' l' sal d' urina sembravami farlo più speditamente d' ogni altro.

1 sa-

I sali alcali lisciviati, non solamente non raffreddavano l'acqua, ma più o meno la riscaldavano, secondo che erano ben calcinati.

Sù di che bisogna avvertire, che detti sali (per riscaldar l'acqua) debbano essere puri alcali, perciocchè se niente abbiano della natura del nitro, o del sal marino, o debolmente, o affatto non la riscaldano, ovvero talvolta la raffreddano, come evidentemente fa il sal della Tamarice ricavato dal liscivo delle ceneri di tal pianta.

Il sale ammoniaco immischiato cogli acidi de' vegetabili, come è l'aceto distillato, il succo di limone, l'agresto, non ha dato alcun segno di fermentazione; ha sì infreddato molto detti liquori. Un oncia di sale ammoniaco posto in quattro oncie di aceto distillato, ha fatto avvallare il liquore del Termometro due dita, e tre linee.

L'istesso sale mischiato col sugo di limone, ha fatto calare il liquore intorno a due dita, e così ancora con l'agresto.

Ecco le mescolanze con de' liquori, che mi son sembrate le più osservabili per lo freddo, che an risvegliato; passiam ora a quelle, che si accompagnano con le fermentazioni.

SECONDA CLASSE

Delle fermentazioni fredde.

Il salnitro buttato nel suo spirito acido, ha fatto rilevar alcuni fumi, o vapori; e'l liquore del Termometro in tal mescolanza è calato quattro linee.

L'istesso sale mischiato con lo spirito di vetruiuolo, ha mossa maggior quantità di fummi, e fatto

to scendere detto liquore da sei in sette linee.

In queste due sperienze ho posta mezz'oncia di sale in 2 oncie di liquore.

Ho infuso in tre oncie di spirito di Vetriuolo mezz'oncia di sale ammoniaco; e 'l liquor del Termometro si è abbassato due dita 3 linee, essendosi da tal mescolanza alzati alcuni vapori più considerabili di que', che ordinariamente esalano dallo spirito di nitro solo.

In tre oncie d'olio di Vetriuolo ho versato mezz'oncia di detto sale ammoniaco, donde è nata una violenta fermentazione; rilevatafi considerabilmente la materia, svaporando molto, e 'l liquore si restringe, e 'l Termometro discese tre dita, e sei linee.

Avvertii, che i vapori, quali per detta mescolanza si elevavano, eran caldi, e facean notabilmente salire il liquor di quel Termometro, che io tenni sospeso al di sopra della materia; nell'altro però, che io tuffai dentro di essa, si abbassava, e dinotava un grandissimo freddo.

Il sal marino mischiato co' spiriti acidi, riscalda i liquori, invece d'infreddarli.

Mescolandosi con lo spirito di sale, fa salire il Termometro per alcune linee, senza notabil fermentazione.

Con l'olio di vetriuolo fermenta con rumore, & innalza molto fummo, il liquor si restringe, e forma una specie di *Congulum*, ovvero gelatina lucida. Il liquore del Termometro rialzasi molto in tal mescolanza, e 'l calore è sensibile al tatto.

Tutti i sali volatili alcali mescolati con differenti liquori acidi, producevano delle fermentazioni più, o meno forti, secondo l'acidezza di essi, e secondo il deputamento di detti sali da loro

gli

olii fetidi: Facean calare il liquor del Termometro; e l' *sal volatile* dell'urina più notabilmente di ogn' altro.

Un oncia di *sal volatile* di urina rettificatissimo in quattr' oncie di aceto distillato, risvegliava una fermentazion molta, e la materia rilevavasi con rumbre: Il liquor del Termometro discese, mentre fermentava, un dito, e nove linee.

Un oncia di *sal volatile* di urina in tre oncie di spirito di vetriuolo fermentò violentemente; & in questa il liquore del Termometro calò due dita, e 4 linee.

L'unione del *Sal di Tartato*, o di altri *sali fissi alcalini puri* con liquori acidi, risveglia delle fermentazioni con calore.

Ho fatte tutte queste sperienze con l'istesso Termometro in un tempo assai freddo, & in una temperatura d'aere molto uguale.

Per render di detta sperienza ragione, esaminò primieramente le semplici dissoluzioni fredde; & avendo con tutti i Fisici stabilito, che facciasi il freddo dalla diminuzione del moto; dico, che l' *raffreddamento*, che i *sali* cagionano nell'acqua, addivenga a mio parere, perche essendo le parti saline, senza moto, tramischiansi con quelle del liquore, sceminò altrettanto l'azion, e moto di queste, donde il freddo si produce, più o meno grande in esso.

Devesi qui osservare una cosa, e si è, che in qualche tempo, dopo fatta la soluzione, il liquor del Termometro risalga un poco; hocche puol' avvenire dal non poter la materia sottile, che abbondantemente scorreva tra le parti del liquido, trappelar queste coll' istessa libera quantità, opponendosi al valico per qualche istante le parti grosse.

lane del sale: Effendosi però divise a poco a poco dette particelle saline, avran riaperto il passaggio libero a dette materie, e cagionato perciò al liquore più moto di quel ch'è non avea su 'l principio del discioglimento; quantunque minore di quello egli si avea, mentre era puro, e senza mescolanza; poiche le particelle saline, abbenche disciolte, allentano un poco il di lui movimento.

Facilmente comprenderassi, perche i sali del liscivo puramente alcalini, e ben calcinati, come il sal di Tartaro, riscaldino il liquore, non che 'l raffreddano; se si ponga mente come detti sali nella forte calcinazione, che an sofferte; si siano ripieni di molte parti del fuoco, che come in prigione ritengono tra loro pori. Queste appunto nella dissoluzione di dette parti saline si mettono in libertà; e nell'istesso tempo, che dovriano le parti del sale frenare il moto delle parti dell'acqua, & infreddarla, dette particelle ignite attivissime accrescono l'agitazione di quelle dell'acqua, sino a riscaldarla assaiissimo.

Avverto inoltre, che 'l sale ammoniacò sia fra tutti i sali quello, che infredda più vigorosamente l'acqua, in cui sia disciolto, uguagliandosi tal freddezza a quella, che sentesi dell'acqua prossima a gelarsi: Et egli mi è una volta avvenuto, che sciogliendo una gran quantità di detto sale nell'acqua, alcune gocce, che gran cadute al di fuori del recipiente, in cui lo solvevo, si ghiacciarono, e 'l giro di paglia, su di cui egli poggiava, essendo bagnato per qualche tempo s'incollò al vaso di vetro per lo ghiaccio: E questo fu nella State, in un tempo molto caldo.

Molte altre volte dopo risentai la stessa spenzienza in varie maniere, e non mai mi venne fat-

to di riprodurre il ghiaccio. Il caso s'è apparentemente imbartermi in questa speranza, non che un infinitamente precisa proporzione tra 'l sale, e l'acqua; ma ancora tal temperatura dell'acqua, che io stimo necessaria, perche prontamente facendosi la soluzione, l'infreddamento perciò n'avenga più subito, e più grande: e questo appunto è 'l grado di temperamento, al quale io non ho potuto giunger mai.

La gran freddezza del discioglimento del sale ammoniac nasce dall' agevolezza, che egli ha nel discioglierli più di ogni altro; siccome la soluzione del sal marino difficile e molto lenta, è quella, che raffredda meno il suo dissolvente. Sembra dunque, che la prontezza nel solversi, sia la cagione di detto gran freddo.

Il sal ammoniac, com' e' si sà, è un gran composto di sal marino, e di sal d'urina, uno facilissimo, e l'altro difficilissimo a scioglierli.

Essendo le parti del sal marino, come imprigionati tra le parti del sal d'urina, avviene, che molte parti dell' acqua, penetrando prontissimamente le particelle saline dell' urina, perdano all' istante molto del loro moto, il quale altrettanto più mancherà, quanto che dette parti dell' acqua incontreranno appresso delle parti saline d' un' altra natura, la di cui resistenza è di maggior peso di quella del sal d'urina: Quindi nel primo istante della dissoluzione, il moto di una gran quantità di particelle acquose rallentatesi molto considerabilmente all' istante dal sal d'urina, e dal sal marino, produrrà in detto primo momento un freddo molto maggiore di quel degli altri sali, che non così facilmente son penetrati dall' acqua.

Potrebbe oppormisi, che essendo il sal marino

no il più difficile a scioglierli, do vrebbe la soluzione di esso ancora essere più fredda; illo che rispondo, che potrebbe ciò avvenire, se l'acqua prontamente penetrasse tutte le sue parti; la lentezza però, con cui ella opera (a cagion della tessitura stretta delle parti di detto sale) impedisce, che lo scemamento del moto nell'acqua sia sì pronto, e per conseguenza sì grande; quando che nel sale ammoniaco, venendo dette parti del sal marino slargate dal sal d'urina, i pori del sal alcali dell'urina son come tanti docci aperti alle parti dell'acqua, perche vadano a penetrare quelle del sal marino per infiniti versi.

Ripongo tra la Classe delle dissoluzioni fredde quella sperienza, che tempo fa il Signor *Homborg* sotto gli occhi della Compagnia pose; quali io credo, che non si avrà a male, se quì la ripeta; poicche serve ella a provare tutto quel che sinora ho detto intorno alla freddezza del sal ammoniaco; e per esser poco alla cognizion di tutti.

Si prenda una libra di solimato corrosivo, & un'altra di sal ammoniaco, riducendole in polvere divisamente, quali di poi, con infinita esattezza si mescolino, e riponghino in un recipiente, versandovi sopra tre libbre di aceto distillato: si agiti bene tutto, e così tal mescolanza infreddasi talmente, che 'l vaso a gran pena nella State può tenerli tra le mani. Alcune volte all' istesso Signor *Homborg* è avvenuto, che facendo tal mescolanza in gran quantità, la materia se li sia ghiacciata.

Noi vediamo in questa sperienza un infreddamento maggiore di qualche dal sal ammoniaco solo nell'acqua comune si fa, e questo prodotto dal solimato corrosivo, il quale solo, o affatto, o pochissimo si discioglie nell'aceto di distillato: Sicche

le

le parti fluide di questo, avendo all' istante penetrate le parti del sal ammoniaco, e perduto con ciò molto del loro moto; intrigandosi indi tra pori di un corpo, che non possono sciogliere, non essendo valevoli a ciò, finiscono di ivi perdere quella picciola attività, che loro era rimasta, e si fissano o tutte, o nella maggior parte; donde addiviene il gran freddo, che noi vi sentiamo.

Sinora ho solamente resa ragione delle semplici soluzioni fredde saline, nelle quali non si osservava sensibile accrescimento di moto; passiamo ora a quelle della seconda classe, cioè alle fermentazioni fredde, nelle quali si osserva questo con l'agitazione delle parti del liquore.

Per spiegar tali fermentazioni fredde, con tutti i Fisici io stimo, che 'l freddo, e 'l caldo ne' liquori addivengano dal maggiore, o minor moto delle picciole parti di esso, che fatti dal continuo scorrere della materia sottile tra gl'interstizj, quali tra parti, e parti rimangono: & io dico, che quante volte venga a scemarsi tal movimento, e s'interrompa il corso alla materia sottile; il liquore ci sembrerà men caldo, o più freddo.

Ciò posto, se si avverta a qualche avvenga nelle fermentazioni fredde, noi osserveremo per una parte delle congelazioni considerabilissime in molti liquori, & un addensamento sensibilissimo di essi; da un' altra parte vedremo una violentissima agitazione di alcune particelle di detta mescolanza con esalazione vaporosa, gonfiarsi la materia, e bulicando, levar quantità di bolle, e fermentar con rumore. Ecco come immagino, che tutti questi effetti possan esser prodotti.

Nella mescolanza, ch'io fo de' sali con liquori acidi, congelandosi la maggior parte del liqui-

do con una porzion di sali, i di lui moto è perciò scemato notabilmente; ma non potendosi rappigliare dette parti, senza arrestare, o indebolire il corso della materia sottile; quest' istessa incontrando chiusi i suoi valichi, rivolge il cammino per quegl' interstizj, che rimangono tra le parti rappigliate, per qual il passaggio è ancor libero; e poichè vi accorre in quantità, risveglia ivi considerabilissima agitazione nelle parti, che incontra, in volendo passare.

Quest' agitazione appunto è quella, che dicesi fermentazione a noi visibile; & è quella ancora, che muove dette bolle d'aere & i fumori, rileva, e gonfia la materia con violenza, altrettanto maggiore, quanto che essendo tutte le parti mezzo rappigliate, si oppongono al moto, & all' agitazione delle piccole particelle della materia.

Frattanto detta agitazione, tutto che al a veduta violenta, non è però valevole a rompere interamente il *Coagulum*, che si forma nel liquore, & in conseguenza a vincere il freddo, che si produce per detto congelamento: Alla fin fine tutto quello, che ella può fare, si è, mantenerla ancora in una certa spezie di fluidità. In fatti quanto più tali mescolanze son disposte a congelarsi, risvegliano maggior freddo, come avvenir vediamo in quella del sal ammoniaco coll'olio di vetriuolo, nella quale il congelamento divien sì forte, che alla fine sopra del liquore si forma una crosta salina molto densa.

Nella mescolanza degli altri sali con acidi più spossati, siccome in quella degli altri sali volatili con lo spirito di aceto, il congelamento, quasi che mai è sensibile, e 'l freddo meno considerabile degli altri.

Aggiungo inoltre, che non essendo universale l'agitazion violenta, che tal mescolanza produce, facendosi in pochissime parti del liquore, possa contribuire ancora al grande infreddamento, che si avvisa in mescolando il sal ammoniaco con l'olio di vetriuolo, accrescendosi il *conglum* altrettanto più; quanto che le picciole parti, che son violentemente agitate in tal mescolanza, non potendo trar seco, e smuovere le parti congelate, disadatte a ciò per la loro grossezza, le allontanano dal centro del loro movimento; sicche dette parti mezzo rappigliate, ritrovandosi fra questi piccioli gironi compresse l'une contro le altre, si stringono, più; e si rappigliano ancora più strettamente, e perdono il loro intero moto, donde faisi il grandissimo freddo.

Se durati fatica, a persuadersi, che l'agitazion violenta, che in alcune parti della mescolanza avviene, possa contribuire al raffreddamento del liquore; l'esperienza, che siegue la scemerà, convincendo chi che sia.

Posi in un gran Bacino dell' acqua fredda, & nel mezzo di questa immerfi una cucurbita di vetro piena di acqua ugualmente fredda, & in detta cucurbita all'ogai un Termometro sensibilissimo, che per lungo tempo vi lasciai, per isperimentarlo.

Quando egli si rassettò al grado proporzionato alla freddezza dell' acqua, prontamente buttai nell' acqua del Bacino quattro, o cinque padelle di bracia ben accesa, & all' istante il liquor del Termometro discese da due in tre linee: dopo alcuni momenti detto liquore risalì, quando il calor dell' acqua del Bacino si comunicò al vaso di vetro.

Il raffreddamento dell' acqua della Cucurbita non può risondersi ad altro, che alla compressione,

o condensazione pronta, che 'l fuoco risvegliò nell' acqua, in cui fù immerso, e questa può spiegarsi in sì fatta maniera.

All' istante che i carboni accesi furon buttati nell'acqua, il girone della materia sottile, da cui eran essi cinti, venendo compressi dall'acqua, che lor circondava, con violenza ismosse tutte le parti di detta acqua: Facendosi questo dilungamento tutt' insieme in più parti dell' acqua del Bacino intorno al vaso di vetro, tutte le parti, che circondavano detto vaso, essendo in una fiata tutte compresse per ogni verso, an dovuto condensarsi considerabilmente; quindi detto vaso ritrovandosi nel centro della pressione, ha sofferto tutto lo sforzo di essa, come il liquore ancora, che conteneva, il quale per tal condensazione perdè molta parte del movimento del liquido, che seco avea: Locchè fù considerabile, a segno, che se calare il liquor del Termometro. Tal freddo passa all'istante, perciocchè venendo a riscaldarsi assaiissimo tutta l'acqua del Bacino, tosto si comunica a quella della Cucurbita.

Per la lentezza de' Termometri ordinarij nell' indicar sensibilmente l'infreddamento dell' acqua, in tale delicata sperienza, mi è convenuto adoperare quest'altro sensibilissimo, il quale è formato da una palla di vetro, che ha la sola apertura del doccio molto sottile, e molto stretta, qual cala fin quasi al fondo della palla immerso in un liquore, che nel fondo di essa, rimanendo tutta la rimanente ampiezza piena d'aere, quale, rarefacendosi, comprime il liquore, e fa salire nel picciolo cennato doccio; & addensandoli, dà luogo alla calata di esso. Questo Termometro è più sensibile d'ogn'altro; perciocchè l'aere, donde egli si muove

rarefassi al caldo, e nel freddo si addensa più prontamente di ogn' altro liquido.

Non sarà molto difficile di penetrar la cagione del calor sensibile de' vapori, quali s' elevano dalla mescolanza del sale ammoniacco con l' olio di vetriuolo, se si ponga mira, che detti vapori non sian altro, che le parti più sottili, e più attive smosse, & innalzate dalla materia sottile, che traversando per detta mescolanza seco porta. Il moto di queste parti si fa libero nell' aere, dove non è più dalle parti congelate molto grossolano ripresso; e diviene altrettanto più violento, quanto che sono state trattenute esse, e costrette per alcun tempo; come dimostrasi per lo calore, che è l' ordinario effetto di tutti moti rapidi, e violenti.

Recardò ancora una molto considerabile esperienza su la fermentazion fredda, risvegliata dalla mescolanza del sal ammoniacco, e dell' olio di vetriuolo.

Se dopo di aver mischiati un oncia di sal ammoniacco con quattro oncie di vetriuolo, vi si versi sopra un cucchiajo di acqua comune, mentre la fermentazione è più forte, il freddo più grande, e 'l Termometro cala con maggior velocità; cessa detta fermentazione, e 'l freddo cambiafi prontissimamente in un molto considerabil calore, donde il Termometro fa molto salire il liquore.

Facilmente si comprenderà la ragione di questa esperienza, se riflettasi, che si riscaldi l' acqua prontissimamente, e moltissimo con l' olio di vetriuolo, e che produca quì l' istesso effetto, cioè un calore molto grande da poter distruggere il freddo delle parti congelate: essendo per altro l' acqua di per se propriissima a scogliere tal congelamento.

Dovrei ancora render ragione, perche il sale marino si riscaldi con differenti liquori acidi; ma bisognerebbe perciò disaminar la natura di detto sale, che molto ne farebbe dilungare.

Prima di finire, dirò solamente, che non ho io preteso di fare una dinumerazione esatta di tutte le dissoluzioni, e fermentazioni fredde: Ho fatto il rapporto solamente di ciò, che le sperienze da me fatte sù de' sali, e liquori, de' quali facciam maggior uso, e che mi sono sembrate le più considerabili per i loro effetti, m'an prodotto.

D'ELL' USO MEDICO DELL' ACQUA DI CALCINA.

DEL SIGNOR BURLET.

E Ssendosi considerata sempre la calcina, come un mistio ripieno di particelle di quel fuoco, che distrugge, e consuma i corpi, ne quali può far violenza; appena adoperavasi in Medicina in alcuna composizione di local rimedio, o seccativo, ovvero consuntivo, quali erano le pietre da' Cauterj, e le acque corrosive, le lavande, & unzioni per le vulcere sordide, e per le gonorrree &c.

Interiormente non faceasene uso, sù 'l timor, e credenza, che in forbendo un rimedio ricavato dalla calcina, farebbe lo stesso, che bere il veneno: Sino a questi ultimi tempi, in cui l'acqua di essa
pre-

1700. 24. Aprile.

presa interiormente è stato stimato un' eccellente rimedio, del quale molti celebri Autori si son serviti per infinito numero di malattie.

E' sembra, che dopo l'ipotesi dell'Acido, e dell'Alcali, e dopo le differenti sperienze fatte nella Chimica su l'Analisi de' corpi misti, siasi cominciato a tentar l'uso di ber l'acqua di calcina; E *Willis* è un de' primi Autori, per quel che io so, che ne ha scritto.

Io istordj, quando in Olanda sentj da un Medico, che me l'affermd, come impiegava egli per ogni settimana più di 60. libbre di acqua di calcina, qual dava a bere a suoi Malati in varie guise trasformata; e che era questo uno de' migliori alterativi, che vi fusse nella natura, per la maggior parte delle infirmità Croniche; e che bisognava ricredersi pure, che detta acqua non fusse così caustica, e seccativa, come immaginavansi molti di coloro, che non ne avevan fatta esperienza.

La probità, & abilità sperimentata di colui, che mi facea rapporto di tal rimedio, non contribuiron molto a tormi lo scrupolo, e timore; che io avea di detta acqua; tanto più dopo, che mi fu comunicato, che alcuni Bovi assetati, passando vicino la *Louvre*, ove fabricavasi, & eravi un fesso pieno di calcina spenta, vi si erano fermati, & avean bevuta l'acqua, che soprannuotava alla calcina, onde ne eran poco tempo dopo morti.

La speranza ancora de' Vini adulterati con la calcina, donde divengon essi più fumosi, quali alterano, e riscaldano coloro, che ne bevono, fino a renderli infermi, mi avea sempre fatto riguardar l'uso interiore di dett'acqua, come dannoso, e temerario. Cercando dunque a ricredermi insensibilmente dalla forte prevenzione, in cui io era, con-

tro di tal bevanda, cominciai ad istruirmi a fondo di tutto ciò, che si atteneva alla calcina, & all'acqua di essa; mi studiai a rinvenir le occasioni da servirmene, per avverare le sperienze comunicatemi, e quelle, che avevo lette in alcuni Autori: & eccone al verò tutto ciò, che hò io osservato sù di essa, e sù dell'acqua nell'uso, che ne feci fare a molti Ammalati, tanto in *Olanda*, mentre i' vi stiedi, quanto in *Parigi*, dopo il mio ritorno.

Non ogni calcina è ugualmente buona per farne l'acqua: In *Olanda*, siccome in molte altre Province Marittime, si servono delle Conchiglie ragunate su 'l lido del Mare, per farne calcina, della qual materia si servivano ancora a tempi di *Dioscoride*: Ma questa non è di buon uso in Medicina, essendo molto ghiajosa; e l'acqua fatta con essa, per molto, che si feltri, dipone sempre una spezie di melma, nè conservasi per lungo tempo, & ha un senso meno stitico, e più dolce, & è ancora più scipida, e più greve allo stomaco dell'acqua, che si apparecchia con la calcina di pietra, quale da *Liege*, e da molti altri luoghi di *Fiandra* vien portata in *Olanda*.

La pietra, che più ordinariamente adoperasi, per far la calcina, in quasi che tutti i Paesi, è una spezie di roccia, o pietra dura, che tiene il nome di pietra per calcina: Se ne fa parimente dal Marmo, e da tutte altre pietre, fuorchè dal Tufo, da picciole felci, da pietre sabbionose; perciocchè queste, essendo composte da piccioli granelli uniti, & insieme incollati, il fuoco li divide, e disgiunge, senza penetrarli per tutti i versi, e senza ridurli in calcina.

Quanto più questa è di fresco fatta, in più grosse pietre, meno esposta all'aere, conservata in
luo.

luogo più asciutto, che men si fende, e sgretola; tanto è migliore per farne l'acqua.

Questa si fa, versando sei libbre di acqua piovana calda su di una libra di calcina viva, lasciando, che si spegna bene, e si disciolga per 24. ore, indi si feltra l'acqua per carta griggia, se così aggrada.

L'acqua calda, e soprattutto l'acqua piovana scioglie, penetra, e spegne migliore la calcina, che l'acqua fredda comune.

L'istessa calcina può servir due volte, rimettendovi sopra l'istessa quantità d'acqua; ma la prima è la più forte, e la migliore in alcuni casi.

Se voglia farsene uso per la terza, l'acqua ne vien quasi insipida, non ritenendo cosa della calcina.

Questa istessa, dopo molte liscive, può esser di nuovo calcinata, e scompartisce all'acqua l'istessa qualità di prima.

Il sapor di dett'acqua è acre, stitico, tramischiato d'algun dolcior scipido.

Non soffre facilmente esser'ella mescolata con altri liquori; fermentando qualche con tutti i siroppi; e molto più, ove siavi un picciolo sentor di acido per cui viene a turbarli, e fare una spezie di Precipitato.

Non farò quì l'Analisi della Calcina, nè delle pietre donde fassi, nè replicherò tutte le sperienze in presenza della Compagnia fatte su l'acqua di essa, potendo ciascun'appararle dalle Memorie dell'Accademia: Recherò solamente gli effetti, ch'ella nelle malattie ha prodotti, nelle quali l'ho io stesso adoperata, o veduta praticar da altri, e le differenti composizioni de' remedj, co' quali si è tramischia-
ta.

Ne' saggi, che fanfi de' rimedj sospetti, non comunemente posti in uso, & universalmente approvati, richiede la prudenza, che si diano essi in picciole dosi, mischiandoli ancora, per quanto possa farsi, con altre cose, che in alcun modo tengan luogo di correttivi; Quindi è, che io cominciai a servirmi dell'acqua di calcina; unendola a freddo con ugual parte di latte Vaccino, addolciti con un poco di Molchiara sciolta, la feci prendere a due Infermi, uno Asmatico, e l'altro Disenterico, tutti e due Ollandesi Giovani, e di complession forte, al peso di 9 oncie per giorno, cioè tre oncie per ogni quatt'ore a ciascheduno. Nel secondo giorno ricevè il Disenterico qualche sollievo, non rendendo più sangue, e frattanto il di lui ventre senza dolore distendevasi; nel quarto giorno patì un vomito, a cui precedè alcuna nausea, e recè quantità di materia sierosa, immischiata con parti bianchiccie, come calcina; nel giorno appresso lo purgai col tartaro emetico, e dopo questo feci proseguir l'uso per quattro altri giorni dell'istess'acqua, donde non menò più il ventre, arrestandosi intieramente, e rallentandosi con intiera guarigione.

L'Asmatico al terzo giorno ebbe sì fatta gran nausea, lagnandosi di un peso molto grave su lo stomaco, che fui costretto a non farli proseguir detto rimedio, e rimetterlo nell'uso del vin d'*Alicante*, e della Birra d'Assenzo; ma poicche il gonfiamento delle sue gambe di giorno in giorno si facea maggiore, sino a screpolar la pelle, sentì da quello notabil sollievo, respirando con molta maggiore agevolezza; donde io prendei l'occasione di ripurgarlo, e darli di nuovo l'acqua di calcina, quale, perche e' non ripugnasse, trasformai con decozione di salza, d'anisi, di cannela, & un
poco

poco di assenzo, in vece del latte. Dopo otto giorni dell'uso di essa, sentissi molto migliore l'Infermo, e continuando non solamente a berne, ma a lavarsene le gambe, guarì egli fra lo spazio di un Mese.

Avendo letto in *Willis*, e *Morton*, & in qualche altro Moderno Autore, che l'acqua di calcina si fusse un'eccellente rimedio per le fresche Tifi, e per le Scrofole, io ne feci la sperienza in queste due Malattie: Il Tifico, a cui primo io la diedi mischiata col latte, e dopo con una decozion pettorale, fatta secondo la ricetta di *Morton* con la salza, e l'uve passe di *Corinto*, ne ricevè alcun sollievo, essendoseli rattenuta un poco la soccorrenza, che egli avea; per sei giorni però, che e' ne prese sole sei oncie per giorno in tre fiate, lamentavasi molto della nausea, e del mal di stomaco: Era egli ancora più dell'ordinario riscaldato, perlocche lui feci dismetterne l'uso, e ripigliar semplicemente il latte di Capra, & i brodi di riso, che lo fecero sopravvivere alcun'altro Mese.

Un'altro Tifico di circa 30. Anni, che spessissime volte avea sputi di sangue, & era già dimagrito, la bevè per un Mese, senza interrompimento, al peso di otto oncie per giorno: a costui se l'arrestò il sangue, e scemosseli un poco la tosse; la febre lenta però, la magrezza, e la nausea non si rimasero d'affiggerlo, finche ristuccato, non volle più usarla: un Medico di *Liege* l'inviò alle acque di *Spa*, e mi fu avvisato, che alcun tempo appresso e' se ne morisse.

A due Figlioli di dieci in dodeci Anni, che avevano il mal delle Scrofole, feci prendere nell'istesso tempo dett'acqua; Uno le pativa in tutti e due i lati della gola, & erano da più d'un'Anno ulcera-

te;

te; l'altro avea un sol tumore nel braccio, da non molto tempo aperto, riputato Scrofoloso da tutti i Medici, che l'avevano osservato: Ne bevvero essi fino a 16, o 18 libbre in men di 30 giorni, dandone a ciascheduno per giorno poco più di mezza libbra in una libbra d'un'orzata composta con la salza, falso frasso, radice di scrofolaria, e liquirizia, e lor costringevo a tracannarne tutto il beveraggio, senza lasciarne goccia: Fui sorpreso al vedere, che'l primo di là ad alcun giorno era caduto in quella nausea, che avevo osservata negli altri Infermi, qual'impediva il proseguir l'uso di detta bevanda per i 30. giorni divisati, se loro non faceva prendere di volta in volta fettoline di pane arrostito nel vin di *Alicante*, o di *Canarie* intinte, & un poco di Teriaca nel mattino: Il secondo ebbe verso il decimoquinto giorno uno sbocco di sangue dal naso, che lo smunse; l'ulcere però se veduta di molto disseccarsi; ma nè l'uno, nè l'altro guarì del male. Comunicai tosto queste sperienze a colui, che mi avea cantate maraviglie dell'acqua di calcina; donde si mosse egli ad aprirmi il segreto, che era riposto nella maniera, in cui egli le più volte più la dava, & ad istruirmi di tutte le differenti mescolanze, che ne faceva in diverse malattie.

Riguardava egli dunque detta acqua, come un potente alterativo, o come un puro alcali, capace di rintuzzare, e struggere li fermenti acidi, principj di tutte le Ostruzioni, e cagione ordinaria di quasi che tutte le malattie Croniche. Il principal uso erasi nella Cachessia, nell'Iterizia, nell'Ostruzioni della Milza, e del Fegato, nella Scorbutto, e nell'Idropisia, &c. La mischiava tal volta con semplici alterativi, & altra con purgativi, sovente però con la tintura de' metalli, rimedio molto fa-

milia.

miliare in Olanda , in *Allemagna* , & in tutto il Settentrione, quale vien guardato come un segreto, quantunque sia egli descritto in un libro, che ha per titolo *Chymia Rationalis*, impresso in *Leide* nell' Anno 1687. in quarto.

Questa tintura si fa con lo Stagno, il Rame, alcuni vi aggiungo l'Oro, e col doppio del Regolo di Antimonio Marziale fonduti insieme: Nasce da ciò un'ammasso metallico, cui alcuni Chimici han dato il nome di *Electrum Minerale*: Riducesi detta massa in polvere, indi a forza di Nitro, e di carbon polverizzato, dopo molto e lungo scoppiettare, si fa di essa una spezie di scoria, il di cui colore inchina al verdegiallo, quale ancor calda si polverizza, e mette in digestione in una certa quantità di spirito di vino, o di Ginepro, che tinge ella di un maraviglioso rosso.

In due libre di acqua di calcina soglion infondervi due, o tre oncie di questa tintura, e dar sei oncie per giorno di tal bevanda a Scorbutici, & Idropici; qual rimedio apre molto le vie dell'urina, & è un gran dissolvente.

Se in quattro oncie di acqua di calcina, & in altrettante di tintura de' metalli unite, s'infondano un'oncia in polvere d'aloë, e due grossi di limatura di acciajo, per 40. ore, formano un'eccellente remedio per l'itterizia. A detta mescolanza, se si aggiungano tre dramme di Refina di Sciarappa, si ha un propriissimo purgante per l'Idropici, facendone a questi prendere per ogni due giorni due Cucchiaj in un brodo, o in una tazza del sugo di Cavoli rossi.

Nelle febri intermittenti lunghe, come nella Quartana, l'acqua di calcina con alcune gocce della tintura mischiata con la Chinachina, rendon più

più sicuro l'effetto di tal febrifugo.

Ho veduto in *Olanda* con felici successi praticarsi tutte queste mescolanze: L'aere di tal Paese freddo, e paludoso, l'uso della Birra, la molta quantità de' Butirri, del formaggio, e del Pesce, di cui si nutricano la maggior parte degli Abitanti, contribuiscono insieme a rendere il loro sangue molto crudo, meno scorrente, & in conseguenza più proprio ad arrestarsi ne' piccioli vasi, ad ingrarsi, e cagionar le Ostruzioni; donde tutte le Malattie, pocanzi avviate, addivengono. Non senza ragione sono in sì gran uso i rimedj alteranti in tal Paese, e che l'acqua di calcina, quale assorbendo, e sciogliendo opera, e la tintura de' Metalli attivissima, e penetrantissima, producono effetti così buoni nella maggior parte delle infermità, nelle quali si adoperano.

Non mi è avvenuto intieramente di osservar gl'istessi effetti nel mio ritorno in Parigi, quando mi cadde in pensiero di tentar li medesimi rimedj così mischiati; quantunque le malattie niente differissero da quelle di *Olanda*; forse perche la cagione non era affatto simile, e l'aere, che quì si respira, gli alimenti, di cui ci nutrichiamo, i vini, che si bevono, rendano il nostro temperamento più attivo, e'l sangue men crudo, nè sì grossolano; ond'è, che la nostra Medicina è molto differente da quella, che in detti Paesi si pratica; e che raramente vediam riuscirci tutte le preparazioni Chimiche di rimedj alteranti cotanto vantati, ne' libri de' Medici *Olandesi*, & *Allemani*, quali siam costretti sovente apparare, per non farne uso affatto. La tintura de' metalli mischiata con l'acqua di calcina, non incontrando nella maggior parte de' nostri corpi una flemma grossolana, & un san-

gue

gue vappido, fu de' quali faccia azione, rintuzzandosi da queste la grande attività loro, divengono molto corrosive, pungono le fibre dello stomaco, e risvegliano delle grandi fermentazioni nel sangue: Un buon numero di sperienze da me fatte mi rendon ciò fermo; e quantunque i Partigiani di tal tintura n'assicurino del contrario; io però sempre la stimo in tutti i Paesi ugualmente acre, e corrosiva all'infinito: E' ella una soluzione delle parti saline, e solforose dell'antimonio, e dell'alcali fisso del nitro, senza affatto porzion metallica di rame, o di stagno: Il sal di tartaro, e'l nitro calcinato insieme tingono dell'istessa maniera lo spirito di vino, e gli effetti, quali che tutti sono i medesimi; ond'è, che dopo questa osservazione non mi son più servito con efficacia della pretesa tintura de' metalli, se non che nelle malattie di crudità, e d'ostruzioni, e ne' corpi flemmatici, senza mischiarla con l'acqua di calcina; ma semplicemente dandola sino a 50, o 60 goccie nel brodo, o unendola ad alcun purgativo, secondo le formule, che recherò qui basso, sempre però in una dose mediocre.

Per l'acqua di calcina non saprei bastantemente dire, come siamene io servito; in vece però di 6 libbre d'acqua sopra di una libra di calcina, ne feci mettere sovente otto, e l'esse volte ho adoprata la seconda acqua in molte occasioni, preferendola alla prima.

Sin tanto, che ho potuto dar dett'acqua mischiata a freddo col latte di Vacca, d'Asina, e di Capra sino a 8, o 9 oncie per giorno, ho preferita questa maniera a tutte le altre; e quando gli Ammalati non han potuto soffrire il latte, ne ho io formata la seguente orzata pettorale poco differente

te da quella, che 'l Signor Boyle descrive nel suo Trattato *De Specificis*, che tanto commenda, come uno specifico per l'Asma, e per le Malattie disseccanti.

Prendete otto libre di buon'acqua di calcina, infondetevi a freddo quattro oncie per ciascheduno, di sasso frasso, di anisi, e di liquirizia; e di mezza libra di uve passe di *Damasco*, o di *Corinto*: La dose è di quattro, o 5 oncie, due volte per giorno; quantunque io ne abbia date sino ad otto; con effetto molto salutare.

Posso con sincerità affermare dal molto uso, che io ho fatto dell'acqua di calcina in tante, e sì differenti malattie, che spesso mi sia venuta meno, e'l suo effetto non abbia corrisposto alle speranze, che io teneva, come di tutti altri eccellenti rimedj avviene; ma che giammai ella mi abbia prodotta cosa dannevole, e pregiudiziosa agli Ammalati; e che quantunque sospetta ella si fusse a molti, e di un nuovo uso; pure in *Francia* non siasi lasciato di praticarla, & oggi giorno da gran numero di Medici con profitto si adoperi.

Il Signor *Spon*, nel suo libro *Aphorismi novi* pag. 415. avverte, sù 'l luogo, dove Ippocrate commenda per la lepra, la rogna, e 'l prurito, le lavande dell'acqua di calcina temperata, che ella, come un vigoroso rimedio balsamico, assorbendo domi, & ammortisca potentemente gli acidi; che si converga non solamente a tutte le ulceri esteriori, bagnando, e lavandole con essa; ma alle interne ancora, alla Tife, & alla Disenteria, col beverla; e che tal rimedio ce l'avea comunicato il Signor *de la Closerie* Medico celebre in *Xaintonge* in *Gascogne*.

Questo discorso ristuccherebbe, se io venissi al minuto di tutte le osservazioni fatte sù l'uso, & ef-

fet-

fetti di detta acqua ; che però ne reco solamente le principall , che comprendono quasi che tutte le altre .

L'acqua di calcina spessissime volte reca nausea, & indebolisce tosto gli Ammalati , raffreddando loro lo stomaco , se è lecito di così dire ; ond' è , che convien talvolta dar del vin di *Alicante* , o di asenso , e la Teriaca , come , in facendo parola de' primi Infermi avvertj .

Ella dissecca , e fa dimagrire .

Alcune volte produce alterazioni , e sofferma il ventre , apre molto le vie dell' urina , e spesso quelle del sudore .

Non conviene ella dunque , qualor si osserva l'appetito debile , o nausea , e molto meno l'estrema magrezza , nè qualora vi è stitichezza , o alterazion febrile .

In tutte le piaghe interne , & esterne , fa ella ottimo l'effetto mischiata col latte , o decozioni balsamiche .

Ferma ella i sbocchi di sangue , le soccorrenze , le disenterie , i copiosi mestrui , i flussi bianchi , e si conviene a tutti rilasciamenti di vasi , sino alle gonorree .

Perciò non è bene di adoperarla ne' tempi dell' evacuazione necessaria , come de' mestrui , dello morici , e de' benefizj del ventre , che supprimebbele .

In tutte le ostruzioni , ne' tumori interni , che non son degenerati in Scirri , o in Cancri , è ella un buon remedio , siccome per le scrofole , qualora non sian invecchiate .

Per produrre ella de' buoni effetti nelle malattie , deve essere continuata per lungo tempo , come di tutti gli alterativi si pratica .

Mi-

Mischiata col latte nol fa rappigliare, e rende con ciò l'uso più facile a coloro, che soffriscono gli acidi, e che non si acconciano sì agevolmente a tal nutrimento.

Unita a' purganti, com'è l'aloe, la scamonea, la gialappa, accresce la virtù loro solutiva.

Tutti questi effetti di essa bastantemente provano, che 'l principio, donde ella opera, sia una materia alcalina terrestre, molto attenuata, & affottigliata dalla calcinazione, e resa sufficientemente leggiera, per tenersi sciolta nell'acqua, e comunicarli quel sapore acro stitico, che si sperimenta.

Si è detto sopra, che dopo due, o tre lavande, l'acqua, che indi si trae, sia affatto insipida, non essendovi rimasto nella calcina altre parti, che le molto grossolane, e gravi, da non potersi mantener a nuoto, e sospese nell'acqua; donde è, che calcinandoli di bel nuovo, acquistino elle quel grado di leggerezza, e di sottigliezza, che fa poi gallar in essa, e lei comunicare le divise proprietà.

Egli è molto probabile, che non vi rimangano particelle di fuoco in detta acqua, o che se pur ve ne siano alcune, il picciolissimo lor numero, fa supponerle racchiuse in alcune particelle indissolubili della calcina; poicche egli è pur fermo, che l'acqua a proporzion, che s'insinua, e penetra ne' pori di essa, apra, e sprigioni dette parti ignite ristrette ivi, le quali per lo rapido lor moto, si levano a volo, scappando fuori, e così producono quel boglimento, e quel calor sì sensibile, che si sperimenta. Ma poicche questo calore, e boglimento scemano a poco a poco, sino

ad intieramente cessare , quando la calcina è sciolta bene , e perfettamente spenta , dee crederfi , che dopo alcun tempo siali fatto l' intiero svaporamento di dette particelle del fuoco ; e che l'acqua , che sen ricava , sia solamente impregnata di alcune particelle terrestri le più leggiere , come si è detto , e le più solubili , quali son sommamente alcaline , & a cui molto verisimilmente devon risponderli tutti gli effetti delle proprietà di essa .

Io sò , che questo spiegamento non soddisfacia intieramente ad alcuni Fisici , che protrebbon richiedermi , che io diterminassi per lo meno quel che intenda per particelle focose , credute nella calcina ; se sia egli un solfo , ovvero la materia del primo elemento , che scappando dal fuoco con empito nell'atto della calcinazione , venga ad esser ritenuto , e quasi imprigionato tra le porosità della calcina ; o se sia un sal proprio di detta calcina , o che si supponga nella pietra , prima di esser calcinata , quali abbia il fuoco esaltato , e disbrigato dalle parti grossolane ; o il sale istesso del legno , e del carbone reso volatile dal fuoco , che abbia in fine perduto a poco a poco il suo moto , incontrandosi con le parti della Pietra più terree , nelle quali si fusse intrigato ?

Qual ultimo sentimento ha i suoi Partigiani : perciocchè riesce loro molto difficile l'immaginare , come particelle di quella sottigliezza , e moto , qual sono esse , che formano il fuoco , comunque si voglian mai chiamare , potrebbero fermarsi nella calcina , senza svaporare ; e perchè , se vi rimangano , l'acqua le rimette in libertà ; e lo sprigionamento , con tutto il di più da me poc' anzi detto , non loro par che abbiano molto del verisimile : Credon dunque , che nella calcina

Memor. 1700.

L

più-

piuttosto vi si restringa un sale, da qualunque parte mai e' venga, e propongono molte ragioni, & esperienze, che quì non recherò, le quali sembrano in qualche maniera probabili: Frattanto di qualunque natura si voglia supponer detto sale, o alcali volatilile, o acido vetriolico, e per molto vantaggiosa, che apparisse tale ipotesi, per lo spiegamento dell' effervescenza, che si accompagna con lo spegner della calcina, e con le altre proprietà dell' acqua di essa, dimando io, ove son le pruove, e la dimostrazione dell' esistenza di tal sale? Quantunque intrigato, ch' e' si supponga nelle parti terrestre della calcina, perche non può ricavarli, o con la distillazione, o con lo svaporamento? Già tutti sanno, che per qualunque verso non possa mai tirarsi dalla calcina, e dall' acqua di essa un principio salino, ma solamente un' accozzamento di parti terree alcaline, le quali niente differiscono da tutti gli altri nostri alcali terrei, che come la calcina, sciolti in una certa quantità d' acqua, e dati a bere, rompon sovente l' appetito, rintuzzando ben le punte del disciogliente stomatico, arrestano l' emorragie, impediscono il rappigliamento del latte &c. assorbendo gli acidi, e rendendo il sangue più sciolto, e più scorrente; che in una parola son capaci di produrre tutti i medesimi effetti pur or divisati dell' acqua della calcina; senza ch' i' venga astretto per ispiegarle, di ricorrere ad un sale, dell' esistenza di cui dovrebbe per lo meno avere sensibile dimostrazione.

In qualche altro giorno potrò diffondermi sù lo spiegamento degli effetti di quest' acqua, comunicando alcune osservazioni fatte sù gli alcali terrestri, che sono in uso nella Medicina, e che più si accostano a la quantità della calcina. ESTRAY-

E S T R A T T O D E L L E D E S C R I Z I O N I ,

Che Pifone, e Marcgravius an date del Caa-apia, e confronto delle radici di Caa-apia, e d' Ipecacuana, così grigia, che bruna, con la descrizione di esse, donde sensibilmente si vede la differenza tra 'l Caa-apia, e l' Ipecacuana.

DEL SIGNOR GEOFFROY.

* **A** Leuni an pensato, che la nostra Ipecacuana grigia potesse essere la Caa-apia di *Pifone*; perlocchè ho stimato bene di esaminare quello lor pensamento col confronto di dette radici, secondo le descrizioni, che gli Autori ne an fatte, come unico mezzo per decidere la quistione.

Caa apia Pifonis histor. Brasiliens. Caa-apia Brasiliensibus di G. Marcgravii, è una picciola pianta bassa, la di cui radice è lunga un, o due dita traverse, della grossezza di una penna di Cigno, e talvolta del picciolo dito, nodosa, che ha a' fianchi, e nell' estremità delle barbe lunghe tre, o quattro dita traverse, tinte d'un grigio gialliccio per di fuori, bianche nel di dentro, quasi che scipide sù 'l primo momento, che si tiene in bocca, ma dopo d'un sapore un poco acre, e pungente.

Da questa radice si alzano tre, o quattro
L 2 gam-

* 19. Maggio 1700.

gambi, o pedaletti minuti, ritondi, lunghi tre, o quattro diti traversi, ciascun de' quali porta una foglia larga un dito traverso, e tre, o quattro lunga, tinta di un verde chiaro per di sopra, & un pò bianchiccia nella parte di sotto, ripiena di nervi in tutta la sua lunghezza, e traversata da alcune vene rilevate nel di sotto.

Il fiore ha il suo picciuolo particolare; egli è rotondo, raggioso, simile al fior del *Bellis*, composto da più stami, e produce semi rotondi, più piccioli del granello della *Senapo*.

Ha questa radice quasi che l'istesse virtù dell' *Ipecacuana*, do d'è, che alcuni l'han dato il nome impropriamente d' *Ipecacuana*, come *Pisone* istesso in quelli termini dice: *Ejusdem ferè cum Pecacuanha, praestantia, & efficacia, unde & Pecacuanha abusive a quibusdam appellatur*. Ferma ella le toccorrenze, e fa recere ugualmente, che l' *Ipecacuana*, benchè non così fortemente; e perciò può darli in maggior dose, da mezza dramma, fino ad una dramma in polvere nel vino, nel brodo, o in altro convenevol liquore.

Que' del *Brasile* pestano tutta la pianta, e ne premeno il succo, che tracannano. Se ne servono ancora con picciotto per guarir le ferite delle frecce avvelenate, e le morsicature de' serpenti, versandolo nelle ferite.

Aggiunge *Pisone*, che si ritrovi ancora un'altra spezie di *Caa-apia* tutta simile a la pur ora descritta, fuorchè nelle foglie, che anco gli orli v'ù d'entati, e vellutoli, come ancora i steli.

Da questa descrizione del *Caa-apia* confrontata con quelle dell' *Ipecacuana* bianca, e bruna, che *Pisone* e *Marcgravius* fanno nella loro *Storia naturale del Brasile*, e dalle note espresse da *Pisone*,
(per

(per cui alcuni danno al Caa-apia il nome d'Ipecacuana) si vede, che non ha egli preteso designare la Caa-apia, sotto il nome d'Ipecacuana bianca. Egli è molto probabile, che quella, che dicono Ipecacuana bianca, sia una specie simile alla grigia, che i Spagnoli portano dal Perù, sotto il nome di *Benxungillo*; e che l'Ipecacuana *fusca* sia quella specie d'Ipecacuana bruna, che oggi è comunissima, che a noi viene dal *Brafile* per i *Portughesi*.

S U L A

MULTIPLICAZIONE

DE' CORPI VIVENTI CONSIDERATA
NELLA FECONDITA' DELLE
PIANTE.

*Prima Memoria letta nell' Assemblea a 19. Maggio,
e 14 Luglio 1700.*

DEL SIGNOR DODART.

NOn vi è cosa più maravigliosa nella Fisica, che io sappia, quanto quella della moltiplicazione de' corpi viventi. Non pretendo io quì sino a fin fondo ricercar questa maraviglia, e me la riserbo in una seconda Memoria; ma solamente farò parola del fatto, e mi conterrò nel genere delle piante; sì perche riesce più facile il trattar della generazione di queste, senza ferir l'immaginazione di alcuno; come ancora perche malgrado la lor quasi che infinita differenza cogli animali,

L 2 al.

alcuna picciola parte , che quì si dirà sù la moltiplicazion delle piante , può adattarsi a questi . Tralascio qualche ne an detto gli Autori , che sono in mia cognizione , sù la moltiplicazione delle piante senza coltivo ; & ometto ciò che può la cultura del terreno contribuire alla fecondità di esse : E quì parlerò solamente del coltivo delle piante istesse , e principalmente di quello degli Arbori , che si fa col taglio , e di quello dell' erbe , che con questo pur fassi , e per esso si riceve ; e ne dirò quanto porta il bisogno , perche si riconosca il risorgimento naturale delle piante per la moltiplicazione contro di quegli accidenti , che sembrerebbero di esserli più contrarj , e distruggerli ancora . Di questo solo risorgimento dunque è mio pensiero di trattare in questa Memoria , e 'l soggetto , che io prendo per fondamento , è volgarissimo , essendo così antico , come l' Agricoltura ; perciocche son più migliaja d'Anni , che gli Alberi , e gli Arbustelli s'incidono , perche si moltiplichino il loro frutto , o per altre ragioni , e si tagliano le foglie dell' erbe comestibili , o altre ; non ho però veduto negli Autori , che sono in mia conoscenza , riflessioni alcune sù di quel vantaggio , che ricevesi la fecondità di questo genere di viventi ; & e' mi sembra , che questa nascosta fertilezza , che unicamente si appalesa per tali fatti , o per altri fortuiti accidenti , non sia stata molto profondata , quantunque ella sia incomparabilmente piu maravigliosa di quelle , che con ragion si ammirano fin da tanti secoli .

Ci sorprende qualora vediamo in *Tesfrasto* , *Plinio* , *Gio: Bauhin* , & in *Rayus* , & in altri Moderni alcun rapporto della fecondità naturale ordinaria , & annua di alcune Piante .

Io ne so dell'e molte più numerose, che in altra occasione potrò comunicare. Ma facendo questa fecondità naturale, & annua così grande, come alcun la può agevolmente osservare, devo dire, che qualche la natura dimostra con ordinaria, quantunque grande, veduta, sia picciola cosa in agguaglio a quella, che nasconde de' risorgimenti, sì per li mezzi della fecondità, che tiene, che per la fecondità istessa; cioè tanto per la produzione de' semi, che è la fecondità istessa; e l'ultimo fin della pianta, quanto per la produzione delle parti, che producono la semenza; perciocche sembrano queste di aver un nuovo essere in se stesse, e sono allo 'ncontro, riguardo a' semi, i mezzi necessarj per giugnere a tal fine: come più chiaramente li vedrà coll'andar della cosa.

Oltre all' *Albeto di Giuda*, e l' *Sicomoro di Bellon*, pochi altri producono il frutto immediatamente dal tronco lung'h' esso. Il nostro *Fico* lo mena immediatamente dal sub legno, non mai però da' getti novelli, nè dal Tronco. La maggior parte produce i suoi frutti, o verso la sommità del Pedale, come le *Palme*, i *Cocchi*; o, che più comunemente fanno, sù le vette de' loro rami, & ancora in gran parte su' picciuoli particolari, che nascono da questi rami, e le piante istesse, il di cui frutto immediatamente vien dal loro tronco, e che anno rami, lo producono così, e molto più sù di questi. Può dunque dirsi, che la maggior parte delle piante sian feconde unicamente per li loro rami; ond'è, che devesi far giudizio della fecondità dalla quantità di questi; come in fatti l'industria de' Giardinieri si adopera, con moltiplicare i rami, a raccogliere moltiplicato il frutto.

Un albero abbandonato a fortuna innalza a

certo segno alcun numero de' rami maggiore , o minore : per cagion di esempio 2. 3. 4. 5. , secondo la specie , il suolo , l'espoltione , e le altre circostanze .

Se questo istesso venghi coltivato con migliorar il terreno, lavorandolo a piè di esso , & irrigandolo ne' tempi di secchita , forse che e' produrrà maggior numero di rami , e di vette .

Il coltivamento però , che col taglio di una porzione di detti rami si fa , contribuisce più di ogn'altra industria alla moltiplicazione; di maniera che può dirsi , che quanto più si scemi tal sorta di corpi viventi, fino a certo segno, più egli si moltiplichi ; donde si scorge quanto sianò abbondevoli i loro risorgimenti.

Tutto ciò è ancor nulla a paragon di quello, che non si vede affatto ; perciocchè il coltivamento ordinario nol permette : Frattanto detti risorgimenti non lascian di essere ; & in una parola può dirsi , che dall'estremità de' rami fino al Pedal dell' Albero , non vi è luogo per picciolo , che designar si possa, ove non siavi una specie di embrione di moltiplicazion presta a farsi , tosto che l'occasione metterà l'Albero nella necessità di dar fuori quel che teneva racchiuso .

Eccone le pruove . 1. se non mai sianfi veduti arbori fino alla lor cima diramati , si crederà un di questi rovinati , senza poter mai rivenire , e solamente buono a tagliarsi , e venderli per legno , o metterli al fuoco , qualor sì nudo si osservi : Frattanto un Olmo , una Quercia , un Pioppo , o qualunque Albero , il di cui tronco molto diritto sia diramato da giù fin sopra , produrrà egli dal nodo de' rami tagliati fino alla cima del Tronco per tutti versi un numero infinito di germogli , che da

per

per tutto rheneranno de' getti, ornando il Tronco alto di 30, e 40 piedi con un fogliuto cesto, che coprirà tutto il corpo dell' albero. Ecco qualche siattiene alla fecondità di esso nella parte ramola del suo Tronco.

2. E se si vegga mai un Albero scapezzato da turbine, ovvero a bell' arte tronco dal nodo de' rami, non vi è chi nol riputi tra lo spazio di sei mesi un Tronco morto, & inabile ad ogni generazione: E pur questo scemato, o dalla parte sottana al luogo, donde prima sorgevan nel pedale i rami, germoglierà con copiosi getti, o nell'orlo del taglio, o verso di questo.

3. L'istesso può dirsi degli Alberi tagliati quasi che rasente la Terra, che ripullulano più numerosi, benché men alti; E con tale industria si foggian essi a greppi, o a spalliere tra le fruttifere; e rimettitici a macchie tra le selvaggie, come per gli esempi, che sieguono di tal moltiplicazione.

La Castagna d'India germoglia dalla corona, e l'Ormo da vicino a questa. Ho io noverato 96. polloni nella corona del primo di due dita di diametro, che 'l vento avea scapezzato; e ne ho veduto un' altro, il di cui diametro era maggior di 5 dita, da cui mi assicuraron, che nell'Anno passato ne avean potati più di 100. getti, e n' avevano lasciati 14.; di là ad otto giorni io ne rinvenni 24. nuovi, facendo in tutto la somma di 138., & oggi giorno 19. Maggio dell' Anno 1700. ne ritrovo 25. altri, sicché la somma intiera è 163.: Ne' osservai un terzo, che un turbine scapezzò al principio del Mese di Giugno, quale avea 4. dita di diametro, e per conseguenza il giro era un poco più di 12. dita vicino al suo cesto; donde avea menato sin verso al fine di Dicembre 106 getti, per produrne altri an-

cora nella stagione di Marzo, forse in maggior numero; perciocchè i molti germogli fin da Giugno prodotti, cioè dopo il sugo di Primavera passata, e quando l'Albero fù scapezzato, avevan sbucciati i loro fiori.

Questo gran numero di germogli sopra di una quasi che sola linea di 6. in 18. dita, o poco più di giro dimostra, che, quantunque appaja, che 'l tronco sia men fecondo de' rami naturali, quali formavano il primo cesto, in fatti sia egli tutto altrimenti; perciocchè in qualunque altezza e' li tagli, produrrà i germi ugualmente dal collo de' rami; fino a quel delle radici: che perciò può ragionevolmente supporfi, che siccome tal numero di germogli si è prodotto tra lo spazio di due linee al più nella sommità del tronco scapezzato ne' due primi esempj, che ne farebbero usciti altrettanti da tutte altre parti, dove si fusse scemata l'altezza del tronco, o sopra, o sotto. Così se invece di due linee si facesse tre volte tanto alta questa corona di polloni, si rinverrebbero nella sommità del tronco 10. piedi alto, per lo meno 240. volte 96.; ovvero 138 principj de' rami, e molto più ancora; perciocchè il tronco è più grosso, e più forte, e 'l sugo più abbondante a proporzione, quanto è più vicino al pedale dell'albore, come osservasi in tutti gli alberi bassi, e ne' selvaggi de' rimettitici, o delle Foreste tagliate da molto tempo. Egli è vero, che nelle antiche Foreste i polloni de' Tronchi tagliati, divenuti essendo grossi pedali, coll'andar de' tempi si veggano aggruppati 4. 5. 6. a mucchi facenti la cruccia nel pedale, e con ordine cingendo il tronco tagliato salente la Terra; come più volte ho osservato nelle antiche Foreste, e fra le altre ne' Boschi di *Boulogne* vicino *Parigi*. Che 'l numero di

di questi polloni divenuti tronchi ben grossi sia minore de' getti della Castagna d'India scapezzata, non addiviene, perche non abbia potuto esserli egli uguale, o maggiore; ma perche il germoglio più forte avendo tirato a se il sugo de' più deboli, questi, che son sempre in maggior numero, si sono disseccati, a misura, che egli si è invigorito. Che perciò quindi non fassi, che non possan calcolarsi in questo genere, e sù di tale altura per lo meno 23040, ovvero 32220 embrioni di rami. In detto Albero vi erano appena quattro principali rami naturali; dunque il caso per cui fù egli scapezzato dal vento fa multip'licarlo in questo numero in uno degli esempj proposto di 5760. per uno, e nell' altro esempio di 8280. per ciascuno.

Non sono men fecondi l' Olmo, e l' Acero, anzi che li superano; perciocche oltre al cesto molto fronzuto, che in lor rigermoglia, quando sono scapezzati; se lo siano più a basso, il di loro tronco produce per spazj più, o meno grandi una molta quantità di piccioli nodi particolari disposti in giro ben largo, & irregolare simile alle rappe de' cavalli: & alcuni di questi piccioli nodi dan fuori uno, o più germogli, in maniera che unendo a detto cesto i getti, che escono dal Tronco per tutti i versi, egli ne vien quasi coperto dalla radice infino a' rami.

Son questi ancora altrettanto fecondi in ramuscelli, e vette, come i Tronci in rami, e tal fecondità si ravvisa soprattutto ne' loro estremi. Vedesi in parte quel, che son essi capaci di produrre per la loro lunghezza negli alberi nani, che rende tali il continuo lor tagliamento; e si vede ancora ciò che i rami son capaci di produrre nella loro estremità in tutti gli Alberi, di cui s'ador-

nano le spalliere di Gardini, e formansi macchie sempre verdi: Perciocchè a forza di tagli in ogni anno de' giovani legni, e di porzion de' vecchi, e principalmente nelle palizzate, e ne' greppi di diversi arbusti, come di Bosso, di Tasso, di Sabina &c. la superficie di dette palizzate, e delle macchie divengono in più luoghi così folti, come una spazzola, per la moltiplicazione de' ramoscelli suddivisi in altri per lo continuo taglio.

Le radici ancora anno questa specie di fecondità in certi Alberi, tosto che sentano l'aria: Così negli Olmi de' novelli viali, perciocchè son questi per ordinario affossati, distendendosi molto tra due terreni le radici di essi, rimangono molti rami di queste allo scoperto ne' fossi, ove producono de' germogli con le foglie, quali vestono detti fossati, & empiendo, ornano con mazzocchi, e rampolli pieni di foglie d'Olmo, che son produzioni d'un molto maggior numero di rami, che sorgono per tutti i verti dalle branche sotterranee di dette radici. Se si tagliassero gli Alberi dal pedale sù le di lei radici, avverrebbe, che una, o più di detti germogli, diverrebbero nel loro corso tronchi dell'istesso Albero, tanto più se si lasciasse il più vigoroso, e si svelleffero i deboli.

Siccome le radici son feconde in tronchi, & in conseguenza in rami, & in verghe &c., così i tronchi, & i rami, son reciprocamente fecondi in radici, qualor l'occasione lor faccia dimostrare questa fecondità nascosta, non solamente ne' tronchi, ma ancora ne' rami. Eccone le prove.

I. E' ella proprietà essenziale di quasi che tutte le piante, che repono sù la Terra, o sù le balze, che le sostengono, di menar le radici da loro lungi.

ghissimi steli per tutto, ove esse toccano la Terra, o dove poggiano. Queste radici sono in molte di dette Piante per lo meno così corte, come le gambe de' Bruchi, ma non per questo lascian di esser radici; perciocchè se 'l gambo è tagliato, & in conseguenza la principal radice è separata da rami, non per questo si rimangono esse dal sussistere, e nutricarli per mezzo di tali brevi radici.

2. Se alzando si ammonticelli il terreno, che cuopre il piè di un'Albero, sicchè alcuna porzion del Tronco, che prima era scoperta, siane interrata, questa parte allo'ntorno menerà una capellatura di fibre, che diverranno col tempo grosse radici.

3. Se si abbassi un ramo, senza dividerlo dal Tronco, o che s'incurvi, e questa curvatura si cuopra con terra, quindi produrransi le radici, e'l ramo diverrà un'Arbore: come costumasi far delle Viti, de' Fichi, degli Olmi, e del Tasso; e di ogni altro Arbore ancora, potrebbe ciò farsi.

4. In fine e' si sà da più di 2000 * Anni, e per le moderne Storie ancora, che l'accertano, come i rami di fichi d'India menin delle radici spenzoloni, che dilungandosi a poco a poco prendon terra, donde un nuovo tronco forga, e si occupi quello spazio, che dal principal tronco della densa Foresta essi divide.

Da questa fecondità de' tronchi in radici, e delle radici in tronchi non vengono immediatamente i frutti, ma produconsi quindi i pedali, per cui mezzo si an le frutta. Ma quando anche non le rendessero, non rimarrebbero perciò di essere con-

side-

* v. Teofrasto hist. l. c. 12.

fiderevolissime, come una produzione sempre novella, che non mai farebbesi avuta senza de' tagli; ella però è molto più considerabile, per essere un nuovo mezzo da moltiplicarsi quindi la vera fecondità, che addiviene da semi.

L'erbe nella maggior parte tengono alcune cose della fecondità degli Arbori, che si avvisa col poterle. A malpena tal ve n'è, che tagliata in convenevole stagione non germini, o per lo men infrondi più, e queste frondi stesse tengon luogo di frutta presso di alcuni, che se ne nutricano. Quindi fansi l'erbe commestibili, vigorose; perciocchè gli Ortolani anno per lor profitto più cura di far queste moltiplicar, che altra pianta, di cui non si faccia sì frequentemente comun uso, il di cui coltivo lor non frutterebbe. Di esse ve ne son più generi; poicché buona parte delle piante, che compongono un'Orto, richieggono tal cultura, che tutta si dirizza ad accrescere il moltiplico per mezzo del taglio. Si veggono tra le piante propriamente dette Camangiari molte, che serpono, e rendono frutto, altre bolbose, tuberose, leguminose, &c. Appunto in molte spezie di ciascun di questi generi l'industria degli Ortolani rinviene i principj, donde si moltiplichino per mezzo della potatura: così vediamo farsi nell'Acetosa, per cagion di esempio, nella Cicoria, Pimpinella, nel Petroselinolo, negli Appi, &c. quali piante tagliate rasente la Terra, quante volte si vorrà, per tutto l'Anno, fuorché quando gela, gettano dal pedale, precise nel primo Anno, molti germogli altrettanto più spessi, quanto che i tagli saranno stati più frequenti. Egli è vero, che nel primo Anno il pedale non dia altro, che frondi, & alcuni polloni; ma nel secondo, se si lasci salire il primo getto, darà i suoi semi.

I germe

I germogli, che per propria fecondità, e per la putredine delle frondi del primo Anno saran pululati, produrranno partitamente il loro gambo, & in conseguenza i semi, se si lascian montare, e così regolarmente fino al fine del vivere di detto pedale. Se non si tagliasse detta pianta nel primo Anno, produrrebbe dal pedale 1, 2, 3, germogli, o qualch' un'altro di più, concediamli fino a cinque; ma il taglio ne fa germinare un numero molto maggiore: lo ne ho veduto sopra d' un giovane piede putato nel mese di Dicembre, cioè non compiuti ancora i dieci Mesi, fino a 26; posso dunque asserire, che'l taglio ha fruttato a questo piede più di 20 germogli, moltiplicazion considerabile in vero, ma non intiera. Ciascun germoglio è un'accozzamento di grandissimo numero di foglia una involta nell'altra, involupando le più grandi le minori, e queste le più picciole, e così di grado in grado, fino al cuor del germoglio, qual cuore è composto di foglie di più in più picciole, bianche, delicate, sicche l'ultime a malpena si veggano, rinchiudendo nel centro della base di questo un punto Conico più impercettibile delle foglie, che lo cuoprono; e pur la sommità del Cono è lo stelo futuro accorciato.

Or chi dice il Gambo, e li rami in queste piante, dice la parte, che porta il seme; & e' mi sembra, che niun debba dubitare, che la sommità di questo giovane stelo non contenga attualmente tutti i semi, che dovrebbe produrre: Perciocche può ogn' un vedere nella Primavera nel centro de' getti, tosto che essi cominciano ad uscir dalla Terra, ne' gambi un pò allungati, sporgere i bottoncini de' fiori, che contengono i loro semi; e se si esaminino detti fiori, quando son ben grossi,

grossi, cioè, che anno spiegate le loro foglia, con istrumenti acutissimi, si conoscerà la parte, che contiene il seme, & alcun tempo appresso il seme istesso formato nel calice, o nel Pestello, e tutto distinto in che avrà la picciola ampiezza necessaria per esser ravvisata dal Microscopio. Si vede ciò agevolmente nelle piante fra tutte, che producono i semi quali che ignudi.

Son più di venti Anni, ch'io portai alla Compagnia una spiga di formento tutta formata in appena uscir dalla Terra il gambo: Questa spiga era per lo meno sì picciola, quanto la punta si è di una grossa spilla, cioè di mezza linea dal fin della punta; e frattanto con una lente di mezzo dito di fuoco, vi si scorgevano tutti i granelli, e nel gambo, che era di sotto, alto una linea, e mezza, si ravvisavano ancora tutti i nodi, il primo de' quali era il più grande di tutti, e l'ultimo quasi impercettibile: Tutto ciò in proporzion così differente da quello di un cannellin di formento adulto, che coloro, a' quali è più, che ogn'altro, noto questo, ma che non sono addestrati nella notomia delle piante, non avrebbero affatto ravvisata una tal' embrione. Le foglie di questo gambo, che non avrebbero dovuto essere al più più, che la sesta parte dell'altezza della pianta perfetta, eran 48 volte più lunghe del giovane doccio, e della sua spiga, la quale formava la terza parte dell'altezza dell'intiero; quando che nella pianta adulta non ne è la diciottesima. La grossezza del gambo era circa il terzo dell'altezza, e pur nelle mature piante appena è la quattrocentesima; & i nodi dello stelo sembravano come conficcati l'un nell' altro, appunto come que' di un Cannocchiale quando si voglia riporre; I granelli della spiga erano ritondi, come

come perfette perle , quali trasparenti , e tutta la spiga simigliava a quella dell'Arone maturo . Ecco-
ne la figura al naturale , come per una lente si rav-
visava .

GERMOGLIO

DI UN GRANELLO DI FORMENTO

*Disegnato , secondo il Microscopio
rappresentava.*

- A Parte della Radice , donde il Cannoncino è sta-
to svelto.
B , C , D , E , Doccia di questo Fuscello svelto,
di cui .
B E' il primo nodo.
C Il secondo.
D Il terzo .
E Il quarto . In ciascun nodo menava una foglia,
le quali si son tolte per vedere la spiga coperta,
e nascosta sotto di esse , fuor che l'ultima foglia,
che lascia bastante luogo da ravvisarla.
G La spiga tutta formata nel mezzo del germoglio.

Nella seconda Memoria si vedrà la ragione ,
perche io entri quì in tal minutezza ; bastando per
altro ora , che si vegga un'esempio del germoglia-
mento del grano , che può servire per molti altri ,
qua' i ciascuno può investigare nell'istessa maniera ,
anche nelle bocce fruttifere degli Arbori di molte
spezie , affinche non si creda , che io a capriccio
supponga nel centro di tutti i getti i stami intieri
del Tronco , e de' semi . Ben prima io ne ho disa-

Memor. 1700.

M

mi-

minato un molto buon numero di questi, per ragionevolmente presumere, che a un dappresso in tutti s'incontrerà l'istesso apparecchio.

Ciò supposto: per conoscere a qual grado di fecondità possano i tagli far montare la moltiplicazione de' semi, e per darne un' idea quanto si possa mai distinta, senza esagerazione alcuna, non bisogna altro, che considerare quel che siegue. Sia l'acetosa comune un'esempio per tutte. Un piede di questa pianta di un solo gambo colto in una libera Campagna in terreno affatto inculto si ritrovò con più di 1200 semi per conto fatto. Questa fecondità è ben grande per una pianta Campestre nata in un suolo inculto; Sicche in un coltivato apparentemente ne avrebbe ella recati di vantaggio. Io però m'attengo al primo numero, che assumo per base del mio calcolo. Non bisogna dunque altro, che esaminare l'aumento, quale avrebbe potuto recare il taglio ordinario a quest'unico seme, che ha prodotto il cennato numero: Questi tagli son per ordinario interrotti dal mese di Luglio, & Agosto; Sicche in continuandoli per tutto il rimanente tempo dell'Anno, i germogli si moltiplicheranno più di quel che non fanno, ma questo poco in porta. Prendo io le cose nello stato, che sono, secondo la cultura, & i tagli ordinarij, purché non si vogliano pruove più Filosofiche, per conoscere fin dove possa giugnere questa specie di fecondità. Il primo germoglio di tal piede non coltivato dunque avrebbe prodotti senza taglio 1200 semi nel secondo Anno; 2400 nel terzo Anno, se egli avesse menati due gambi; al più più 6000, se n' avesse prodotti cinque; quandoche egli per mezzo de' tagli, e cultura avrebbe menati 20 gambi di più, & i semi su detti 20 gambi fin dal terzo Anno fareb-
be.

bero ascesi a 24000 soprappiù di quel che avrebbe prodotti sopra di cinque. Per dimerinare a un dappresso quel che tal piede avrebbe potuto dare nel quarto Anno, ne ho io posto in disamina uno di tal'età, che per tre Primavera, e tre ultime Stagioni avea sofferti tutti i tagli, e tutti i coglimenti ordinari. Aveva egli sù di 16 radici 40 polloni, che avrebbero potuto rendere 48000 semi. Da queste tre Annate ne risulta un tutto di 71200. in tre Anni di fecondità così naturale, che artificiosa, senza contare tutto ciò, che detta pianta potrebbe produrre, se più lungamente si lasciasse. Si vede bene, che io non usi quì precisione; ma devesi considerare ancora, che 'l fondamento di tal calcolo potrebbe per natura, e per effetto essere molto più numeroso di quel che io l'ho fatto.

Quel che ho detto intorno alla fecondità, che producesi per i tagli nell'erbe, propriamente dette Camanciare, s'avvera in una buona parte ancora delle piante di ciascun genere, che forniscono gli Orti. Tra le leguminose, i Fagioli tagliati non ripullulano, ma le Fave, & i Piselli menano quattro, o cinque gambi per uno. Tra le bulbose, la scilla non rigermoglia, nè la cipolla, ma se si trapianti questa, dopo averle tagliate le foglie, germina molti gambi. La *Cepa Scyllis Matthioli*, dall'Inglese detta *Sivette*, e l'Aglio, senza essere trapiantate, essendo tagliate, producono l'istesso effetto. Tra le serpeggianti, le Zucche, i melloni, i cocomeri, si coltivano col taglio del loro primo germe, fin da quando comincia ad apparire: Se si lasciasse crescere, sarebbe egli unico, e leverebbe diritto fino ad una certa altura, come spesso ho io osservato in questi. In nascendo dunque, con le unghia, per essere tenero, si taglia, e dice si

arreter; & allora quel che rimane di tal germoglio dal luogo tagliato fino alla Terra, fa quel che gli Ortolani dicono *taller*, quasi volessero dire *etaller*, cioè mostrare, perchè la pianta germoglia molto dappresso al pedale per tutti i versi 4, 5, 6 gambi, che tosto si piegano, & affettano in giro intorno alla cicatrice del gambo tagliato. Questi tagli moltiplicando i steli raddoppiano per conseguenza il frutto, & i semi.

L'istessi pullulamenti, & ancora maggiori si veggono ne' cavoli verzotti, e ne' cappucci, non avendo io esaminati di altre spezie. Ma quì si tratta solamente di dar esempj, di cui può alcun agevolmente far pruova, ond'è, che io ho scelti questi, perciocchè tal pianta è fecondissima, e tale in altri tempi fu riputata. (a)

Non dimanderò scusa quì a Lettori per intratterli con esempj volgari, e per trattar questi con qualche esattezza; perciocchè io scrivo per Filosofi, che non possono aver a male, che io lor dia idee così precise, quanto è possibile, i quali son persuasi, che la minor opera della natura sia degnissima sempre di tutta la nostra attenzione. Questa pianta altre volte è stata una delle più celebri fra le conosciute dagli Antichi. (b)

Que-

(a) v. *Plin. hist. nat. xx. c. 8.*

(b) v. *Plin. hist. nat. xx. c. 9, ove dice, che Crisippo il Medico abbia composto un'intero volume delle virtù di detta pianta in gran numero di Malattie di tutte le parti del Corpo Umano: Che Dieuches altro Medico celebre ne abbia parlato con uguale stima, e che Pitagora, e Catone seniore le fian stati parziali, come i cennati due Medici: Ma quì si tratta del gerogliar di tal pianta.*

Queste due spezie di Cavoli, ancorche siano scaperzati nel Mese di Settembre, e più tardi, non solamente ripullulano dalla corona, come gli Arberi, ma dal lor tronco ancora da alto a basso nel luogo delle ascelle di tutte le loro foglia cadevoli con altrettanti germi, quante foglie in tutto questo intervallo an perdute, cioè per lo meno con 18, o 19, al più con 24, o 25 nel Cavolo cappuccio; nel Cavolo verzotto ne ho contate sino a 36. Questi polloni invero an la testa men dura della prima per esser molti, e perche il succo diviso rifonde minor nutrimento a ciascheduna: Ma la struttura è sì fattamente l'istessa, che queste seconde teste producono i loro semi, come la prima, tutto che men nutriti, e men forti, a cagion dello scomparimento del succo, simili però inquanto al resto. Apparisce ciò chiaro, se si lasci una sola di queste teste, che il seme sia così buono, come quel della prima, e soprattutto se la prima testa sia caduta molto prima per alcun accidente, come spesso avviene in trapiantandola; perciocche essendo il primo germoglio molto tenero nel nodo, questo facilmente si rompe; Allora i germogli si aumentano sopra tutto sù la corona, e ciascun pollone foggia a parte la sua testa grossa, quanto un pugno, e di vantaggio. Queste teste ne' Cavoli crespi si dicono *des brogues*, e dagl'Italiani *broccoli*.

In queste piante si vede quel che negli Arbori si suppone, cioè visibili polloni da per tutto, donde nasceranno delle seconde teste, & altrettante, quante son le foglie, cioè da circa 65 a 85(c) poiche tante ne

M 2

nu-

(c) Ne ho numerate di poi sino a 110, con altrettanti polloni, ciascheduno nell'ascella di ogni foglia: 18 di questi eran divenuti broccoli, cioè 8 sopra la testa, e 10 nella testa sotto altrettante foglia: Il più

veg-

numerai in un Cavolo verzotto nel mese di Gen-
najo , mentre cercava nel cuor del Verno a scopri-
re nel centro della di lui testa alcuna cosa di quel
che si osserva nella Primavera . Ecco dunque da 65
a 85. broccoli , non vedendosi que' , che sono nelle
ascelle delle foglie presso al centro . Ma (d) in qual
maniera potean vederli ? Le prime foglie sono di
16 in 18 dita lunghe , le ultime appena di $\frac{1}{2}$ di li-
nea : Or i polloni de' broccoli sotto la foglia mag-
giore, ch'è di un piede , alcune volte non superano
un seme di Canape : quanto dunque sarà il 65 ,
o'l 85. sotto la 65 , ovvero 85 foglia ? percioc-
che

vegeto di detti broccoli avea 17. foglia , e già il cono
del gambo in abbozzo era carico di fiori. Vedi qui ap-
presso la descrizione di simigliante mazzocchio, o gam-
bo abbozzato . Quel che fa divisare più la prodigiosa
fecondità di tal pianta , si è , che oltre a quel che si è
detto, scorgevasi nella radice istessa nel mezzo un ce-
sto di fibre capellute di cui eran cinti tre polloni un
dito, o un dito e mezzo lunghi , nascenti da una sola
parte , e 'l più vigoroso vestito di alcune fibre delle
radici .

(d) Molti dell' *Assemblea* a' 7. Gennajo 1702. an-
veduti i germogli vicinissimi alla punta del Cono .
E' degno di molta riflessione , che alcuna simigliante
cosa si rinvenga osservata in Plinio : Fa questi men-
ziona di una specie , che produce altrettanti polloni
quante foglie , e dice ancora , che sian essi nascosti so-
tto di quasi che tutte le loro foglie . Non era sì pro-
prio agli Antichi l'osservare cotanto dappresso le cose ;
ma io mi sono avveduto , che qualora si presentavano
sotto a loro occhi , non lasciavan di farne menzione
per loro onore . Vedi *Plin. hist. nat. lib. XIX. cap. 8. ,*
cap. XX. cap. 9.

che queste a misura che si avvicinano al centro, scemano in larghezza molto più, che in lunghezza, & nascondono i loro poloni sotto le ascelle. Dico tutto ciò, perchè si formi l'idea dell'incredibil moltitudine de' semi, che ragionevolmente può supponersi non solamente ne' broccoli, che in atto li ritengono nella loro maturezza, ma ne' germogli ancora; che sono broccoli in abbozzo; poichè questi non divariano da quelli, che in grandezza.

Ma qui non rifina l'istoria, poichè queste seconde teste ciascuna ha un gran numero di foglie minori in vero della prima, & altrettanti poloni ancora quante foglie; ciascun de' quali può crederfi, che contenga in se un grandissimo numero di semi; la cui summa tra non molto vedremo a quanto possa ascendere. Posto ciò; quando anche si tenessero per nulla tutti i germogli, il piede in cui ho io contato 36 broccoli, avrebbe fatto l'avanzo col taglio della sua testa di 36 volte tanto di quel che abbia perduto nell'essere scapezzato.

Si vedrà qui basso qual possa essere a un dappresso il numero naturale, & ordinario del seme prodotto dal gambo maggiore di un sol piede di Cavolo; ma frattanto io dirò quel che ho osservato nella cima di un torso del Cavolo verzotto sfogliato: Ho io veduto un Mazzocchio di 28. filetti, che osservati col Microscopio facean veduta agli occhi de' più fini stami de' fiori aperti. Questi ricurvati verso l'Asse del Mazzocchio, terminavano in una picciola testa (e). I filetti della circonferenza erano

M 4

più

(e) I Signori Mery, & Littere all'ricercata l'istessa cosa ne' broccoli folcissimi; e l'an ritrovata: Osservai indi a 24 Gennajo alcune cose di vantaggio; avven-
do.

più lunghi di que', che stavan vicini all'asse, e tutti impiantati su'l declivo, & all'estremità della punta di un cono coperto da picciola foglia alta un terzo di linea. Ond'è, che'l cono era più picciolo, per essere coperto da lei. Questo mazzocchio era formato da 28 filetti, i più lunghi de' quali, lasciando la curvatura, erano mezza linea alti, & i più corti un mezzo quarto al più. Che vuol dir questo? Il cono è quel gambo, che nel seguente Giugno sarebbe alto 5, o 6 piedi, & i filetti sono la fibruce, che avrebbero cinto il gambo; le teste sono i fiori in boccia: Nel mezzo di ciascun bottone deve esservi lo stelo, & in questo il seme della pianta.

La Compagnia ha veduta l'istessa cosa. Nel mezzo di ciascun fiore deve esservi, come si è detto, lo stelo, quale divien poi un baccello ritondo, lungo, e doppio di 4, 5, o 6 dita, pieno per ordinario di 40 semi, 20 per una parte, & altrettanti per l'altra. Quando ho detto di aver ritrovate 28 bocce di fiori in quest'embrione di gambo in abbozzo, non ho inteso dire, che non ve ne fossero di vantaggio; poicché son sicuro del contrario, e di esservene molto più; ma che questi 28 si fossero i più visibili, & i più cresciuti; perciocché il gambo maggiore infiora sempre il primo, e gli altri gambi non si ravvisano per la lor picciolezza; lor trasparenza, & involuppi, e per tutte altre circostanze del primo nascere.

Non bisogna dunque credere, che questo gam-

do contato 27 fiori in un broccolo, che aveva sole 17 foglie, & i bottoni de' fiori li più maturi veduti di fronte rappresentavano un perfetto quadrato, in maniera che potevasi prevedere dalla boccia, che'l fiore avrebbe quattro foglia in ispiegandosi.

gambo avesse prodotti soli 28 fiori ; perciocchè ho io osservato sopra di uno stelo primitivo alto più di 5 piedi , che avea egli di sotto al suo pedale otto broccoli , un de' quali avea menata la semenza . Il gambo principale solo con suo' rami teneva 197 baccelli , & era circondato da 9 steli laterali , il più vigoroso de' quali portava seco 112 così baccelli , che fiori , e 'l più debole 26 , e detti gambi erano tutti rami . Il broccolo con seme avea tanto ne' cinque gambi principali , che ne' laterali , 136 così baccelli , che fiori . In tutto , il gambo principale portava 791 baccelli ; e gli altri 8 broccoli insieme computati all'ingrosso , 1088 ; e tutti i gambi insieme 1879 baccelli , cioè , secondo il calcolo di sopra , 75160 semi proveguenti da uno , donde era nato tal piede .

Devo quì dire , ch' io non ho posto in conto la maggior parte di que' piccicoli gambi , da cui i baccelli eran caduti o per forza di vento , o in trasportandoli ; quantunque venissi assicurato di esservi stati , e persuaso , che l' uniformità nelle produzioni naturali dia una specie di diritto di stimarle a un dappresso sù l'istesso piede ; ma convien fare questa stima all'ingrosso , & inchinar piuttosto dalla parte della moderazione , che dell' esorbitanza , per non entrar nella sospezione di esagerare maraviglie , che servono di fondamento alla Teologia naturale . Ecco dunque la produzione d'un primitivo , & abortivo piede di detta pianta ; vediamo ora l' avanzo , che avrebbe potuto ella fare col taglio , o essendo scapezzata .

Ho detto sopra , che un cavolo verzotto scapezzato avea prodotto 36 polloni in broccoli , questo istesso avendone dati otto senza essere potato : se dal primo numero si sottraggano , rimangono 28 da

por-

porfi in conto: or 28 sù'l piede di 126 baccelli di 40 semi per ciascuno devon produrre 154420 semi; dunque ta avanzo si fa col taglio, o collo scapazzar la pianta. E' vero, che tutti i semi di quella non sarebbero stati fecondi; ma nella struttura non sarebbero punto divarj dal miglior seme: Qui non si tratta di fare stima del profitto, che'l Giardiniere tragga dall' Agricoltura, ovvero il proprio Padrone; ma di servirsi della pratica di tal arte meccanica, per istabilire sù di questo fondamento sodo, e volgare, la conoscenza della verità Fisica.

Quindi è che secondo questa verità può quì dirsi, parlando fisicamente, che co' tagli non si faccia guadagno alcuno, poicche da questi non si produce cosa; ma solamente si dà luogo, che venga fuori all' essere qualche prima avea l' esistenza nelle Piante; come chiaramente indi apparisce; perciocche se, come devesi, i polloni sian riputati per bróccoli in abbozzo, la Società ha veduto che questi sian altrettanti che le foglie; cioè circa ad 85: Or valutato ciascheduno sù di quel che produce in atto, come sopra si rinvierà essere de' 5440 semi per cadauno, e tutti insieme faranno l' intiero di 423260 semi fecondi annui, per un seme, che a gran pena ha una linea di diametro. (f).

Ritorno agli Alberi, & alla loro fecondità in samì, e vette, sì avverata, per quel che loro

(f) Sarebbero questi dunque sù'l piede di 110 polloni, supposto che abbia 100 foglia, 559260; quali uniti al prodotto del gambo principale di sopra, che avea 791 baccelli, o fiori di 40 semi per ciascuno, farebbero 590000 di moltiplicazione annua, seminandosi detta pianta in ogni Anno.

avviene, qualora son diramati, o scapezzati; e dico, che'l più forte di questi rami gionto ad un certo vigore, ciascuno a loro modo porterà le frutta; che i più deboli farebbero altro che tanto, se si scemassero i più forti; che tutti produrrebbero frutta, se'l succo fusse in tal abbondanza da somministrare il necessario multiplico: Et essendo così, questa fecondità non è solamente riguardo alla moltiplicazione delle parti dell' Albero, ma a quella dell' Albero intiero contenuto in ciascuno de' suoi semi; cioè alla moltiplicazione dell' individui dell' istessa specie racchiusa nella moltiplicazione de' rami, donde escono i semi, o ignudi, come que' dell' olmo, o circondati da una polpa, come in tutti gli alberi fruttiferi.

Chi mai potrebbe comprendere ove questa moltiplicazione individuale de' rami compresa in quella di essi potrebbe giugnere! Prendo l'Olmo per esempio: In quest' Albero tutti i rami, e tutte le vette nelle buone Annate, come questa, son piene di grossi mazzocchi di semi fogliati ristretti l'un contro l'altro, in maniera che tutto il legno avanti di produrre una sola foglia vien coperto da questa sola produzione con un contorno membranoso, e dilicato de' suo' semi. Io ne ho contati 157 tra la lunghezza di due dita d' un ramo, che n'era mediocrementè guarnito: Donde facilmente potrà dedursi, che un Arbore simile di 15 Anni abbia un ampiezza di più di 30 pie: di similmente coperta come queste due dita.

Su di questo piede sarebbero i semi 282603 ma per averne un più giusto conto, & assicurarmi di non aver alterata la stima, mi piacque disami-

na-

nare un ramo d'olmo di 8 piedi lungo, alto da terra più di 24. Feci dunque con un uncino attaccato ad una lunga pertica cader questo, e lasciando da parte que' semi, che per lo moto, e per la caduta si perderòno, fatti raccorre i rimasti sù 'l ramo, pesaron essi due oncie, un grosso e mezzo, che ridotti al valor di mezzo grosso, erano 35 di questi; feci indi contare i semi un per uno, che si ritrovaron 16450. Feci ancora conto allo 'ngrosso di quanti rami di simile misura, cioè di 8 piedi lunghi più, o meno potessero rinvenirli sù d' un'olmo di 6 dita di diametro, e ne ritrovai 11; dunque sù di un solo piede vi farebbono per lo meno 180950 semi. In un altr'olmo di un piede di diametro io numerai 15 rami molto più vigorosi: Poniamoli uguali, e secondo questa stima si conterrebbero 246750: Dunque la fecondità va crescendo a misura, che i rami si moltiplicano: E siccome un Olmo può facilmente vivere 100 Anni, prendendo per una misura mezzana di fecondità quella, di cui è egli capace n- l' vigesimo Anno, compensando così a quel che manca da tal numero nella picciola età dal suo nascere sino al 20 Anno, con l'eccedente, che reca negli altri 80; diciamo un Albero di 6 dita di diametro dà 180950 semi; un Olmo di 20 Anni deve avere più di 6 dita di diametro, grossezza per altro ordinaria a que' di 12 Anni; si può dunque far computo, che in un Albero di 20 Anni sian più di 180950; poniamli 100000, e moltiplichiamo questo per 100, la somma totale farà 20000000: E poiché tutto ciò si produce da un solo seme; donde l'olmo è nato, giustamente può dedursi, che questo unico siasi moltiplicato in 20 milioni per uno.

Quantunque tal specie di fecondità, naturale.

le per altro, non sia preciso soggetto di questa Memoria, in cui trattasi della moltiplicazion artificiosa, che stendesi molto più della fecondità naturale; ho stimato di dar questo barlume, perche li conosca fin dove possa montare la fecondità, che siegue la moltiplicazion delle parti cagionata da tagli, o de' tronchi, o de' rami, precisamente negli Alberi, e negli Arbuti; perciocche detta moltiplicazion artificiale termina in fine, come sopra ti è detto, nella natural moltiplicazione de' semi, per cui le piante son fatte; perciocche quanti più rami sono, più frutta indi nascono, se l' succo sia bastante a produrli.

Bisogna confessare che quest' Albero nel presente Anno abbia fruttificato straordinariamente; io però nel conto mi son tenuto alla sua natural raccolta. Sembra allo 'ncontro, che senza lusinga possa dirsi, che, qualche è ordinario in questa specie di attual raccolta, possa esserlo in apparenza. Le cagioni esterne anno agevolato lo spiegamento attuale de' semi; e forse, che vi saranno ancora molti di questi, che dette stesse cagioni non an fatti schiudere, che una costituzion d'aere più favorevole averebbe fecondati. Ma tal costituzion favorevole non mai ingenerarà un solo seme; e il più ch' ella vaglia, ti è a sopprimerlo, o agevolarli l'uscita. Così quel che sembrava fecondità straordinaria, è forse un ordinaria annual maniera, che, come detto Arbore in produrre, non giovando l' Anno favorevole in altro, che nel far agevolmente schiudere qualche in fatti suole ne' diffiniti tempi ogni Albore di tale specie produrre; e l' Anno il più contrario non farà altro, che ritardare tal producimento, & impedire con ciò a svilupparli, come conviene.

Se dunque si avesse voglia di sapere fin dove
a un

a un dappresso giunga la fecondità del miglior Anno di qualunque pianta si fia, converrebbe aver contezza di qualche produca ella in terreno più favorevole, e nell' Anno migliore; Perciocchè non è l'Anno, che produce, ma l'Arbore, il quale non può dar fuori altro, che quel che già teneva, siccome nella seconda Memoria mi studierò di provare.

Essendo così: Quantunque ogni pianta non ugualmente produci in tutti terreni, & in ogni costituzion d' Anno, non lascia però ella di esser seconda ugualmente in se stessa. Un esempio farà vedere come tutto quel che agevola la moltiplicazione apparente, & attuale, facciasi col facilitar lo spiegamento di qualche si contiene nella pianta, e non già con l'aggiungimento di qualche in essa non vi è. Un granello di Cedriuolo piantato, & abbandonato a fortuna in buon terreno bene irrigato, ma senz' altra coltura, reca poco frutto a paragon di quello, che produce allora che si tien cura, dopo che è rassodato, di leggermente affondare nel terreno di luogo in luogo i suoi lunghi gambi, che repono, coprendoli con una sola pala di terreno: perciocchè allora questo luogo, ove sono interrati i suoi lunghi gambi, menano le radici, e queste somministrano un abbondevole nutrimento, e fan che le frutta si producano, ove non lo farebbon mai senza d'un tale ajuto. Può l'istessa cosa vederfi ne' cocomeri, le di cui radici non son già prodotte dalla Terra, ma dalla pianta; & esse non sarebbero mai pullulate, se 'l contatto del terreno non avesse agevolata l'uscita, il quale cuoprendole, cova, e fa schiudere le radici nascoste ne' lunghi gambi; nè 'l frutto, che dal rinforzo del succo dalle giovani radici somministrato, compiasi, si avrebbe senza di un tale ajuto. *Questo*

Ho però non è prodotto dalle radici, ma dal gambo terpeggiante, il quale non ha dimostrato cosa di nuovo, sì nelle radici, come nel frutto, fuor di quello, che tenea dal seme, ond' egli è nato.

Ma questo istesso seme negletto, e questo coltivato gran tra di loro simili, e forse, che l' uno era miglior nutrito che l' altro, uno più forte, e l' altro più debole: Forse, che l' coltivato era il più forte; e può essere ancora, che fusse il più debole, e l' non curato il più forte. Ma o più forte, o più debole, che siasi, il coltivato reca sempre più, e l' non curato sempre meno; frattanto nella forte, e nella debole essenzial simile struttura, il seme dell' uno, e dell' altro aveva la sua piantuccia, la sua radicetta, e le due sue polpe; e così l' una, come l' altra avevano apparentemente le stesse origini.

Lunga pezza ho creduto, che un granello di formento non potesse pullulare più d' un gambo, ma poi ebbi tra le mani due cesti di grano, un de' quali conteneva più di 100 Cannellini, e l' altro più di 60.

Quello, che mi presentò questi cesti voleva per essi provare, che un liquore, in cui aveva immollati i due granelli della biada, donde, dicea egli, che detti due cesti eran prodotti, aumentava all' infinito la fecondità naturale del formento (lascio da parte la maniera della preparazione, e l' fatto, che in parte almeno può esser vero; poichè il Signor Abbate Gallois ne ha veduta alcuna prova, quantunque molto debole, in cui il granello rendeva otto soli, o dieci germogli) io per disseminare una tal moltiplicazione, avendo distrizzate le radici di quella molto intralciate, ho riconosciuto, che questi due grossi cesti facean veduta di un sol piede, per l' intreccio delle barbe della maggior

gior parte di dette radici ; in maniera che tutto l'ammasso di esse non era altro , che un composto di minori cesti . Ho intanto veduto molte di dette radici inseparabilmente unite , sicche non potei dividerle senza forza , e sveltendo l' une dall' altre .

Questo combaciamento poteva nascere dal semplice contatto delle radici ancor tenere , vicine , e premute l' une contro l' altre , tutto che ciascuna fusse divisamente pullulata dal suo granello di biada : Ma se questa sia una vera moltiplicazione del germe così numerosa , e se la preparazione sì la produca , egli ha molto del probabile , che questa umettazione di un unico granello con una sorte di liquore apra i doeci del germe contenuto nel grano , sicche , cadendo questi in un terreno ben coltivato , e sucoso , rinvenga ivi tutto il succo necessario per produrre qualche naturalmente deesi : E questo dà occasione a pensare , che indipendentemente da tutte preparazioni in ogni germe di formento , oltre al principal cancellino , che 'l luogo della polpa del seme direttamente scorre , ve ne siano molti altri laterali , disposti a germogliar quante volte dato succo soprabondi ; in maniere che avendo il principal germinoglio il bisogno , tutto il di più lo rifonda a' laterali . Quindi è , che oggi giorno ancora si tenga quell' uso degli Antichi , di menar gli Animali nelle Terre seminate , qualora si osservin molto infrondate , affinche questi pascendo le superchievoli , risparmino in ciascun piede di formento , o di altro seme , bastante sugo per nutrire la spiga principale , e vegetare ancora le laterali ; procurando evidentemente così la moltiplicazione de' germogli su di un solo piede , o almeno riparando alla cagione che

la

la potrebbe impedire (g).

Ho io prese le misure necessarie per assicurare mi di questo fatto, di cui rendo conto alla Compagnia; e mentre attendeva allo affare, il caso mi presentò un cesto di un *Gramen spicatum*, il quale manifestamente su di una radice avea 18 cannellini. Vidi inoltre presso del Signor Pretendente *Tambonneau* due piedi di quel formento, che G. B. chiama *Triticum spica multiplici*. Uno di detti piedi avea 26 cannelli, e l'altro 32; & era assicurato, che nel luogo, donde eran germogliati, non vi avevan piantato più che un granello per parte. Ciò posto, io credo, se non erro, che uno di detti due granelli sia stato piantato in luogo men favorevole dell'altro, se li vogliam credere ugualmente fecondi: Su di ciascuna spiga laterale vi eran 30 granelli, il numero delle quali essendo 9, faran la somma di 270: La spiga di mezzo ne avea 36; la somma intiera 306: 32 spighe ne anno 9792. *Plinio* * ammira 100 per uno intorno a *Babilonia* in un campo ben coltivato; e con ragione, perciocchè altro è il seminar biada ben folta in tutto un campo, che piantar due granelli in un terreno di Giardino ben netto, e largo.

Sembravami dunque molto probabile, che ogni grano, qual non è abortivo, o mostruoso, sia ugualmente fecondo in se stesso, & oso ancora dire l'istesso di ogni pianta annuale; e se così v'è la bisogna, per misurare a un da presso in generale la fe-

Memor. 1700.

N.

con-

(g). *Vergilio* fa menzione di tal cultura nel 1. delle *Georg.* *Luxuriam segetum tenera depalcit in herba: Ha ella corrispondenza col taglio di alcune erbe camangiare cennate sopra.*

* *Lib. xvii. cap. 47.*

condità assoluta di ogni seme di un istessa specie in detto genere di pianta annuale, converrebbe per lo men sapere quel che un individuo di detto seme, che ha reso più, abbia prodotto: Perciocchè se questa osservazione non facesse conoscere tutto ciò che possa detta pianta fare, almen potrebbe dirsi, che affatto non si sappia fin dove giunga la sua fecondità, e che apparentemente le altre abbiano in se stesse tutto ciò che bisogna per una ugual produzione. Ma non corre l'istesso per le piante durevoli. E' sì sà qualche il seme di una pianta annuale possa contenere, almeno quando è conto qualche un piede di detta pianta ben piantato e ben coltivato in un Anno fertilissimo abbia prodotto, giacche non oltrepassa tal tempo la vita di essa, & in un Anno dimostra tutto quello, che ella può rendere. Ma non par che possa saperli qualche possa fruttare una pianta durevole in tutta la sua vita, col calcolare strettamente: ciocchè ella men in una buona Annata; perciocchè può avvenire, che qualche non produce in una mala stagione, se lo riserbi, attendendo la migliore, e più favorevole per darlo fuori; in fatti è più che probabile, che ciò avvenga negli Alberi fruttiferi; ma non già quando un accidente, o una costituzione ineguale, e irregolata abbia fatto produrre i frutti innanzi tempo, e poi sopravvenga una costituzione contraria, cioè un subitaneo freddo, che li faccia abortire, e perire senzache possano germogliar nuovamente.

Donde si vede, che non possa affermarsi di ogni Albero, che sia ugualmente fecondo in se stesso in tutti Anni; ma può bensì dirsi, che ogni Albero di un istessa specie sia ugualmente a un da presso fecondo, in considerando tutto ciò, che possa produrre nel corso dell' intiera sua vita, cioè, che

che e' contenga un numero quasi uguale di principj, che devono successivamente svilupparsi, se 'l terreno, le stagioni, gli accidenti della vita, o un subitaneo caso non l'impediscono. Così per non ingannarsi su' la fecondità dell'Albero per tutta sua vita, bisogna il conto formare su' 'l piede più basso d'un Anno fertile.

Non può dunque darsi certo numero della successiva generazione attuale di esso, nè un regolato, e preciso conto; ma può ben ragionevolmente crederfi, che i meno fecondi contengono un numero altrettanto maggiore di principj involuppati, quanto minori son quelli, che an prodotti; e che ne' più fecondi il numero di detti involti principj sia infinitamente maggiore de' sviluppati. La quistione a sciorsi darà il soggetto per la seconda Memoria.

O S S E R V A Z I O N I

S U L L A

COSTRUZIONE DEGLI OROLOGJ A
PENDOLI.

D E L S I G. D E L A H I R E.

Quantunque impossibil sembri, che possa aggiungersi cosa alla costruzione de' grandi Orologj a pendoli, come oggi è, per render questi più perfetti, e più giusti nella misura de' tempi

N. 2

pi

1700. 22. Maggio.

condità assoluta di ogni seme di un istessa specie in detto genere di pianta annuale, converrebbe per lo men sapere quel che un individuo di detto seme, che ha reso più, abbia prodotto: Perciocchè se questa osservazione non facesse conoscere tutto ciò che possa detta pianta fare, almen potrebbe dirsi, che affatto non si sappia fin dove giunga la sua fecondità, e che apparentemente le altre abbiano in se stesse tutto ciò che bisogna per una ugual produzione. Ma non corre l'istesso per le piante durevoli. E' si sà qualche il seme di una pianta annuale possa contenere, almeno quando è conto qualche un piede di detta pianta ben piantato e ben coltivato in un Anno fertilissimo abbia prodotto, giacche non oltrepassa tal tempo la vita di essa, & in un Anno dimostra tutto quello, che ella può rendere. Ma non par che possa saperli qualche possa fruttare una pianta durevole in tutta la sua vita, col calcolare strettamente ciocchè ella meni in una buona Annata; perciocchè può avvenire, che qualche non produce in una mala stagione, se lo riserbi, attendendo la migliore, e più favorevole per darlo fuori; in fatti è più che probabile, che ciò avvenga negli Alberi fruttiferi; ma non già quando un accidente, o una costituzione ineguale, e irregolata abbia fatto produrre i frutti innanzi tempo, e poi sopravvenga una costituzione contraria, cioè un subitaneo freddo, che li faccia abortire, e perire senzache possano germogliar nuovamente.

Donde si vede, che non possa affermarsi di ogni Albero, che sia ugualmente secondo in se stesso in tutti Anni; ma può bensì dirsi, che ogni Albero di un istessa specie sia ugualmente a un da presso secondo, in considerando tutto ciò, che possa produrre nel corso dell'intera sua vita, cioè, che

che e' contenga un numero quasi uguale di principj, che devono successivamente svilupparsi, se 'l terreno, le stagioni, gli accidenti della vita, o un subitaneo caso non l'impediscono. Così per non ingannarsi sù la fecondità dell'Albero per tutta sua vita, bisogna il conto formare sù 'l piede più basso d'un Anno fertile.

Non può dunque darfi certo numero della successiva generazione attuale di esso, nè un regolato, e preciso conto; ma può ben ragionevolmente crederfi, che i meno fecondi contengono un numero altrettanto maggiore di principj involuppati, quanto minori son quelli, che an prodotti; e che ne' più fecondi il numero di detti involti principj sia infinitamente maggiore de' sviluppati. La quistione a sciorsi darà il soggetto per la seconda Memoria.

O S S E R V A Z I O N I

S U L A

COSTRUZIONE DEGLI OROLOGJ A
PENDOLI.

DEL SIG. DE LA HIRE.

Quantunque impossibil sembri, che possa aggiungersi cosa alla costruzione de' grandi Orologj a pendoli, come oggi è, per render questi più perfetti, e più giusti nella misura de' tempi.

N° 2

pi

1700. 22. Maggio.

pi, pure vi riman luogo per alcune osservazioni, che pottebbon giovare alla correzione di certe ineguaglianze che s'incontrano.

Primieramente e' sembra, che farebbesi potuto sospendere la verga del Pendolo ad una picciola laminetta a molla invece della seta, per ischivare gli accidenti che' occorrono con quella, come è il dilungarsi per la gravezza del peso, che se li attacca, e principalmente quando il tempo è asciutto, e per lo contrario il raccorciarsi quando è umido, come li sperimenta in tutti fili, e corde, che vengon composte da molti filetti insieme attortigliati; Perciocche l'accorciamento, o l'allungamento della seta, accortando, o allungando il pendolo, renderà più celere, o più tardo l'Orologio. Potrebbe ancor aggiugnere, che in ciascuna vibrazione faccia la seta un picciolo piego in quella parte, ove ella è attaccata alla verga del pendolo, per lo sforzo, che fa la forchetta, d'intrattenere il movimento di esso. Ma la sperienza, che da qualche Anno ho fatta di una molla adattata alla verga del pendolo in luogo della seta, mi ha dimostrato, che soggiaccia ad irregolarità molto più considerabile di qualche con la seta soggiacea; qual cosa non ho potuto rifonderé ad altro, che alle differenti alterazioni della molla nel freddo, e nel caldo, quali rendano simiglianti corpi più, o meno resistenti, cagionando molti notabili cambiamenti; perciocche quanto più una molla è rigida fa più spesso le vibrazioni, e quando è molle le fa più lente. Fur dunque astretto di levar da un gran Pendolo a' secondi la molla, che sostenea la verga di esso per rimettervi la seta, e così non osservai più le irregolarità di prima; donde mi ricredei, che queste addivenivano dalla molla.

Se

Secondamente ho io considerato, che se in un pendolo a mezzi secondi, dove l'irregolarità non farebbero sensibili, si attaccasse ben ferma la picciola lamina della molla A alla verga del pendolo, potrebbero renderli per questo mezzo simili Orologi più portatili di quel che non sono per l'ordinario con la seta ne' viaggi per mare, e ne' molto lunghi, quali potrebbero giovare per lo conoscimento delle longitudini, perciocchè nell'ordinario barcollare di un Vascello il pendolo si sosterrrebbe di per se, e nelle sue vibrazioni non sarebbe tanto interrotto, come quando egli è sospeso alla seta.

Ma se in vece di una lamina a molla A adatta per lungo alla lunghezza dell'Arbore, si sospendesse un pendolo ad una verga dura, e ferma, la di cui lunghezza segasse perpendicolarmente l'asse dell'Arbore, in cui fusse ella congegnata; allora il moto del pendolo guiderebbe intieramente il movimento dell'Orologio.

In fine se un pendolo a secondi, per isfuggire gli accidenti della seta, e della molla, si appendesse, come pur ora si è detto, ad una ferma, e dura verga, la quale fusse congegnata, & appiccata solidamente in un picciolo Arbore particolare A, che si movebbe liberamente su de' suo' perni, l'Arbore delle Palette, che sosterrrebbe la forchetta, potrebbe imprimere il moto al pendolo per lo mezzo di detta forchetta, la quale essendo governata dalle vibrazioni del pendolo, rettificherebbe il movimento dell'Orologio. Son persuaso, che questa maniera di adattare il pendolo agli Orologj sarebbe migliore di quelle, che si tengono. E' bisognerebbe, che l'asse del perno A fusse nell'istessa linea retta con quel dell'Arbore, che ha seco le Palette, per

evitare il sfregamento della Forchetta lungo la verga del pendolo, locche necessariamente avviene a que' pendoli, che an delle Cicloidi, ne' quali lo sfregamento cagiona una notabile ineguaglianza nel moto, quando l'olio, che in detta parte si pone, si addensa, o che vi si generi un poco di ruggine. Mi si potrebbe opporre, che le vibrazioni del pendolo d'inequal lunghezza non si ridurrebbero ad uguaglianza, con tuttoche in tal costruzione non vi fusse sentor di Cicloide; potrei però rispondere, che coloro, i quali per lungo tempo e con diligenza an regolati Orologj grandi a pendoli, ben fanno, che le vibrazioni sono così uguali, che potrebbero non aver bisogno alcuno della Cicloide, tanto più se dette vibrazioni non abbiano una lunga distesa: Ma quando si volesse aver mira alle inegualità delle vibrazioni del pendolo in questa costruzione, spiegherò appresso il modo, come si debban correggere.

Si son fabricati alcuni pendoli, la di cui forchetta era piantata al di sopra delle Palette, che incontrava la verga del pendolo al di sotto del peso del pendolo in una parte della verga, che passava al di là del peso; ma questa costruzione è viziosa, nè può servire a grandi Orologj da fare osservazioni; perciocche essendo le vibrazioni di pochissima lunghezza, il peso del pendolo ha poco moto, e facilmente puol'essere arrestato, e disviato da una molto debole potenza; che perciò, comunicandoli i movimenti ineguali della forchetta al moto del pendolo, non puol'essere rettificato, e l'Orologio non sarà mai giusto; siccome alcuni de' nostri Accademici osservarono nell'agguaglio, in cui si posero questi Orologj con quelli, di cui per ordinario facciam uso. Ma poicché i grandi Orologj, che
fer-

servono per le osservazioni Celesti, si son ridotti in un punto di perfezione, dove non si sarebbe uom sognato di poter mai giugnere, vedendo noi sovente, che per lo spazio di più giorni di seguito essi non fallan mai dal moto uguale, che dinotano, anche d'un sol secondo di tempo; e converrebbe ancora di cercar modo di ridorre a tal regolarità que', che per ordinario si portano in borsellino; Per registrare il moto del Tempo, che ordinariamente è molto ineguale, si sono avvisati di adattarvi una picciola lamina a molla, che tendendosi, e rallentandosi, possa rettificarne il moto. Questo principio di regolarità è fondato sopra a che le vibrazioni delle molle poste in moto sono quasi vicinissime ad esser uguali, per lo meno allora che tali vibrazioni sono a un dappresso di ugual lunghezza.

Tosto si applicò a detti Orologi una picciola lamina a molla tutta retta, la quale essendo per una delle sue estremità ferma attaccata, nell'altra, che era libera, avea una picciola forchetta, che governava uno de' razzi del Tempo incontrandolo in una mediocre distanza dal suo centro per cui mezzo il moto di detto Tempo si era ridotto ad una spezie di uguaglianza per le regolari vibrazioni della molla; ma poicche la lunghezza di questa picciola molla non giugneva in tutto a due terzi del diametro della mostra, bisognava che fusse estremamente debole per aver le sue vibrazioni presso che uguali a quelle del Tempo; e se ella era sì debole, non poteva regolare l'ineguaglianza di questo, che deve fare circa quattro vibrazioni per ogni secondo di tempo. Si abbandonò dunque la molla diritta; e sostituissi altra di figura spirale, qual' occupa poco spazio, sebbene ella

fia di una lunghezza considerabile. L'estremità la più distante dall'occhio di questa spirale ferma, fu appiccata in due parti, per esser meglio sostenuta, e l'altra verso l'occhio conficcata nell'Arbore, che sostiene le Palette, e 'l Tempo, affinché il moto della molla, che vien trattenuto dal moto del Tempo, possa ugualmente comunicarli la sua regolarità: Quando però si disamini con diligenza il moto di detto tempo regolato da quello della lamina spirale, si vede, che li rimane ancora molto d'ineguaglianza; imperciocchè i movimenti delle Palette operando contro l'estremità della lamina spirale, e facendo de' sforzi per riguardo alla lunghezza del semidiametro dell'Arbore su la parte, ove detta molla è congegnata, dominano la molla, che ubbidisce, e cede all'ineguaglianza, come debole, e leggiera, e che non può resistere al moto del tempo; cosa facile a capirsi per quel che se n'è detto sopra in parlando de' gran pendoli sospesi ad una molla.

Ho dunque considerato, che'l moto della molla, debba essere necessariamente adattato su di una distanza un poco considerabile dal centro del Tempo per poter moderare con più forza i moti ineguali di questo, e perchè non se le comunichino le di lui ineguaglianze. Bisognerebbe dunque tagliar la molla in spirale molto lungi dall'occhio, & in detta estremità applicarvi una picciola forchetta, qual fosse congegnata in un de' razzi del Tempo, nella quarta parte di essi: & il Tempo dovrebbe essere sì fattamente allogato, che, qualora la spirale stasse in riposo, nè venisse dal Tempo premuta, il razzo, in cui è congegnata la forchetta, fosse perpendicolar sempre alla linea disegnata dal punto, ove è adattata la forchetta, qualora la molla
 si stri-

si stringe e dilata , affinché la forchetta avesse minor fregamento lungo il razzo del Tempo ; locche può vederli nella Figura , che si reca.

Ecco ancora un'altra maniera d'adattar una molla al Tempo di una Mostra ordinaria . Questa molla deve essere sottile , e piana , come quella delle spirali ordinarie , ma la figura ondeggiante , e le onde molto strette . Con tale avviso si ha una gran molla , che occupa poco spazio in lunghezza , sicche le sue vibrazioni possono esser lente senza occupare spazio maggiore . Le onde son formate secondo la lunghezza della lamina , che si adopra , donde fassi , che agevolmente possa sostenersi , quantunque molto lunga . Potrebbe ancora farsi più larga delle spirali ordinarie , perche potesse ella sostenersi più facilmente . Ho io sperimentato , che queste forti di molle piegate ad onde abbiano un grandissimo vantaggio sopra le altre , per essere più dolci , con maggior lunghezza , e perchè lo sforzo in ciascuna delle loro parti è poco . Non minore ancora è quello che portano sopra alle molle Elici , le quali sebbene sian ugualmente lunghe in picciolo spazio , nel dilungarsi però , e restringersi , non possono distendere le loro spire , senza che il filo , di cui si compongono , e formano , non si torca , e ritorca , donde si rovina facilissimamente per lo continuo moto ; locche non avviene in queste molle ondate , ancorche si facessero di un filo in vece della lamina , come quì ho supposto.

Per adattare detta molla ad onda al Tempo della mostra deesi rimpiantar ferma una delle di lei estremità alla lastra superiore della mostra , nell' istessa maniera , che si fa della molla a spira ; e l'altra estremità , termine delle onde , sostenuta da una picciola forchetta , si congegni in un de' razzi

del Tempo nella distanza quasi del quarto dal centro, come nella figura si osserva.

Per quel che riguarda alla maniera di accorciare, o allungare tal molla, perche si facciano le vibrazioni più cortè, o più lunghe, si praticherà lo stesso, che si suole nelle molle a spira, per mezzo di un picciolo freno attaccato ad una catenuccia, che scorre per un canale, per accostarsi, o discostarsi dal luogo, ove la molla è appiccata alla lastra della mostra.

Potrà farsi tal molla lunga, o corta, secondo il numero, e la grandezza delle sue onde, per far accordare le vibrazioni a' vicendevoli moti del Tempo; giacche questi due movimenti devono essere niente men che uguali, per rattenerli l'uno l'altro più facilmente.

Ecco frattanto in qual maniera possa rettificarsi il moto del pendolo, non sostenuto dalla seta, ma congegnato fermo con la verga, che'l sostiene col perno, sù di cui si muove, come pocanzi io proposi.

Sia AB la lunghezza del pendolo dal punto, donde egli è appeso A , sino al centro B del peso totale, quale io suppongo esser quello di oscillazione; convien perciò, che 'l moto si faccia per una Cicloide, come il Sig. *Huygens* ha stabilito. Dal centro B io descrivo, facendo raggio BA , il circolo AD ; & avendo segato AB in due parti uguali in E , io tiro EF perpendicolare sopra AB , la quale sia base di una Cicloide AGF , che ha per diametro del suo circolo generatore la grandezza EA ; che farà il suo asse.

Sia frattanto AH la curva descritta per la rivoluzione della Cicloide, cominciando a svilupparsi dalla sommità A ; e sia parimente la Cicloide
di

di BIF formata per la rivoluzione della Cicloide AGF, qual cominci a svolgersi sù la base in F.

Io dico, che 'l perno, qual deve sostenere la verga del pendolo, debba esser cavo per di sotto della figura circolare AD, e che debba muoversi sù la parte convessa della curva AH. Non fo parola sù la maniera di applicare detto perno, e quel che 'l sostiene, perche non vi sarà difficoltà, e poco egli importa, che la parte concava giri, o strucciolì sù la convessa AH, perciocche il punto B si ritroverà sempre nella Cicloide BIF.

La dimostrazione di tal costruzione dipende dalla natura delle curve descritte per rivoluzione: Perciocche egli è certo, che se la linea retta AB giri applicandosi sù la Cicloide AGF, la sua estremità B descriverà la Cicloide BIF, e l'estremità A la curva AH; e che questa linea AB sarà in tutte le sue posizioni differenti, come IGH perpendicolare da due bande a ciascuna curva BIF, & AH.

Ma qualora un tal punto, che si vorrà D, del circolo AD, sarà applicato sopra la curva AH nel punto H, il circolo, e la curva si toccheranno in questo istesso punto H, e la linea HGI tirata da detto punto H per tangente della Cicloide in G, essendo perpendicolare alla curva AH, & al circolo, sarà uguale a BA, secondo la descrizione del circolo; & in conseguenza l'estremità I di detta linea converrà col punto B posto in I sopra la Cicloide, quantunque la verga AB si ritrovi allora in alcun'altra posizione, come AR; perciocche non importa, che 'l punto D del circolo AD, per riguardo al punto A, a cui è appiccata la verga del pendolo, si ritrovi in H sù la curva AH, perciocche tutte dette linee saran razzi di un'istesso circolo.

Ma

Ma poiché questa maniera di perno incavato potrebbe sembrare di difficile esecuzione, io dico, che potrà egli farsi d'infinite figure differenti convesse, o concave, e tali, che li vorranno, locche determina nello stesso tempo la figura della curva, della buca, o sostegno, su di cui si muove, e questo sarà facile a farsi, secondo i metodi, che ho dati nel mio trattato *Des Epicycloïdes*.

D E' V A S I
ONFALOMESENTERICI
DEL SIG. DU VERNEY.

NUna cosa più piacevolmente adula la mente dell'Uomo, quanto le nuove scoperte; e niuna, dove più facilmente un'Uomo prende sbaglio nell'istesso tempo che immagina di aver isvelata qualche verità fino allora sconosciuta; appassionato per un sistema di cui ne sia l'inventore, non trascura cosa alcuna per stabilirlo; se non li suppongon fatti per assodarlo, si propongono almen tali a se stesso, che an'assistenza nella sola prevenzione. Quindi è, che tutto lo studio delle Società dee dirizzarsi a rimettere lo spirito umano in buona strada, che sarà il maggiore di tutti i vantaggi, che'l Pubblico potrà ritrarre dalle loro conferenze. Essendo un Notomista della Compagnia caduto in questo disordine, col formar un sistema de' vasi Onfalomesenterici dato già alla luce tutto appoggiato su di fatti

16. Giugno 1700.

fatti immaginati contr'al vero, ho stimato bene distruggere la supposizione con la vera dimostrazione dello stato di detti vasi.

Vi son dunque due vasi Onfalomesenterici in tutto il Feto, che anno una quarta membrana.

Questi vasi consistono in una vena, & un arteria.

L'Arteria, che si vede comparire verso il centro del Mesenterio del Feto, ha la sua origine dalla Mesenterica superiore, e passando per traverso della Gangola chiamata *Pancreas Asellii*, v'è diritta all'ombelico, senza scompartir ramo alcuno, & esce di là fuor del ventre per iscaricarli nel cordone. Non essendo la rimanente distribuzione di essa propria per questo argomento, la rimetto ad altra occasione.

La vena ha la sua origine nella quarta membrana, & è formata da un numero infinito di piccioli rami, che si riuniscono in un sol tronco, che accompagnando l'arteria, vien con essa a metter capo nel cordone, e, senza gettar rami, v'è a passare per di sotto al duodeno, per impiantarli nel tronco della vena porta.

Questi due docci si ritrovano dunque compresi nel cordone con gli altri vasi ombilicali, non dividendosi, che nella distanza di circa tre dita dall'ombelico per distribuirsi nella quarta membrana in un numero infinito di rami.

L'arteria, che tutta per traverso passa per lo *Pancreas Asellii*, non ha comunicazione alcuna con detta glandola, come facilmente ogn' un può assicprarsene per mezzo del soffio, o dell'iniezione.

Questa semplice descrizione distrugge intieramente i fatti dal Notomista supposti, cioè 1, che questi vasi non abbiano comunicazione immediata con

con le vene, o con le arterie del Mesentero, e che siano dell' istessa consistenza. 2. Che sempre vadano a terminare ne' corpi glandolosi, e soprattutto nel *Pancreas Asellii*. 3. Che le arterie ombilicali scompartiscano rami alla quarta membrana.

L'uso in fine, per cui destina detti vasi Onfalo-mesenterici, è intieramente falso, allora che egli afferma, che posson portare alle glandole del Mesentero il sugo laticinoso, e nutricevole, dalla quarta membrana; poicche secondo la nostra dimostrazione si vede, che detti vasi non abbiano comunicazione alcuna con questa glandola. La maggior parte degli altri fatti contenuti in detta Opera, che si aggirano sù di simili supposizioni, cadono di per loro, perlocche lascio a più minutamente disaminarli.



ESTRAT.

E S T R A T T O

D I A L C U N E L E T T E R E

*Scritte da Portogallo e dal Brasile dal Sig. Couplet
Figlio al Signor Abbate Bignon Presidente dell'
Accademia Reale delle Scienze.*

E Ssendo stato ancor molto giovane ricevuto nell' Accademia Reale delle Scienze dopo di aver assistito per alcuni anni alle Assemblee, ho stimato non dover differir più lungamente di metter in opra quel pensiero, ch' i' avea di viaggiare; perche non fusse di poi questa la occasione di farmi interrompere il corso de' mie' studj in una età più avanzata. Sarebbe stata mia prima mira il viaggio dell'Indie Orientali per far far ivi alcune osservazioni de' Satelliti di Giove, e d'eterminar le longitudini; ma avendo considerato, che i Reverendi Padri Gesuiti mandati dal Rè in Oriente ne avean fatto un numero considerabile, che con tutta perfezione facean conoscere i principali punti di questa parte del Mondo; & allo 'ncontro essendo pochissime quelle delle coste dell'Indie Occidentali, e che un viaggio per dette parti sarebbe più utile a' progressi della Geografia, presi l'occasione dalla partenza del Signor Presidente Renville Ambasciadore in Portogallo per passare con lui in Lisbona. Mi trattenni ivi alcun tempo per apparar la lingua, su l'idea, che mi gioverebbe per lo viaggio dell'Indie; & avendo indi ritrovata occasione di andare nel
Bra-

7. Maggio 1698.

Immersione totale del primo satellite nell' ombra
di Giove osservata

In Parigi ad ore 11 9' 21" della sera

In Lisbona ad ore 10 17' 30"

La differenza de' Meridiani è di ore 0 51' 51";

Che monta a gradi 12 57 45"

ne' quali Lisbona è più orientale di Parigi.

Supponendo la longitudine di Parigi di soli
21 gradi, siccome senza difficoltà può creder-si,
quella di Lisbona sarà di 88 2' 15"

Questa differenza di Meridiani tra Parigi e
Lisbona è maggiore nelle Carte di Sanfon, che 30
Anni sono di comun voto eran tenute per le mi-
gliori. Apparisce ancora in esse Lisbona più oc-
cidentale di quel che nelle nostre osservazioni si ri-
trova, in 02 52' 15", che si uguagliano a 16 in 17
leghe in questo parallelo.

Le nuove Carte Marine allo 'ncontro impres-
se per ordine del Re sei Anni sono fanno Lisbona
meno occidentale di quel che le nostre osservazioni
additano in 27' 45" di grado, che si agguagliano
a 9 leghe: Così la distanza tra li Meridiani di
Parigi e di Lisbona notata nelle novelle Carte
marine, è differente da quella delle Carte di San-
fon in un grado e 20': L'ocche è considerabile, es-
sendo più del decimo della loro vera distanza, che
dalle nostre osservazioni risulta.

Latitudine di Lisbona.

Per quel che riguarda alla latitudine, offer-
vandosi ella agevolmente, non può cadervi errore
Memor. 1700. O sì

sì di facile , purché gli strumenti siano di una grandezza ragionevole . Le osservazioni fatte da me della latitudine di *Lisbona* serviranno a confermar quella , che nelle nuove Carte marine si avvisa ; ma quella di *Sanfon* nella sua Carta particolare di *Portogallo* dell'Anno 1654 , che la fa di 38g 27' è sì lontana dalla vera latitudine , che ogn'unb senza ingannarsi può scorgerla ; anche in una Carta generale di Spagna, ch'egli dopo ha pubblicata, l' ha tutto in un colpo accresciuta di 23. minuti.

Sù 'l fin di Dicembre 1697. osservai la stella Polare con Istrumento di un piede e mezzo di raggio armato di Cannocchiale con fili , e ritrovai in *Lisbona*

La più grande altezza meridiana della stella Polare —————	41°	5'	40"
Il più grande abbassamento dell' istessa —————	36	28	0
La differenza delle due altezze è	4	27	40
La metà di questa differenza è	2	18	50
Aggiungendo questa semidifferenza con la più picciola altezza della stella Polare , si avrà per altezza apparente del Polo —	38	46	50
Dalla quale sottraendone la refrazione convenevole —————	0	1	25
Resterà —————	38	45	25
per altezza vera del Polo di <i>Lisbona</i> .			

Dichinamento della Calamita in Lisbona.

A 26 dell' istesso mese di Dicembre 1697 osservai in *Lisbona* il dichinamento di un Ago calamita.

mitato 6 dita lungo per mezzo di una linea Meridiana, che alcuni giorni avanti avea io con infinita esattezza designata, e la ritrovai di 4^{te} 18'.

*Differenza della lunghezza del Pendolo in Lisbona,
& in Parigi.*

Prima di partir da *Parigi* avea io regolato un mio Orologio con quello dell' Osservatorio Reale nel mese di Luglio, e principj di Agosto del 1697, ponendolo nel moto medio, in cui risette egli per tempo molto considerabile, affine di assicurarvene: Avendolo rimesso nell' istesso stato, nel mese di Novembre seguente io li diedi il moto in *Lisbona*, & osservai, che ritardava 21' 23" in 24 ore: e poicche avea fatta pruova, coll' innalzare il picciolo peso quanto mai potea alzarfi, che egli non accelerava il moto del Pendolo più di un intero minuto, locche non bastava; mi diliberaï a raccorciarlo, e dopo molti cimenti conobbi, che 'l Pendolo dell' Orologio in *Lisbona* dovea esser più corto due linee e mezza, che in *Parigi*.

Latitudine di Paraibé.

Poicche il Cielo spesso era coperto m' intrattenni più di un mese a regolare il mio Orologio, essendomi convenuto di far molte osservazioni per avere la lunghezza del Pendolo; e frattanto io misurai più volte l' altezza del Sole, donde conchiusi, che questa Città avea 6^{te} 38' 18" di latitudine meridionale.

Declinazione della Calamita in Paraibe.

A 20 Maggio 1698 avendo prima con tutta diligenza tirata una linea meridiana, di cui mi servij per l' osservazioni Astronomiche, avvisai la declinazione dell' ago Calamitato di $5^{\circ} 35'$ da Maestro.

Differenza della lunghezza del Pendolo in Paraibe, & in Parigi.

Allorche io giunsi in *Paraibe* nel mese di Marzo 1698 ebbi principal cura di regolare il mio Orologio, e di riporlo esattamente nel moto medio, sì per conoscere la differenza della lunghezza del Pendolo, come per disponermi alle osservazioni de' Satelliti di Giove, per determinare la longitudine di questa Città. Sù le prime rimisi il mio Pendolo nello stato, in cui era, quando io partij da *Parigi*, dandoli il moto; e rinvenni, che tardava dal suo mezzano moto $4'' 12''$ in 24 ore. Raccorciai dunque il Pendolo più volte, & avendolo in fine regolato sù 'l moto medio, conobbi, che questo doveva essere più corto in *Paraibe* 3 linee e $\frac{2}{3}$ di quel di *Parigi*.

Ritornai dopo quest' istesso Orologio nello stato, in cui era, quando me n'era servito per far le mie osservazioni in *Lisbona*, dove io l' aveva regolato sù 'l moto mezzano, & avvertij, che in questo stato era più tardi in *Paraibe* di $2'' 5''$ in 24 ore. Donde si avvisa, che 'l Pendolo deve essere accortato a proporzione che si avvicina alla linea.

Non posso riandare le osservazioni Astronomiche.

miche fatte in *Paraibe* senza risovvenirmi di un accidente , che mi accadde nell' istesso tempo; quale , perche io stimo che Autore giammai di simigliante cosa abbia fatta parola , non sarà disagevole di qui vederlo .

Evvi nel *Brasile* una specie di Serpente lungo due piedi , e di 3 o 4 dita di circonferenza ; che chiamano i *Portughesi* Serpenti a due teste , non perche abbia egli in fatti due teste , come dopo di averlo disaminato riconobbi , ma perche nel fin della coda ha una grossezza , che da lungi fa veduta di testa . Que' del *Brasile* , ovvero *Mazombes* , e dopo essi i *Portughesi* l' an creduta per testa , tanto più facilmente , perche anno un estremo timore di questa specie di Serpente , al di cui morso stimano essi , che non vi sia rimedio alcuno: credono ancora , che sia pericoloso il toccarlo dopo sua morte , donde forse è addivenuto , che non se ne sia fatta disamina . Mi avvertirono , che 'l solo toccamento tagionava la rogna , qual avviso salutare io non curai , riguardandolo come un effetto della loro timidezza ; fui però punito della mia temerità ; perciocche avendo ammazati molti di questi , alcuni ne scorticai , per esaminarli , e conservarne la pelle ; ma due , o tre giorni dopo mi ritrovai in fatti tutto coperto di pustule ripiene di un acqua rossa , quali mi durarono lungo tempo , e fino a tre mesi appresso non ne guarì intieramente .

Il Paese abbonda di tali Serpenti di straordinaria grossezza , avendone io ammazzato coll' archibulo nel Bosco tra *Paraibe* , e *Pernambouc* uno che era lungo 15 piedi , & avea 16 , o 18 dita di circonferenza : Era egli tutto coperto di squame nere , bianche , grigie , e giallicce , che tutt'

insieme facevano una molto bella veduta: La morsicatura di questi è venenosa; e pure i *Brasilesti* & i *Neri* non an difficoltà di mangiarne la Carne. Questo non deve sembrar più stravagante di quello, che si osserva nella *Manique*, la di cui farina è comune alimento nel Brasile, e pure il sugo di essa è un veneno, come io sperimentai su di un Cane, a chi ne feci bere verso le 8 ore della sera meno di un mezzo bicchiere: L' osservai per alcun tempo senza cambiamento sensibile; nella sera lo rinchiusi, e nel mattino appresso lo ritrovai morto. Avea fatto un' infinità di altre osservazioni Filiche, quali si son perdute con le mie Memorie, quando io feci naufragio.

N U O V A

M A N I E R A

DI RENDERE I BAROMETRI LUMINOSI

DEL SIG. BERNOULLI PROFESSORE IN GRONINQUE.

Estratto di una delle sue lettere scritta da Groninque il 19 Giugno 1700.

A Vendo letto in un picciolo libro, che ha per titolo: *Trattato de' Barometri e Notiometri*, ovvero *Igrometri*, lo straordinario Fenomeno, che nel 1675 avvisossi a caso nel Barometro del Signor *Picard*, cioè un interrotto lume nel moverli l' argento vivo, mentre era trasportato il

Ba-

Barometro da un luogo all' altro per una grande oscurità, di cui si fa menzione ancora nella prima edizione dell' Istoria latina dell' Accademia pag. 312; l' ho io giudicato degno di riflessione, tanto più, che l' Autor di questo trattato invita i curiosi a perfezionar questa scoperta; mentre o' nell' esperienze, che ne avea fatte sù di molti altri Barometri, per vedere se avvenisse lo stesso, uno sol ne rinvenne, quale simigliava a quello del Signor *Picard*; e questo apparentemente era quello del Signor *Cassini*, in cui disse il Signor *Duhamel* esserli osservato l' istesso effetto, quantunque non così sensibile come nell' altro. Io dunque mi applicai a tal inchiesta; e dopo alcune meditazioni sù di tal argomento fatte, accompagnate con delle sperienze necessarie, veduto l' evento di queste corrispondere al mio desiderio, e similmente al ragionamento fattovi *a priori*, sembrami di aver iscoperta la vera cagione di tal fenomeno, e la maniera di far comparire un lume molto vivo in tutti i Barometri, senza distinzione di tempi, e di luoghi: sicche può egli tenersi per una nuova spezie di Fosforo perpetuo, che non si consuma, come quelli, che con l' opera chimica si formano.

Prima di far parola del mio ragionamento, devo dirvi, che nell' istessa sera, in cui lessi detto Fenomeno nel picciolo Trattato, mi venne voglia di farne il saggio sù del mio Barometro, che fin da quattro settimane era stato alle pruove; lo trasportai dunque in un luogo oscuro, e con leggier barcollamento sù le prime agitandolo, non v' osservai il minore lume; ma avendolo in fine con violenza scosso (locche poteva fare senza il pericolo di rompere il doccio, o di versar l'

argento vivo , essendo detto doccio quasi congegnato in una tavoletta , e 'l Mercurio di sotto , rinchiuso in una scattola di legno attaccata alla tavoletta da per tutto chiusa , sicche l' aere potea premere sù l' argento vivo solamente per mezzo de' pori del legno) , osservai , che qualora il Mercurio (levandosi , & abbassandosi con molta velocità lungo il doccio) era tutto a basso , gettava un lampo molto debole , quale svaniva tosto che l' argento vivo cominciava a risalire . Questo se pensarmi , che le conghietture recate dall' Autor del Trattato per render ragione perche detta luce in un solo Barometro si fusse veduta , cioè , che gli altri non *fussero essi stati per lungo tempo alla pruova* , non potessero aver luogo ; poicche del mio n' aveva fatta sperienza per sole quattro settimane .

Dopo di una tale sperienza mi venne voglia di rindare le altre conghietture dell' Autore . Dice egli , che gli altri Barometri non abbian prodotto l' istesso effetto , o che essi non fossero bastantemente voti di aere , o che nell' argento vivo alcuna picciola porzion di esso si contenesse . Per ricredermene , dopo di aver diligentemente depurato il Mercurio , col farlo passare a forza pe' pori del camoscio , lo posi in un recipiente , donde ne tirai l' aere , lasciandolo ivi per 24 ore per darli tempo a far isvaporare le particelle di aere in esso tramischiate . Dopo di averlo così purgato ne riempj un cannellino con tutta la possibil cautela , per impedire , che alcuna picciola bollicella di aere vi rimanesse ; ma questo Barometro così apparecchiato non produsse egli l' effetto , che si attendeva : Perciocche appena , per qualunque violento barcollare del Mercurio , potei ricavar-

ne

ne un debole lume, che appariva, e quasi all'istante s'vaniva.

Ritenni il Barometro così apparecchiato per uso ordinario per non perdere, in scomponendolo, la cura, & affanno, ch' io ebbi nel formarlo con tanta esattezza; ben sicuro, che così il voto del doccio, come l'argento vivo erano sceveri da minimo d'aere grossolano.

Conchiudei dunque da questa seconda speranza, che le altre conghietture dell' Autore fossero dell' istesso peso, o per lo meno, che nè la purificazione del Mercurio, nè il voto perfetto della parte superiore del doccio, fossero la principal cagione dell' apparimento di tal lume.

Et essendo così, mi diedi alla ricerca della vera; & ecco come io mi son guidato nel raziocinio. Poiche il lume non appariva in ogni barcollare, ma allora, che 'l voto si faceva, cioè nel solo calare dell' argento vivo, credei, che qualora questi scendesse, sorgesse da lui, e nell' istesso istante levasse una materia delicatissima, e sottilissima, per occupare, e riempire in parte lo spazio della doccia, che il Mercurio lasciava: Dico in parte, perche bisogna ben credere, che essendo i pori del vetro più ampi di quelli dell' argento vivo (come la leggerezza dell' uno, e 'l gran peso dell' altro dimostrano) entri nell' istesso tempo per i pori del cannellino altra materia ben più sottile dell' aere grossolano, minore però in questa parte di quella, che vien fuori dal Mercurio: Or queste due materie mescolandosi incontinente, riempiono lo spazio, che col calare cede loro l' argento vivo. Poco monta il determinar il nome, che si voglia a dette due materie dare: Potrete, se vi aggrada, chiamarle col Signor Descar-

ter, quella, che penetra i pori del vetro, materia del secondo elemento, o globetti celesti; e quella più sottile, che dal Mercurio viene, materia del primo elemento. In fatti detto Signore ha molto ben dimostrato ne' suo' principj di Filosofia *part. 4. art. 58*, che le particelle de. l' argento vivo lascino tra di loro angoli così stretti, che non possono riempirsi, che da materia la più raffinata, cioè da quella del primo elemento.

Sapete voi come spieghi il Signor *Descartes* la produzione della luce, rifondendola tutta al rapido moto della materia del primo elemento raccolta sola in alcuno spazio, & allo sforzo, che fa ella su de' globetti celesti. Dico dunque, che mentre le particelle del primo elemento son disperse tra questi piccioli interstizj, e quasi oppresse dalle parti terrestri dell' argento vivo, non possono esse acquietare tal rapido moto, nè urtare, e fare sforzo unito per produrre la luce; tosto però che col calar dell' argento vivo in copia da questi escono, insieme si accozzano, e scivere da tutte altre materie prendono alle prime quel rapido corso, che è proprio di esse qualora son libere; e per lo sforzo, che fanno su de' globetti celesti che incontrano, producono detto lume. Quindi si vede la ragione perche tal luce si offervi nel solo abbassarsi del Mercurio; perciocche quando egli risale, non solo detra materia del primo elemento da lui non esce, ma più tosto una porzione di quella, che n'era uscita nel suo precedente abbassamento, vi rientra, & il rimanente è spinto co' globetti celesti fuori del doccio per i pori del vetro. Questa ancora è la ragione perche detto lume tiegua la parte superiore del Mercurio che discende, come se e' fusse attaccato alla di lui

superficie superiore; perchè la luce prodotta non sia durevole; e perchè finito l'abbassamento detto lume s'vanisca, e tosto si estingua. Perciò che le particelle del primo elemento, essendo unite nell'uscir dal Mercurio, & avendo fatto adcorche picciolo cammino in discostandosi dalla superficie di esso, son tosto dissipate, e disperse dall'accorrimiento de' globetti celesti, che l'opprimono co' loro empiti, e li scemano così il vigore per produrre l'effetto della luce; in maniera che dura questa a misura, che dal Mercurio venga fuori continua, e nuova materia, che succeda a quella, che si continuamente dissipa, poco men come la fiamma di una candelà, che in ogni momento distruggendosi si rinnovella. E' egli dunque chiaro, che 'l lume, di cui è quistione, non abbia maggior durata di quella, che porta l'abbassamento dell'argento vivo.

Mi rimane a dimostrare la principal cosa, cioè perchè tal lume non si veggia in tutto 'l Barometro, e perchè finora non ha stato osservato, che in due, o tre; come ancora il modo da farsi, che infallibilmente egli apparisca in ogni Barometro, & in tutti i tempi, e con una vivezza sorprendente, purchè si faccia in un luogo molto oscuro: L'uno e l'altro rinforzando confermeran perfettamente le ragioni, di cui mi son servito nello spiegamento dato su la cagione di detto Fenomeno.

Ho io avvisato, che se si esponga l'argento vivo in alcun vaso all'aere libero, dopo qua che tempo si rinverrà la di lui superficie, che vien toccata dall'aere, tutta oscurata, e ricoperta da sottil pellicina, qual tolta con monda piuma, ritornerà la prima chiarezza alla superficie, e di nuovo
fa:

farà egli come uno specchio forbito; ma se si lascia detto argento esposto all' aere, tosto un'altra simil pellicola, come tela di ragno, che si addensa col tempo, si distenderà sopra essa, la quale esaminata col Microscopio, si vedrà molto simile all'argento in foglio battuto: In fatti ella non è altra cosa, che una finissima tessitura l'una specie di lanugine, o spuma, che si forma da piccioli filamenti, li quali essendo stati divisi dall' argento vivo per l'agitazion continua dell'aere, nè potendo intanto seguire il suo moto, ricadono con altre lordure, che son sempre nell' aere, sù la superficie di esso, & intrecciandosi a poco a poco compongono detta pellicina. Osserviam noi l'istesso in tutte sorti di liquori, li quali se si lascino in maniera, che l'aere le possa disseccar per di sopra, si ricuperano in fine di una pelle più, o meno densa, secondo la natura de' corpi, che si esalano, e ricadono indi sù l'istesso. Avendo ben considerato tutto ciò, dico, che da questa pellicella addivenghi il non apparire il lume ne' Barometri riempiti nella maniera ordinaria, & ecco come io concepisca l'affare. Qualora si formi il Barometro, prendesi un Cannellino sigillato ermeticamente per una parte, e per l'altra si versa dell' argento vivo, che cade a goccia a goccia lungo detto doccia, in maniera, che penetrando ciascuna goccia, e rompendo l'aere da alto a basso, ne sugga, per così dire, e s'imbeva di tutto ciò, che egli ha d'impuro; donde fatti, che in un momento, qual s'impiega a scorrere la lunghezza del doccia, l'argento vivo si riempia di detta impurità più che se fosse due o tre giorni semplicemente esposto all'aere. Quel ch'io dico è sì vero, che se facciali cadere dall'altezza di un piede solamente una goccia di Mor-

curio il più pulito e netto, che sia possibile, in un vaso, in cui siavi parimente altro depuratissimo, sicché la di lui superficie sia limpida, e chiara, come quella di uno specchio; voi vedrete, che la goccia cadendo su di questa superficie l'oscurerà in quel luogo, ove entrerà nella massa dell'argento vivo, lasciandovi una macchia visibile; segno certo, che detta goccia, tutto che netta, era stata infettata dall'impurità dell'aere, donde le gocce del Mercurio versate nel cannellino in scorrendo per esso si ricuoprano di detta pellicula; per lo cadere però, e 'l piombare che l'une fan su le altre, e per la pressione dell'argento vivo, dette particolari pelliccine facilmente si rompono, per adattarsi, e dar luogo alla continuità di detto Mercurio; nè potendoli dette lordure acconciare nè al moto, nè alla figura delle particelle Mercuriali, son costrette come escrementi a sequestrarsi fuori della sostanza intima dell'argento vivo, e mettersi a fianchi da per tutto tra la superficie concava del doccio, e la convessa del Mercurio. Ecco dunque tutta la colonna mercuriale involta da detta pelle delicatissima, come l'epidermi. Ferma-mente egli è molto verisimile, che si vada la faccenda, come io la penso; perciocchè essendo ripieno il doccio, come sopra, se si rovesci per formarne il Barometro, oppilando l'apertura con la punta del dito finattanto, che e' sia immerso nell'argento vivo contenuto nel vaso, si osserverà, ritirando il dito, che 'l Mercurio discendendo nel doccio lascerà dietro di se reliquie di detta epidermi attaccate a lati del vetro della parte vota del cannello in forma di spuma di piombo fonduto.

Non è dunque difficile il concepire, come, essendo fatto il Barometro, la superficie orizzontale,
e fu-

è superiore del cilindro Mercuriale venga ad esser coperta da una pellicula più densa di ogn'altra parte della superficie di detto cilindro, ingrossandosi ella in parte da dette reliquie, che erano rimaste attaccate alla parte vota del cannello, quali in fine distaccandosi ricadono sù la sommità della colonna mercuriale; & in parte da quelle, che son di sotto spinte in alto dal peso del Mercurio.

Per ultima conclusion dunque mi basta dire, che questa pellicina, che occupa la superior parte del Mercurio, quantunque a' nostri occhi dilicata apparisse, ferra sì bene i pori della superficie dell' argento vivo, che chiude, o intieramente, o in gran parte, il passo alla materia del primo elemento, che sola col suo slanciare può produrre il lume: Donde liegue, che ne' Barometri formati ordinariamente affatto egli non si vegga, o ben poco, a forza de' grandi barcollamenti, come nel mio, di cui sopra ho fatto parola. Non dee parere strano, che una sì dilicata, e sottil pellicula possa impedir l'uscita per i pori dell'argento vivo alle particelle del primo elemento, almeno di non farle scappar via in copia e con veemenza; poicché noi vediamo tutto giorno, che 'l Mercurio istesso agevolmente passa per i pori delle pelli di quasi che tutti gli Animali; non però allora quando detta tenera macchia, che i Medici dicono epidermi, o cuticula, non si divide: E perchè dunque non può avvenir l'istesso nel caso nostro, e qual contradizione vi è?

Così io ragionava sù di un' effetto cotanto strano: E poicché niuna cosa meglio assicura, che ne' ragionamenti fisici non si vadi errato, quanto l'esperienze, che indi a bella posta si fanno, se vadan esse di accordo con le conclusioni, che si son
di

didotte col solo raziocinio; ascoltate per vostra cortesia le già fatte, e vedete se giammai ragionamento *a priori* fù confermato in tutte le sue circostanze dagli eventi dell' esperienze, quanto il mio, che se icemente con esse si è incontrato: Perciocchè in conseguenza delle ragioni il lume de' Batometri è vigorosissimo qualora s'impedisca, che la colonna del Mercurio non si cuopra di detta epidermi: Per ciò fare ho io avvisato due maniere, e tutte due ottimamente mi son riuscite.

Ecco la prima. Presi un doccia di vetro lungo circa tre piedi e mezzo, e per tutte due le bande aperto, quale io con tutta diligenza pulii, perchè non vi rimanesse alcuna lordura, o umidità; & immerfi un de' capi nell' argento vivo contenuto da un vaso largo, e di poca altura, quanto più obliquamente l'orlo del vaso mi permetteva, in maniera che l'angolo, che 'l doccia facea con l'orizzonte, non superava i 18 a 20 gradi: Locchè fatto adattai la mia bocca all'altra estremità del cannello, e cominciai a succhiare, sicchè agevolmente il Mercurio montò fino all'alto, & avendone fatte cadere alcune gocce nella mia bocca, feci cenno ad un de' miei Scolari addestrati a questo, di otturare sollecitamente col dito l'estremità di basso immersa nel Mercurio. Devo qui ancora dire di passaggio, come io tutto ad un succio senza interrompimento feci salire l'argento vivo per timore, che in faccendolo interrottamente, & a poco a poco, qualche alito, o scialiva non entrasse nel doccia. Essendo dunque riempito in questa maniera il cannellino, mentre il mio Scolare teneva chiuso l'orifizio di basso col dito, io turai l'altro superiore con della calcina, di cui mi servo per consolidare i vetri rotti, o fessi. Dopo
di

di averlo ben suggellato, feci togliere il dito allo Scolare dall' orifizio di basso, che stiede sempre immerso nel Mercurio: Indi alzai il cannello perpendicolarmente, e l'a gente vivo, come suole, discendendo, si pose al suo bilico: Ebbi piacer di vedere, che egli non lasciava spuma, o ombra alcuna attaccata alla parte vota del doccio, come suol avvenire, quando i cannelli son riempiti nella maniera ordinaria; donde io cominciai ad augurarmi bene. In fatti provvedeva, che tal dovesse essere la riuscita; perciocche nella maniera, in cui era stato ripieno il doccio, si vede, che l'aere non abbia toccato il Mercurio nel montar sù per esso, toltane la prima goccia, qual'era come uno scudo in difesa di tutto 'l rimanente della Colonna Mercuriale perche in salendo non ricevesse ingiuria dall' aere, a cui ella sola era esposta; quantunque non potea esser molto infettata, perciocche no 'l divideva, nè penetrava con quella violenza, che avrebbe fatta in cadendo; e quantunque la fusse, avendola io succhiata, e fatta cader nella mia bocca, to se a me ogni minimo scrupolo sù l'esattezza, ch' io cercava.

Era con ciò sicuro di avere un Barometro, la di cui colonna Mercuriale non aveva quella pellicula sì funesta agli altri: Frattanto per farne la speriienza più agiatamente, senza rischio di versare il Mercurio col trasportarlo, o in barcollandolo, levai il doccio da detto vaso largo, tenendo l'orifizio di basso oppilato col dito, e lo posi in un vaso più stretto, e più profondo ripieno sino alla metà di Mercurio. Compito tutto attendeva la notte con impazienza; la qual giunta, presi il mio Barometro così apparecchiato, tenendo il canne lo con la man manca, e 'l vaso, do.

dove era immerso con la man dritta, e tosto che io fui nell'oscuro ecco ch' i' vidi, senza aver barcollato il Barometro, de' lampi molto vivi, prodotti da quel picciolo moto, che in trasportandolo si era impresso alla colonna mercuriale: Quando però cominciai, benché molto soavemente, a barcollare detto Barometro per imprimere al Mercurio un movimento reciproco più sensibile di quello, che col trasporto si era fatto, per ogni avvallamento appariva un lume sì vivo, che rischiareva gli oggetti più vicini, sì che io poteva molto ben discernere col favor di detto lume le lettere mezzane di una Scrittura nella distanza di un piede. Io vi confesso di avere sperimentato un piacer sommo, che corrispondesse così bene l'effetto al mio disegno, tanto più, che questa non era sperienza fatta a caso, ma per consiglio, fondandomi su' principj del mio ragionamento. Devo dirvi ancora, che tal luce appariva sì facilmente, che 'l più insensibile barcollamento, per cui appena falliva o calava il Mercurio quanto un fil di coltello, vivissimo e' si produceva: Il giorno appresso ripigliai detta sperienza con tre o quattro altri docci, che riempj nell' avvisata maniera, e tutti ugualmente mi renderono vivissimo il lume senza mancar mai; ond' è che io arditamente asserj, che tutti i Barometri così apparecchiati, come ho detto, in tutti tempi faran vedere il Fenomeno, che si era avvisato in quello del Signor *Picard*, e forse più luminoso.

La seconda maniera di cui mi son servito per riempire il doccia d'argento vivo, senza che la colonna mercuriale si cuopriffe della pellicina sudetta, si è questa che in poche parole stringo. Preli un doccia ben pulito & aperto da una sola banda, che

io immerli nell'argento vivo contenuto in un vaso, il quale perpendicolarmente dirizzai, sicche in esso doccio non vi fusse altro che aere; per quale estrarre coprj il doccio, e 'l vaso, in cui era immerso l'orifizio aperto, con un recipiente di vetro fatto a foggia di Campana, che dilungavasi nella parte superiore per poter contenere il doccio, come un fodero contiene la lama della spada (tal recipiente è fatto a bello studio per simiglianti sperienze del Barometro) adattai dunque il recipiente con dentro il doccio, e 'l vaso sù l'incastro di rame della *Machina Pneumatica*, per cui mezzo tirai l'aere del recipiente, e nell'istesso tempo quel del doccio, il quale non potendo uscire per la punta superiore, che era chiusa, con picciolo boglimento scappava per l'orifizio immerso nel Mercurio. Dopo di aver estratto l'aere dal recipiente, e dal doccio con tutta la maggior possibile esattezza, io lo lasciai rientrare nel recipiente, ma non potendo far l'istesso nel doccio per cagion del mercurio del vaso, che glie lo impediva, spinse con la sua pressione l'argento vivo nel cannellino sino all' altezza di 24 a 25 dita; in maniera che poco mancava, che e' non fusse montato all' ordinaria del Barometro; locche dimostrava come l'aere era stato assai diligentemente tirato dal recipiente. Essendo l'argento vivo così risalito, io lo credei affatto spogliato dalla sua epidermi, perciocche la sommità istessa della colonna mercuriale non aveva potuto toccar altr'aere, che quel poco rimasto nel doccio, il quale per la sua estrema rarefazione non era valevole affatto ad alterare la sommità del mercurio, e molto meno il rimanente della Colonna mercuriale, che n'era lontana. Quando in fatti nella seguente notte io feci l'esperienza, apparve il lume nel doccio

cio ugualmente vivo, e simile all' altro preparato nella precedente maniera. Donde si vede ancora, che l'aere rimasto nella parte vota del doccio non potea impedire, che non si producessè il lume; ond'è, che se ne' Barometri riempiti nella guisa ordinaria e' non si vegga, ciò non addivenga dal non essere questi ben votati, e depurati di aere; ma unicamente perche il mercurio contenuto nel doccio è involto da detta pellicula, la quale chiude il passo a la materia del primo elemento.

Ho avvisato frattanto con la speranza, che l'umido sia molto nocivo all'apparimento di tal luce; perciocchè dopo di aver continuato per alcune settimane a barcollare in ogni sera un de' Barometri apparecchiati secondo il primo metodo, per ispiare se con l'andare alcuna differenza si avvistasse o nella vivacità, o nelle altre circostanze; e non avendone pur la minima ravvisata, io fui di avviso a versare un pò d'acqua nel vaso di sotto, che coprìsse la superficie dell' argento vivo in esso contenuto; indi molto dolcemente alzai il doccio, fin a tanto che l'orifizio di sotto uscendo dall' argento vivo del vaso giunse all' acqua, e tosto che alcune gocce di esso entrarono nel doccio, io lo rituffai nel mercurio: montando dette gocce di acqua in alto, coprirono la sommità della colonna mercuriale. Era dunque io curioso di osservare, se questa poca acqua non impedisse l'apparizion del lume; ella però in fatti l'impedì sì bene, che col più violento barcollamento non venne fuori il minimo barlume. Feci il saggio dopo ciò con lo spirito di vino rettificato, col pensiero, che essendo di per se accensibile, agevolerebbe forse piuttosto la produzione del nostro lume, che l'impedirebbe; ma invano; perciocchè appena alcune gocce di acquarzente oc-

cuparono la sommità della colonna mercuriale, che 'l lume, qual prima appariva vivacissimo ad ogni leggiera scossa del doccia, non più comparve, quantunque i barcollamenti fossero grandi. Donde io didussi, che ogni umido, & ogni cosa di natura differente possono ferrare i pori del mercurio, & impedir così alla materia del primo elemento di slanciarsi, come fa la pellicola; o per lo meno rattenere in parte la gran rapidità, con cui il primo elemento deve esser mosso per produrre il lume: Perciocchè egli è chiaro, che ogni straniera materia, occupando 'l picciolo spazio immediatamente sopra della colonna mercuriale, là dove fafi l'unione del primo elemento, è chiaro dico, che ella non possa muoversi unita, & in conseguenza con rapidezza, come suole quando ella è sola, nè passa per traverso i pori di materia più grossolana.

Non fò altro altro motto sù di ciò, Signore, per dar luogo alla sua riflessione, affinchè se ne miei pensamenti ritrovi alcun verisimile, faccia questi comuni, come l'ho pregata, con l'Accademia. Bramerei, che alcuno di cotesti Signori si prendesse la briga di formar uno, o due Barometri nell'una, e nell'altra maniera; e che mettesse questi in agguaglio con quello del fù Signor *Picard*, e volentieri ne attenderei il successo, se mai sapeste il modo come sia stato riempito il Barometro del Signor *Picard*; giacchè l'Autore del picciolo Trattato dice di esser questi un doccia ricurvo; vorrei esserne informato; e poicche egli è difficile il riempire, secondo e' volgarmente si suole, un tal doccia, comincio a sospettare, che siasi ciò fatto col fuccio secondo il primo mio Metodo, o con l'estrazione dell'aere secondo l'ultimo, o in altra simil guisa: Se ciò fusse, darebbe un gran peso a' miei pensamenti. Io sono &c.

PRO-

P R O S E G U I M E N T O

DELLE OSSERVAZIONI SU' DISCIOGLENTI
DEL MERCURIO

DEL SIGNOR HOMBERG.

Nell'ultima mia Memoria dimoſtral, che gli acidi minerali, di qualunque natura ſi fuſſero, diſciolgano il mercurio: Offervai ancora, che queſti più agevolmente ſi diſfaccia in alcuni di detti acidi, e più difficilmente in altri, come ancora, che alcuni intieramente lo ſolvono ſenza rimanere alcun ſedimento, & altri una parte ſola di eſſo, laſciando ſempre certa fondata nericcia indiſſolubile da detti acidi, la quale da altri prontamente ſi diſtempera; donde io preſi l'occaſion di dire, che 'l mercurio potrebbe non eſſere omogeneo in tutte le ſue parti; promettendo di riferire altre offervazioni, che poteſſi mai tenere per conferma di tal conghiettura. Queſte offervazioni non cavate in parte da lunga penoſa offervazione più volte da me fatta per eſattamente purificare il mercurio: Io la reche- rò quì intiera, perche meglio ſi faccia giudizio della pruova, che io pretendo dedurne.

Fate il regolo di Marte ſecondo l'ordinaria maniera, impiegandovi 9 parti di antimonio, e 4 di ferro, e purificatelo tre o quattro volte col ſalnitro: Fondete due parti di queſto regolo con una parte di rame roſſo, ſenza agglungervi fondente; il nuovo regolo ſarà grigio violetto.

P 3

Am.

* Luglio 1700.

Ammassate di poi tre libbre del mercurio commune ricavato dal cinnabrio con una libra di questo regolo di Marte, e di Venere, che facilmente si farà in questa maniera.

Riscaldete in un gran mortajo di ferro il vostro mercurio, sino a che grilli, e nell' istesso tempo fondete il vostro regolo in un Crogiuolo, coprite poi il mortajo con un coperchio di legno, che nel mezzo abbia una buca larga quanto un dito; versate per questa il vostro regolo fonduto nel mortajo sù 'l mercurio, donde avverrà un rumor grande, perciocche il mercurio schioppettando salta in aria per lo calor del regolo fouduto; raccogliete tutto ciò, che sarà appiccato a' pareti del mortajo, & al coperchio, e macinate con un pestello di ferro prontamente nell'istesso mortajo, sino a che la Amalgama sia dolce, e non appajano più grumi sù le dita.

Mettete questa in digestione per 8 giorni in un matraccio, & indi lavatela con molte acque calde, fin attanto che l' acqua non si tinga più a nero, & indi la seccherete.

Senz'altra aggiunzione, distillate questa con una storta di vetro lutata, dandoli sù la fine gran fuoco per far passare tutto il mercurio.

Lavate il mercurio distillato, e riunitelo col nuovo regolo, mettendolo in digestione, lavandolo, e distillandolo, come nella prima volta.

Replicate per dieci fiate queste Amalgame, lavande, e distillazioni: L'acqua, con cui le laverete per le prime cinque o sei volte, sarà sempre lorda, ma dopo la sesta Amalgama, e distillazione, ella a poco a poco si schiarirà, sino a che nella nona o decima si osserverà all'intutto chiara, nè dal mercurio si scevererà lordura alcuna.

Po-

Potrebbe opporsi, che l'immondizia dall' Amalgama tolta per mezzo delle lavande, piuttosto addivenga dal regolo, che dal mercurio; perciocche questo, che vi si adopera, come quello che è tirato dal cinnabrio, sembra cotanto puro quanto mai possa essere; ma che essendo l'istesso mercurio in ci alcuna Amalgama impiegato con nuovo regolo, dimostra, che l'annerimento non venga già dal regolo, ma unicamente dal mercurio; poiche altrimenti e' farebbesi tenuta nella decima Amalgama altrettanta lordura, quanta se ne ebbe su le prime; e l'istessa cagione, cioè il nuovo regolo, avrebbe sempre prodotto l'istesso effetto. Ho io raccolte queste lordure, e disseccate, & eran esse una materia terrestre, leggiera; grigia, oscura, senza alcun sapore, nè odore: Ella nel fuoco arrossa senza fonderli, ma con la borraçe, e col solimato corrosivo, ha prodotto uno smalto gialliccio, vergato di alcune liste nere.

Bisogna avvertire in facendo tal operazione, che l'acqua per le lavande non sia troppo calda, perciocche l' Amalgama si scioglierebbe, e 'l mercurio lascerebbe il regolo ridotto in polvere nera, pesante, e molta, la quale perfettamente si distingue dalla grigia, che separasi dal mercurio; perciocche l'una è nera, greve, e facilmente fonde al fuoco, e congelasi in regolo, quando che l'altra è leggiera, grigia, che non si fonde, se non se quando con un gran fuoco divien vetro. Tre libre di mercurio mi an dati cinque grossi e mezzo di detta polvere grigia, che affatto differisce dal corpo rimanente del mercurio, il quale, come ogn' un sà, è molto volatile, attaccandosi prontamente alla superficie di tutti Metalli, trattone il ferro; e mi schiato con qualunque di essi lo rende frangibile, e toglie lui

la solidezza; ma la polvere grigia è affatto fissa; nè si unisce con alcun metallo; e se si fondano insieme, diviene ella vetro, e soprannota a questi, senza renderlo frangibile. Sembra fuor d'ordine, che dal mercurio, qual'è tutto volatile, con detta operazione si separi una materia cotanto fissa, che divien vetro nel gran fuoco; ma qualora si rifletta, che in una Amalgama di piombo, stagno, & argento in un violento fuoco, il mercurio seco porti via una porzione di detti metalli, (evaporandosi, sarà minore la maraviglia nel vedere, che quest'istesso tenga seco nelle distillazioni ordinarie una materia fissa, e leggiera, se si consideri separatamente, che forma però una parte del suo corpo, qualora sono uniti insieme; perciocche vedesi egli trasportar metalli, che non solamente son materie fisse, ma molto pesanti ancora, senzache possa dirsi, che detti metalli siano stati da lui resi volatili, o in alcun modo cambiati; poiche se si ritorni a distillare con picciolo fuoco quel mercurio, che seco ha portato alcun metallo per violenza di fuoco, lascerà egli il metallo nel fondo della storta.

Non vi è luogo da sospettare, che detta polvere grigia sia una materia straniera al Mercurio comune, introdotta, o mischiata, dopo di esser cavata dalle mine; perciocche dette sorti di mescolanze si sceverano perfettamente in ricavandolo dal cinabrio: Bisogna dunque, che questa sia una materia, che si ritrova in tutto il Mercurio comune, di cui è una parte essenziale, che può separarsi per mezzo di tal operazione.

Donde si deduce, che'l mercurio, da cui è stata separata, debba essere differente dal mercurio comune; siccome da alcuni effetti da me osservati, che

che non s' incontrano nel mercurio comune, ho preso argomento, de' quali in altro tempo farò parola.

Sappiamo bene, che 'l solfo operi con vigore sù 'l mercurio; quindi io ho creduto, che facilmente la materia solforosa del regolo di antimonio servisse per dissolvente di questa, che si separa dal rimanente corpo del Mercurio, e che tal solfo non avesse alcuna azione sù le altre parti dell' argento vivo; perciocchè essendosi una volta sino alla quinta o sesta Amalgama sceverata la polvere grigia, il regolo non opera più su 'l mercurio, e tutte le Amalgame, che si fan dopo di questa, non ne dividono più cosa alcuna, essendo le acque, che si adoperano per le lavande, indi in poi sempre chiare; locchè molto accorda con l' idea, che si tiene del solfo del regolo d'antimonio, che sia cioè differente dal solfo ardente dell' antimonio crudo; poichè questo scioglie intiero il corpo del mercurio, quando che 'l primo non tocca altro che la parte fissa, separabile con la nostra operazione. Quindi si vede, che non sia l' intiera sostanza del mercurio quella, che si trasforma in polvere grigia per detta operazione, ma solamente alcuna parte del composto mercuriale, che sequestrasi; e quando ella è consumata, l' istessa operazione non più ne divida, lasciando il rimanente mercurio affatto inalterabile.

Sono nell' incertezza dove io mi attenga intorno alla maniera, come producafi tal effetto. Mi si presentano due opinioni, che ugualmente mi sembrano probabili. La prima è la pur or censurata, cioè, che 'l solfo del regolo di antimonio introdotto in tutta la massa del mercurio per mezzo dell' Amalgama, disciolga quella parte del mer-
cure

curio, che tal solfo è capace di sciogliere, com'è la polvere grigia che indi divide, lasciando il rimanente mercurio, qual materia, sù di cui non abbia azione alcuna. La seconda è, che bisogna supporre l'argento vivo un liquido, che contenga negl' interstizj delle sue picciole parti una materia terrea non potuta ridurre in mercurio, la quale sempre sia tramischiata con esso, e che allora si separi, quando un' altro corpo proprio ad introdursi in detti interstizj discacci la prima, e tenga il suo luogo. Potrebbe dunque immaginarsi, che siavi nel regolo d' antimonio materia, la di cui figura si adatti più comodamente agl' interstizj del mercurio di quella, che l'istesso argento vivo ha seco ritenuta dalle sue miniere; la quale essendo posta in moto, e con le Amalgame, e col fuoco della digestione, s' intrometta nell' interstizj del mercurio, li riempia, e ne cacci via quelle, che vi eran prima; e poicche 'l mercurio così travagliato cresce di peso, convien credere, che la nuova materia introdotta nel mercurio sia più grave dell' antica, che ne vien cacciata; e che il gran peso di quella ha potuto spignere, e sloggiare questa, come avvien sempre, qualora liquidi di svariati pesi si toccano liberamente, e senza compressione esteriore.

Ho attribuita la cagione di detta separazione al solo regolo, e non già al ferro, o al rame, che v'entrano; perciocche ho io fatta l'istessa operazione col puro regolo di antimonio senza ferro, e senza rame coll' istessi effetti; la ragione però, che mi ha mosso a mescolarvi il ferro, si è, perche l' antimonio produce più regolo, qualora vi si aggiunga un poco di ferro; e la cagione perche vi abbia posta il rame, si è, che l' Amalgama più agevolmente si faccia essendovi questo metallo.

DEL.

DELLA STRUTTURA,
E SENTIMENTO DELLA MIDOLLA.
DEL SIGNOR DU-VERNEY.

PER soddisfare al desiderio della Compagnia, che richiedeva alcun rischiaramento sù le difficoltà proposte in un' Assemblea intorno al sentimento della midolla, e delle ossa: Eccone le osservazioni da me fatte.

La midolla è un ammasso di molte picciole vescichette membranose, delicatissime, quali tra di loro s'imboccano, e son ripiene di un sugo olioso, scorrente, e liquido. Sono esse vescichette rinchiusse in una membrana, che serve per generale invoglio e buccia della midolla, per cui li scompare un grandissimo numero di vasi, & è d'una tessitura più fina della membrana Aragnoide della spinal midolla.

La maggior parte di detti vasi passa nella cavità delle ossa per canali particolari succhiati nella loro parte calda. L' Arteria, la vena, e 'l nervo, comprese in un' istessa guaina, produzione del Perioostio, son rinchiusse ne' medesimi canali. Detti Vasi nel loro entrare dividono da se infiniti rami, che irrigano tutto l'ordine delle vescichette.

La midolla è raccolta in una sola massa, dove l'osso è incavato a foggia di doccia; ma dove egli è spugnoso, divideasi ella in più picciole porzioni,
che

17. Luglio 1700.

236 *Memorie dell' Accademia Reale*
che ne riempino le cellette.

Il fapor dolce & aggradevole di questo fugo, e la sua untuosa consistenza dan luogo a credere, che sia egli un estratto di ciocche vi ha di più dilicato e più fino nella porzione oliosa del sangue, qual di continuo si feltra in queste vescichette.

Crederono gli Antichi con Ippocrate e Galeno, che la midolla servisse di nutrimento alle ossa; e le ragioni donde si muovevano a ciò credere, sono.

Nel corpo delle ossa non vi si ravvisano vasi sanguigni; tutti i rami di que', che si scuoprono, vanno nella cavità di esse, dove il sangue, che contengono, si sparge, si cuoce, e digerisce, e convertendosi in midolla, rendesi con ciò proprio a nutrir le ossa; si vede ancora come a misura che le ossa son lunghe, o destinate a moti violenti, la loro cavità è più ampia, e capace da contenere una maggior quantità di fugo midollare per loro nutrimento.

Queste ragioni, che anno alcuna apparenza di probabile, facilmente possono rifiutarsi, qualor si ponga mente alla parte calda dell'ossa de' giovani Animali, qual è tutta irrigata da grandissimo numero di vasi sanguigni; che vi sian molte ossa intieramente solide, e sprovvedute di midolla, come quelle dell'orecchio, il corno di Cervo, e de' Daini, e frattanto dette ossa non lasciano di nutrirsi; che vi sian altre ossa vote dentro, le quali son rivestite di una membrana glandolosa, come appunto le cavità, che si osservano tra i due tavolati di alcuni ossi del cranio, che si dicono *Seni*. E' si sà ancora, che i fogli ossei, che tengon luogo di *Diploa* nel cranio dell' Elefante, sian senza midolla, e guarniti solamente di una membrana,
nel-

nella quale sono scompartiti molti vasi . Il vano delle ossa , che si osserva nelle gambe delle *Locuste*, e de' *Gamberi*, è parimente senza midolla , ripieno di muscoli, che servono al moto di esse , e pure dette ossa non rimangon di ben nutrirsi . Può in fine avvertirsi , che le ossa non siano incavate unicamente per comprendere , e conservar la midolla , ma principalmente perche siano meno pesanti, senza essere men dure.

Da molte osservazioni son io convinto , che una porzione di tal materia oliosa continuamente traspiri , e che insinuandosi tra le fibre e tessitura delle ossa , rammolli queste col suo untume , e le renda più pieghevoli, e più lente, & in conseguenza men fragili .

Dopo la morte dell' Animale ancora si avvisa l'agevolezza , che ha la midolla a trapelarle : E' in fatti questo ostacolo il maggiore che s'incontra, qualor si vogliano imbiancar le ossa , e formar uno scheletto; perciocche se non si prenda cura di forarle per un' estremità , e tirarne indi la midolla interamente , e con la sciringa più volte vi s'introducano delle acque proprie a sciogliere detta materia oliosa , dopo qualche tempo si vedrà , che un osso , qual appariva bianco , divenga estremamente giallo al minimo calore , per cui quella rimasta si fonda , e scorra per tutte le parti esteriori . Quindi è , che gli Operaj , quali impiegano le ossa ne' loro lavorj , anno l'avvertenza di segarli per lungo , e togliere così tutta la midolla , e la tessitura spugnosa ancora , affincbe la bianchezza dell' osso non venga da queste alterata .

Può quì avvertirsi , che dentro delle ossa vi siano molti piccioli buchi, per quali passano alcuni vasi , che vengono dalla membrana della midolla; don-

donde deeli inferire, che traggono le ossa la lor nutrizione e da dentro e da fuori . Vien ciò confermato dalla maniera , donde le due tavole del cranio si nutriscono, venendo l'esteriore alimentata da vasi del *Pericranio* , e l'interiore da' rami di que', che si spandono per la *Dura matre*.

In diversi tempi si è avverato sù di molti animali, che la quantità della midolla era maggiore, qualora il buon nutrimento e 'l riposo dell' animale era maggiore , e non già rispetto al corso della luna .

Gli Antichi, & i Moderni an parlato con tanta incertezza del sentimento che possa avere la midolla , che mi an posto nella necessità di esaminar tal affare con tutta diligenza ; e questo in due maniere .

La prima vedendo negli Ospedali curare que', che avevano un braccio , o una gamba tagliata, a quali poteva osservar la midolla allo scoperto , in ogni volta , che faceva toccar con un poco di asprezza questa, l'Infermo tosto dava segni di nuovo dolore . Ma perche non sembravami questa prova, che affatto convincesse, ebbi ricorso ad una seconda sperienza , che non mi ha lasciato dubbio alcuno : Sovvengavi Signori , che io avanti a voi feci secar per mezzo l'osso della coscia di un Animal vivo , spolpandolo intieramente, senza lasciarvi nè pur le membrane , perche la punta dell'osso fusse intieramente ignuda ; e poiche tutte queste scosse , e divisioni cagionavano crudelissimi dolori all'Animale , vi ricorda , che io ebbi l'avvertenza di aspettare, che detto dolor fusse passato , e dopo alcun tempo introdussi uno stiletto nella midolla , vedestivo come tosto l'Animale dasse segni di vivissimo dolore , locche replicato più volte con
l'istel-

l'istessa avvertenza, si tennero i medesimi successi: a dette esperienze aggiugnerei quella, che noi abbiamo delle alterazioni, e delle malattie della midolla, quali provano ancora, che abbia ella un sentimento squisitissimo.

Intorno al sentimento delle ossa farem parola nell'altra Memoria.

METODO GENERALE

*Per lanciar le Bombe in tutte forti di casi proposti
con uno strumento universale a tal uso
addetto.*

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

* **I**L Signor *Blondel* fe imprimere nell' Anno 1687. un Trattato molto curioso e ricercato, che ha per titolo *Arte di lanciar le Bombe*, ove esamina a fondo questa materia, e reca delle pratiche, e degli strumenti proposti da molti savj Matematici. Ma poicchè v'incontrava delle difficoltà considerabili, sei o sette Anni prima dell'impression del suo libro, propose all' Accademia un Problema, dalla di cui soluzione si determinava l'angolo, per cui bisognava lanciarle. La maggior parte de' Matematici di questa Illustre Compagnia fecero delle scoperte sù di tal materia, & io felicemente m'incontrai a rinvenirne una molto semplice, che potea agevolmente servire alla pratica. Sù di questo fondamento il Signor *Blondel* dà

* 24. Luglio 1700.

dà la prima fabrica di un Istrumento per tutte forti di lanciamenti nel *cap. 1. del lib. 4.*, come facilmente può osservarsi . Propone indi un secondo metodo per mezzo del compasso di proporzione, & in fine il terzo, e la costruzione di un Istrumento per lo stesso affare proposto dal Signor *Cassini* con la Teorica del lancio delle Bombe . Egli è molto semplice, e molto ingegnoso; ma bisogna avvertire, che nella descrizione di detti Istrumenti non fa egli parola donde l'abbia ricavati, contentandosi solamente di recar indi le differenti soluzioni del Problema, che avea proposto, donde può vederli il rapporto con la costruzione degli Istrumenti .

Nel mio Trattato di Meccanica ne ho io recato un semplicissimo per lanciar le Bombe, il quale altro non è, che una squadra ordinaria, che ha sopra un de' suoi lati l'anello scorritojo, al quale è attaccato il fil del piombo: Ma poicché sopra un de' lati di detta squadra, ove sono alcune divisioni, bisogna fare un'operazione, per conoscere da quel che si è dato, il punto, per dove il fil del piombo deve passare per affettare il Mortajo, o'l Cannone in quella elevazione propria per colpire al segno, che è la comune difficoltà per tutti gl'Istrumenti proposti del Signor *Blondel*; ho io pensata ad una maniera più facile, e fabricato nuovo Istrumento, che qui propongo, in cui non si suppone, nè richiede altro conoscimento, che quello della forza della polvere, o, ch'è lo stesso, l'Ampiezza orizzontale del lancio di 45 gradi, la quale conosciuta una volta serve per sempre, qualora si adopera l'istessa polvere nell'istessa quantità . Il comodo di questo Istrumento si è, che senza alcun imbarazzo si può ritrovare l'elevazione, o l'abbas-

samen-

famento del luogo, o del segno, ove si tira, riguardo alla live-la; & inoltre, se si voglia, la distanza di detto luogo, che bisogna averli per gli altri istrumenti quali si adoperano per misurare i lanciamenti, in questo si ritrova senza che siavi bisogno di alcuna conoscenza esteriore, e detto istrumento sarà affettato come conviene per detta operazione: Vantaggio, a mio credere, sommo per coloro che devon servirsi di esso, i quali per ordinario non anno alcun conoscimento de' primi principj di Geometria, e sarebbero molto imbarazzati se lor convenisse fare la regola del tre in ciascuna operazione differente.

Questo istrumento non consiste in altro, che in una lamina di figura semicircolare ABD, che ha un regolo BE, attaccato su l'orlo del circolo, che corrisponde al centro C, il di cui lato BE essendo allungato incontra il centro C di detto circolo, & è perpendicolare al diametro ACD di esso. Dividesi il semidiametro CD di detto semicircolo in 9 parti uguali, e queste istesse divisioni si fanno su di CE. Ciascuna di dette divisioni rappresenta 100. passi, e, se si voglia, possono suddividersi con piccioli punti in altre parti minori; quantunque il giudizio, che con la sola veduta si fa, basti per tali operazioni. Per le divisioni del diametro 7, 8, e 9 si disegneranno altri semicircoli, che avranno C per loro centro.

A detto centro C dell'Istrumento siavi appiccato un regolo CF, nel di cui mezzo, lungo esso, siavi un canaletto adattato a farvi scorrere il chiodo G, il di cui cappelletto sia rivolto verso la lamina; la metà di questo canaletto corrisponda al centro C del semicircolo. Lo stesso chiodo G passi ancora per la fessura di un'altro regolo IH simile al

primo, di maniera che tutti e due possino essere congegnati fermi dall'istesso chiodo con una picciola vite in qualunque distanza, & in qualunque angolo si vorrà.

Nell'estremità H del regolo IH siavi una picciola laminuccia rotonda dell'istessa larghezza del regolo, che si farà da un corpo bianco, come argento, nella quale si segni un punto nero, che corrisponda alla metà della fessura del regolo. Su di questo ancora dal centro H del chiodo di argento si notino le grandezze C7, C8, C9.

Il regolo CF, che può liberamente girare su 'l chiodo C conficcato nel centro del semicircolo, può esser fermato in qualunque posizione si vorrà su la lamina del semicircolo per mezzo della vite, in cui è foggjata l'estremità del chiodo, e che stringe la lamina col regolo. Bisogna avvertire, che i chiodi C, e G, devono avere la punta aguta, che superi la loro Chiocciola.

Lungo il semidiametro, vi è su la lamina un canaletto, per cui passa e scorre il segno-scorritojo O, che ha la testa aguzza, a cui si attacca il filo del piombo; la metà di detto canaletto deve essere su 'l diametro ACD del semicircolo.

Per quel che si attiene all'uso di detto Istrumento, può egli servir su le prime come di Asse per determinar la distanza dal luogo ove stà il Mortajo fino al segno a cui voglia tirarsi, senza che siavi necessaria la cognizione del numero de' passi di tal distanza: E ciò si fa, in prendendo alcuna base di tre o quattrocento passi a fianchi del luogo, ove alcun ritrovisi, e riguardando alcuno obbietto conosciuto in questa distanza per lo chiodo C, e per lo segno scorritojo O: si prenda parimente la mira al berzaglio per lo chiodo C, e

G, e

G, e si fermerà il regolo CF in tal posizione sù la lamina per mezzo della vite, che è in C. Indi si trasporterà l'istrumento nella situazione laterale, che tu prima guardata, e si affesterà il segno scorfitojo O al numero de' passi dal punto C. nell'altra stazione; e guardando parimente per lo scorfitojo, e per lo chiodo C, si farà camminare il chiodo G su 'l regolo GF tanto che si vegga per lo scorfitojo O e per lo chiodo G il berzaglio, ove si abbia a tirare: Allora si fermerà il chiodo G in detta situazione, e la distanza CG sarà nelle parti di CO il numero de' passi dal sito onde si tira fino al segno; locche non è necessario di saperfi, purchè il chiodo G sia fermato su 'l regolo CF in tal positura. Ma se fosse data tal distanza, non converrebbe altro, che alligare il regolo CF sù la linea CE, e fissare il chiodo G su 'l numero di passi, che son conosciuti.

Frattanto per aver l'elevazione, o l'abbassamento del segno riguardo all'orizzonte del luogo, in cui devono lanciarsi le Bombe, convien tenere la lamina ferma in tal situazione, che 'l filo del piombo P si adatti al punto A, o su 'l diametro AD, e far muovere il regolo CF, in manierache si vegga il berzaglio per la punta de' chiodi CG. Bisognerà allora fermare il regolo CF sodamente sù la lamina del semicircolo: E questi sono i due conoscimenti, che conviene avere insieme con la forza della polvere in qualunque metodo.

Per quel che riguarda la forza della polvere in certa quantità, o pur l'altezza a cui potrebbe il getto montare tirando verso il Zenit, poiche non può per l'esperienza conoscersi, e' si sà per dimostrazione che 'l punto dell'orizzonte, ove può giungere la Bomba quando è lanciata per un'angolo di

45 gradi, sia sempre distante dal luogo donde si tira al doppio dell'elevazione verticale, e questa diceasi ampiezza del getto; quindi è, che una sola osservazione fatta in tal guisa, & a piacere, può servire per tutti i casi. Per cagion di esempio, se la palla è corsa 1600 passi, il getto verticale, o a piombo, giugnerà alli 800. Detto Istrumento potrà parimente servire per fare tal getto, come si vedrà appresso.

Frattanto per la pratica de' getti, & uso dell'Istrumento, si ponga il segno scorlitojo O su'l numero de' passi del getto verticale, come in questa figura su'l punto di 900 passi, se tal'è il getto verticale, ovvero l'ampiezza di 45 gradi di 1800 passi. Indi si moverà il regolo HI pel suo canale su'l chiodo G immobile su di CF, tanto che l'istessa divisione di 900. passi di detto regolo HI si adatti su di CE, allora che IH sarà a un dappresso parallela ad AD, ovvero IH perpendicolare a CE: Locche si conoscerà, in facendosi girare il regolo IH sicché la sua divisione di 900 vada rasente la linea CE: allora se si faccia girare il regolo IH su'l chiodo G, la lunghezza IH essendo sempre tale come si è rinvenuta, quando il centro della lamina H toccherà il circolo OLL di 900 passi, si fermerà il regolo IH ben sodamente col regolo CF per mezzo della vite, che stà in G. Frattanto se si applichi un de' lati dell'appendice, o regolo BE, che si suppone ugualmente largo da per tutto, dentro del Mortajo, o del Cannone, & indi si alzi, o si abbassi tanto, per farli, che'l filo del piombo P passi per lo punto L, la Bomba caderà nel segno proposto.

Se'l punto H non può incontrare il suo circolo altrove che in un punto, allora per un solo getto potrai colpirla al segno: ma se lo rincontrerà in due

due punti, questi, come L, serviranno a farne due differenti dell'istessa maniera, che si è detto per uno, quali due daranno sempre al segnò. In fine se il punto H non può incontrare il suo circolo, il colpo non verrà mai affessato.

DIMOSTRAZIONE.

La dimostrazione di questa pratica dipende da una proposizione della Parabola dimostrata da me, e dal Signor *Blondel* riferita nel cap. v. 11. della terza parte del suo Trattato, come mia. Perciocchè essendo G il berzaglio a cui si tira, e per la mia costruzione essendo GH uguale alla differenza tra l'altezza del getto verticale CO, e l'altezza del segno G sopra dell'orizzonte, che passa per C, ovvero la somma delle stesse: se il punto G è sotto all'orizzonte, o sotto al livello del punto C, cioè se GH è perpendicolare all'orizzonte, la linea OH farà a livella: Quindi è, che i punti d'incontro LL de' due circoli OL HL sono i fuochi della Parabole, che passeranno per C, e per G; e questa appunto è la figura, che il Sig. *Blondel* ha solamente rivolta nel suo istrumento quadrato, donde la costruzione non si cambia.

Ho detto, che la linea OL essendo verticale, o a piombo, farà con OH, o con CE del mio istrumento, la quale è a lui parallela, l'angolo, che deve fare la direzione del getto nel punto C, senza che vi bisognino nuove operazioni; & in questo principalmente consiste la semplicità di tal pratica.

Perciocchè se si tiri LM perpendicolare sd di OH, e che ugualmente si divida in S, il punto S

deve essere la sommità della Parabola, siccome per la proprietà di questa si sa, che tirata la linea LC, & OC essendo un diametro, la tangente CN della Parabola nel punto C dividerà l'angolo OCL in due parti uguali; & in conseguenza l'angolo OCN determinerà l'angolo del getto, se sia considerato OC come verticale. Ma io dico ancora, che l'angolo HOL sia uguale all'angolo OCN, locchè è chiaro; perciocchè i due triangoli rettangoli CON, OLM hanno un'angolo uguale CON, OLM essendo le linee CO, LM parallele, e segate dall'istessa OL. Quindi è nell'Istrumento, che se 'l filo del piombo passi per OL, allora OH, ovvero CE, o alcuna altra, che li sia parallela, darà l'inclinazione del Mortajo, o la linea per cui deve lanciarsi la Bomba.

Dal getto di queste, o delle palle da Cannone si avvertirà, che poicchè in tutti casi vi son due punti, come LL, vi saran parimente due differenti getti, che colpiscono all'istesso segno; quello però di sopra sarà più proprio per fare urti contro i corpi, che li sono livellati, e l'altro getto farà maggior effetto contro i corpi a piombo, come son le muraglie.



OSSERVAZIONI
SU GLI OLI DELLE PIANTE.
DEL SIG. HOMBERG.

Quantunque in tutte le piante, di cui si è fatta analisi col fuoco, si ritrovi certa porzion d'olio; pure vi ha gran differenza non solamente tra le quantità di detti oli, ma tra le quantità ancora, secondo le maniere e la destrezza che tien l'Artefice nell'estrarlo.

Vediam noi, che una pianta posta senza alcun apparecchio nella storta, e violentemente distillata, rende minor quantità d'olio fetido, di quella, che in lentamente operando, renderebbe; e questa istessa pianta formentata renderà più d'olio essenziale, se la pianta sia Aromatica, che quando non sarà formentata. Dunque vi son maniere, secondo le quali operando può tirarsi con la distillazione maggiore o minor quantità d'olio da un semplice. Ho io fatti molti saggi per ritrovare alcun di detti modi, che fusse comodo, particolarmente per l'estrazione degli oli essenziali; e qui recherò que', che anno avuto felice esito, non curando gli altri, che non mi son riusciti, o che richiedano maggior fatica per esser ridotti a perfezione.

In tutte le piante, delle quali si è fatta Analisi, osserviamo, che nella storta rimanga un capo mor-

Q 4

to

28 Agosto 1700.

to dopo la distillazione , il quale scema quasi che sempre più della metà o tre quarti del suo peso in calcinandosi a fuoco aperto . Si riman di accordo , che quella parte del capomorto , quale nel fuoco aperto della calcinazione svapora , sia una porzion dell'olio della pianta , che essendosi disseccata molto presto con la parte terrea e salina fissa della sua pianta , non ha potuto esser divisa col fuoco chiuso e debole della storia.

Osserviamo noi ancora , che l'olio fetido di una pianta non venga prima del fin della distillazione , cioè in tempo che la parte più acida e 'l sale urinoso si separano dalla pianta ; sicche questi tre principj differenti nell'istesso tempo passano per lo rostro della storia; osserviamo in fine quando una pianta contien molto acido con poco sal volatile , che essa produce maggior quantità d'olio liquido , e che il capo morto nella calcinazione a proporzione scemi poco , come può vederli nell'Analisi del Meliloto , della Malva , dell'Abrotano , della Pimpinella , della Sensitiva , e della Brunella , &c. e che per lo contrario le piante , che rendono poco di acido , e poco di sal volatile , ne somministrino olio denso , & in picciola quantità , e molto capomorto , il quale si strema molto nella calcinazione ; perciocche allora la maggior parte dell'olio rimane nel capomorto , come può osservarsi nell'analisi del *Æliotropium Dioscoridis* , del *Galea Aegyptiaca* , del *Dracunculus* , ovvero *serpentaria major* , del *Calta palustris* , della *Ambrosia maritima* , dell' *Aster Conioides* , &c. Queste osservazioni mi an fatto pensare , che l'acido della pianta , come ancora il suo sal volatile , potrebbero agevolare l'estrazione dell'olio , e servire a questi di veicolo . Ne' saggi da me fatti per metter ciò in chiaro io vi ho impiegato l'aci-

do solo senza del sal volatile , e dopo l'ho adoperati tutti e due insieme : Il solo sal volatile non mi ha finora prodotto quell'effetto di mia soddisfazione , che mescolato coll'acido rende ; perlocche non farò quì parola di esso , ma del solo acido , che non mi è sì mal riuscito.

Il primo saggio , ch'io ne ho fatto è questo , di mescolar parti uguali di aceto distillato , e d'olio fetido molto denso di alcune piante a consistenza di grasscio di porco , incorporando tutto con altrettanta sabbia , che bisogna per formarne pallottole , quali io posi nella storta , e distillai : Alle prime venne fuori l'Aceto pregno di un'acuto odor Emplreumatico di color rosso fosco , indi l'olio nel principio un pò liquido , e dipoi molto denso : L'aceto non sembrava , che e' fosse scemato nella distillazione di quantità , ma nel vigore , e l'olio era stremato del quarto . Immaginai , che la poca acidezza dell'aceto distillato non avesse avuta molta forza sù di detto olio ; perciocche sappiamo che 'l suo peso non superi mai quello dell'acqua di Fiume ; locche pruova molto , come egli contenga pochissimo sal acido , il quale poicche non più in tal distillazione si sente , ho stimato , che sia egli rimasto nell'olio , sù de' quali , in conseguenza , gli acidi operano.

Nel mio secondo saggio mischiai una porzione di spirito di sale con due parti d'olio fetido molto denso , con cui fè leggiera effervescenza , la qual finita ammassai tutto con la sabbia , e distillai ; sù le prime venne fuori lo spirito acido quasi nella quantità di due terzi dello spirito di sale , che io vi avea posto , ma molto inferior di forze : l'olio , che seguì questo era tutto quasi liquido , e da nero & opaco , era divenuto rosso-oscuro , ma trasparente.

te, quale parvemi un poco men fetido, e men greve, perduta avendo quasi la quinta parte del suo peso.

Con questo secondo saggio mi confermai, che gli acidi forti minerali possano unirli alle parti oiose delle piante senza distruggerle, e che l'effetto di essi sia più sensibile di quello dell'aceto distillato: Ma perche il gran puzzo degli olj fetidi delle piante li rende assolutamente intrattabili, io l'abbandonai, proseguendo i miei saggi sopra gli essenziali, o aromatici.

Tra le nostre Analisi delle piante, che rendono l'olj essenziali, non ho ritrovata alcuna di essa trattata in maniera che avesse potuta servirmi di paragone ne' miei saggi; perlocche a bella posta ho fatta una distillazione de' semi del finocchio, secondo le maniere, e le regole ordinarie, che si tengono a cavar l'olio essenziale per detto effetto; l'istessa operazione sù la medesima quantità di semi ho poi fatta, con un divario, che in vece di far fermentare essi con l'acqua, ogni libra di semi ho aspersa con quattr'oncie di spirito di sale; fatta la fermentazione, la distillai, donde ebbi un terzo di olio di vantaggio da quello che avea tenuto per la prima, essendo ugualmente tutti e due chiari, & odorosi, e quest'ultimo olio avea minor sentore di fuoco del primo.

Sono abbastanza persuaso, che non solamente lo spirito di sale abbia accresciuta nel seme la fermentazione, qual noi sappiamo essere sì necessaria per la distillazione di tutte le materie spiritose, ma ancora, che essendosi unito alle parti oiose, abbia queste rese più liquide, e disbrigate a facilmente rilevarsi col calore: Abbiamo veduto un simile effetto nel nostro secondo saggio sù l'olio fetido, e nello scioglimento della canfora in olio
per

per mezzo de' spiriti acidi, che conferma questo pensiero.

Configliai un tempo ad un Profummiere, che distillava l'olio essenziale delle rose con infinita pena, a macerar le sue rose per 15 giorni nell'acqua res'acida dallo spirito di vetriuolo prima di distillarle, donde egli ricavò quasi un terzo d'olio di più: Mi disse, che da 100 libbre di rose n'extraeva alcune volte a mal pena un'oncia d'olio: Anno essi una destrezza particolare per tale operazione, servendosi di una vescica da distillare capace di un barile aperta sopra per un doccio, dovendo introdurvi spesso molta quantità di acqua, che convien rifondere nella vescica su le rose, che distillano, per ciocche l'olio monta a forza d'acqua, e pochissimo per volta: Ha questa vescica ancora una chiave per mazzola nella parte di sotto, per facilmente indi cambiar le rose spossate. La maggior loro destrezza però consiste nella figura del vaso, che riceve detto olio, il quale è formato come un'ordinario matraccio, dalla di cui pancia sorge un doccio simile a que', che prima avevano i vasi di aceto, e di olio per uso della Mensa; questo doccio dalla parte bassa del ventre monta sino al basso del collo del recipiente, ove s'incurva al di fuori. Questo recipiente, che per ordinario non è capace che di quattro o sei libbre, riceve comodamente molte centinaia di libbre di acqua rosa, senza cambiarla, poicché si disperderebbe la picciola quantità d'olio, che vi si raduna; quest'acqua si scarica per detto doccio in un secondo recipiente; e poicché l'olio è più leggero, soprannata, e si raccoglie nel collo del recipiente nell'altezza dell'apertura del picciolo doccio, mentrache l'acqua del fondo del primo recipiente scorre nel secondo a misura che si distilla.

Poic-

Poicche detti Profummiieri fan mistero di tal recipiente, ho voluto farne quì la descrizione, potendo comodamente servire per le distillazioni di tutti gli olj essenziali di qualche valore. Altra volta farò parola degli effetti osservati da me con l'union de' sali urinoli agli olj delle piante.

QUISTION FISICA

Se sia vero, che l'Aere, qual'entra ne' vasi del Sangue per mezzo della respirazione, scappi via con i vapori, e sudori per gl'insensibili pori della pelle.

DEL SIGNOR MERY.

Tutti i Notomisti son oggi di accordo, che nella circolazione del sangue, le animalle del cuore, delle Arterie, e delle vene, quali son tutte disposte per lo stesso verso, ne determinino il corso; e che il polso, e la respirazione sian le principali cagioni del suo moto circolare: Ma quantunque tutti convengano, che la respirazione serva a mantenerlo, an però essi pensierì molto differenti su 'l modo, come vi contribuisca l'aere che noi respiriamo; perciocche alcuni si persuadono, che l'aere, qual'entra ne' polmoni, in dilatandosi il petto, gonfi solamente le vescichette di essi, e con tal gonfiamento comprima le sue arterie e vene, senza penetrar nella cavità di quelli vasi, e

senza.

2 13 Novembre 1700.

senza mescolarsi col sangue. Così secondo tal sentimento l'aere agevolerebbe il moto circolare del sangue con la pressione vicendevole, e replicata, che immaginano essi farsi sù la massa del sangue, che gira ne' vasi del polmone: L'opinione però di questi Notomisti non par che abbia del verisimile; perciocchè facendosi detta compressione sù l'estremità delle picciole arterie, per le quali deve uscir il sangue, è chiaro, che così sarebbe atto più a farli opposizione, che a procurarne l'uscita: Facendosi parimente questa istessa compressione sù l'estremità delle picciole vene del polmone, è chiaro, che contrasterebbe il passaggio al sangue in dette vene, non che l'agevolerebbe l'entrata: Allo 'ncontro egli è certo, che nel Feto umano non potendo i vasi de' polmoni esser premuti dal gonfiamento delle loro vesciche, non entrando in esse l'aere, il sangue pur giri ugualmente libero per i polmoni del Feto, che per quello dell'Uomo adulto; perciocchè quell'istessa proporzione, che si ritrova tra le arterie e vene pulmonari di questo, s'avvisa tra l'istessi vasi nell'altro: Or poicche per comun confessione di tutti i Notomisti moderni passa molta minor quantità di sangue per lo polmone del Feto, che per quello di un Fanciullo di fresco nato, ha egli tutta l'apparenza di vero, che in questo il gonfiamento delle vesciche del polmone debba dilatare i suoi vasi, non che comprimerli; ond'è che si vegga il canal di comunicazione tra l'arteria pulmonare, e l'Aorta nel Feto, chiudersi dopo il nascimento di esso; perciocchè i vasi del polmone venendo dilatati dal gonfiamento, che l'aere, qual'entra nelle sue vescichette, che circondano i suoi vasi, produce, il sangue, che prima passava per lo canal di comunicazione, ave allora più agevolezza a scorrere oriz.

orizzontalmente a dritta, & a manca ne' due rami dilatati dell'arteria del polmone; che a montare dal tronco di detta arteria nell'Aorta per lo canal di comunicazione. Giro, che il sangue di questo canale non mai avrebbe potuto prendere, se'l gonfiamento delle vesciche del polmone fusse capace di comprimere suoi vasi.

Altri Notomisti allo 'ncontro assicurano, che l'aere, qual noi respiriamo, s'insinui dalle vesciche del polmone ne' suo' vasi, per pignere il sangue, & agevolare così la sua circolazione, mischiandosi con lui nelle reiterate respirazioni: Ma tra coloro, che ammettono questa mescolanza dell'aere col sangue, non rinvengo pur uno, che siasi avvisato a ricercare se l'aere, qual' entra dalle vesciche del polmone per le sue vene nel ventricolo sinistro del cuore, dopo di essere stato scomparito per mezzo delle Arterie in tutte le parti, scappi via per i pori della pelle insieme con i vapori, che escono da suo' docci; o se l'aere rientrando in parte nelle vene ritorni per queste al cuore, e dopo di aver finita la sua circolazione ripassi dalle arterie del polmone nelle vesciche, per prendere il diritto della Trachea, & uscir per lo naso, e per la bocca nel rendere il respiro, quante volte il petto si strigne. Questo appunto è quello, che io vò disaminando.

Poicché e' può tenersi per fermo, dopo l'esperienza e le osservazioni di più savj Autori, che in un giorno esali maggior quantità di materie o di escrementi per gl'insensibili pori della pelle, di quel che non esca in molti giorni per lo naso, bocca, ano, e vescica; e' sembra alle prime, non vi esser luogo a dubitare, che l'aere, qual' entra per mezzo della respirazione ne' vasi del sangue

gue , non possa , o non debba uscire per i pori della pelle , con l'istessa facilità , che i vapori , e sudori scappano pe' docci di essa : Frattanto molte osservazioni sembrano di pruovar il contrario : Io ne recherò solamente tre delle più considerabili , che fan molto al mio caso.

Se si riempia lo stomaco d'acqua , il cuore , o alcun doccia grande di arteria , o di vena , l'acqua trapela per gl'interstizj delle fibre carnose del cuore , si feltra per i pori delle membrane dello stomaco , e trapassa quelle delle arterie e delle vene ; ma se in questi stessi vi si rinchiuda l'aere , non potrà egli scappar via , purché si prenda cura a ligare esattamente i vasi del cuore , i due orifizj dello stomaco , e tutti i piccioli rami di un'arteria , o vena considerabile , sì che l'aere non possa uscire per alcuna delle parti ligate . La seconda osservazione è , che dopo morte gli umori degli occhi si dispergono per traverso delle sue membrane ; allo 'ncontro se il globo dell'occhio si voti per lo nervo ottico degli umori che comprende , com' egli è facile a farsi , e che indi si riempia di aere , avendo legato prima il nervo ottico , l'aere si fermerà nel globo , nè potrà dissiparsi , come fanno gli umori di esso , per i pori delle sue membrane : Sembra dunque per queste due osservazioni molto verisimile , che l'aere , qual noi respiriamo , non debba scappar per i docci , o pori insensibili della pelle , come i vapori fanno , & i sudori . Questa terza osservazione , che reco , visibilmente ciò dimostra .

Gli Animali , che si rinchiudono nella Macchina Pneumatica , altrettanto più si enfianno , quanto che ella più esattamente si vota dell'aere grossolano , che contiene , dopo di che si rimangono gonfi ; locche non dovrebbe avvenire , se per i pori

pori della loro pelle potesse uscir fuori l'aere; perciocche se egli scappasse per i docci insensibili, dovrebbero immediatamente detti Animali sgonfiarsi dopo uscito detto aere: & allora le parti ricadendo sù di se per loro proprio peso, o strignendosi per loro molla naturale, come loro avviene quando la pelle si fende in questa machina, ridurrebbero il loro corpo in una più picciola ampiezza di quella, che avean prima di esser questi Animali espolti: Or poicche enfiato essi, tanto che la resistenza della loro pelle può bilicarsi con la molla dell'aere interiore disperso in tutte le parti del corpo, tenendo con lui un giusto equilibrio, egli è molto probabile, che l'aere, qual noi respiriamo, e che dalle vesciche del polmone per le sue vene passa nel cuore per pignere il sangue, in mischiandosi con lui in tutti i vasi non se ne divida per uscire con i vapori, e sudori per i pori insensibili della pelle.

Per distruggere tal sentimento, potrà forse opporsi, che la maggior parte de' pesci, qual si esponga nella Machina Pneumatica, renda per di sotto le scaglie molto aere; locche manifestamente appare, qualora i pesci vivi nuotino nell'acqua, stando nel voto: Ma se si voglia ben disaminar questa sperienza dal Signor *Homborg* dimostrata all'Accademia, si vedrà, che ella conferma tutto quel ch'io ho detto: perciocche se questo aere, che si vede scappar di sotto le squame, uscisse dal corpo istesso del pesce per i vasi della pelle, egli, che nel voto si gonfia, dovrebbe sgonfiarsi dopo uscito l'aere; ma per lo contrario egli riman enfiato con tutta la gran quantità di bollicelle aeree, che si veggon scappar di sotto dalle sue squame; Convien dunque credere, che l'aere compreso sotto di esse squame sia quello che produca, in dilatandosi, tali bollicelle,
e non

• non già lo rinchiuso nel corpo istesso del pesce. La pruova di ciò si è, che 'l pesce, quale nel voto ha renduto una volta l'aere nascosto sotto le sue squame, non lo rende più per queste parti, quando si mette la seconda volta nel voto, come ha fatto vedere detto Signor *Homborg*, e frattanto il suo corpo gonfiassi di nuovo in ogni volta che si ripone nel voto. Se a questa sperienza si opponga, che la vipera si sgonfi nella Machina, e che perciò l'aere debba uscire dal suo corpo per i pori della pelle, io confesserò che l'aere venga fuori dal corpo della vipera, ma nego che ciò facciano per i pori della pelle; & eccone la ragione. Il polmone della vipera forma un sacco cieco, lungo un piede, e di circa un dito di diametro; è dunque egli chiaro che debba questi contener maggior quantità di aere di quella, che può essere scompartita in tutte le rimanenti parti del suo corpo. Essendo così, dico, che quante volte nel voto l'aere del polmone verrà a superare con la sua molla lo sforzo de' muscoli della laringe che in esso lo ritien ristretto, debba egli aprire la laringe chiusa da suoi muscoli; donde avviene che la vipera si sgonfi, perciocchè l'aere del polmone esce allora per l'apertura della Trachea: Ma dopo uscito, i muscoli della laringe, non essendo più forzati dal moto dell'aere, devono chiudere l'apertura di essa fin a tanto che il rimanente aere grossolano ne' polmoni dilatandosi di nuovo risalga la seconda volta, e sforzi detti muscoli; questo appunto è quel che avviene sensibilmente, e vedesi dall'eruttazione che fa l'Animale. Inoltre il solo ventre della vipera è quel che si sgonfia, mentre che tutto il rimanente corpo sta enfiato; ond'è, che quantunque la vipera si sgonfi nel voto, e' non par che l'aere scappi

via da' pori della pelle . Queste sperienze dunque, in vece di servir di pruove che l'aere elca da' vali escretorj della pelle, porgono per lo contrario una conghiettura molto verisimile per dimostrare, che l'aere qual noi respiriamo non possa uscire da tali docci impercettibili . Apparirà ciò più evidente ancora nello spiegamento delle ragioni perche l'aere non debba venir fuori per i pori della pelle .

Non perche l'aere , che respiriamo , non esce con i vapori e sudori per i vasi della pelle , deesi conchiudere che egli affatto non venga fuori da vasi sanguigni , ne' quali s'insinua: perciocche, se ciascuna respirazione fa che nuovo aere entri in essi, egli è facile a comprendere , che, se l'istessa quantità d'aere che s' immette ne' vasi non ne uscisse di bel nuovo per alcun verso, in poco tempo se ne raccorrebbe sì gran quantità nel cuore e nelle arterie , che la forza de' spiriti animali oppressi dalla molla di esso non sarebbero valevoli alla contrazione delle sue parti, senza la quale il sangue non potrebbe tragittarsi nelle vene ; in maniera che l'istess' aere che dà la prima spinta al sangue, in entrando dalle vescichette del polmone per le sue vene nel cuore, farebbe cessare in fine la circolazione del sangue, se e' fusse ritenuto ne' vasi ; ond' è che bisogna, che a misura ch' egli entra per alcuna via n'elca ancora . Ma se l'aere, che comincia a mischiarsi nelle vene del polmone col sangue per pignerlo nel ventricolo sinistro del cuore, e di là per le arterie in tutto 'l corpo dell' Uomo, abbandonasse il sangue in passando con lui nelle parti , e scappasse con i vapori e sudori per i pori della pelle, avverrebbe, che 'l sangue non essendo più mosso dall' aere al di là delle parti non potrebbe entrar nelle vene, o se pur vi passasse,

lasse, vi si rimarrebbe, o mancherebbe nel suo moto; perciocchè le vene non solamente di per loro non an contrazione alcuna per rispignerlo, e farlo ritornare al cuore, ma ne contengono ancora la metà di più delle arterie: ond'è che an bisogno dell'aere per farlo circolare in esse, come si vede.

Or poicche egli è chiaro, che non minor forza abbisogni per rispignere il sangue dalle parti per le vene al cuore, di qualche si richieda per pignerlo dal cuore per le arterie alle parti, il pignimento dell'aere, qual'è una delle cagioni principali del moto circolare del sangue, dovrà essere così vigoroso nelle vene come nelle arterie; perciocchè le vene devono rendere al cuore quasi che altrettanto sangue quanto esso cuore dà per mezzo delle arterie alle parti, lo che è assolutamente necessario per continuare in tutti i vasi la circolazione. Essendo così, e' si vede, che l'aere debba scorrere col sangue per tutti i vasi, e dopo questo debba abbandonarlo; donde si deduce, che la circolazione dell'aere debba finire dov'è cominciata; e poicche principia il suo giro nel polmone, deve dunque terminare in esso. Vedesi perciò, che l'aere, qual si fugge per l'aspera arteria nel polmone, passi dalle sue vescichette per le sue vene nel ventricolo sinistro del cuore: e che l'aere, che s'immette nel ventricolo destro, ripassi per i rami dell'arteria del polmone nelle vesciche istesse, donde scappi fuori per l'aspera arteria: e l'istesso polmone, qual serve ad introdurre l'aere, serva ancora a farlo uscire. Per tutte queste ragioni sembra molto verisimile, che i pori della pelle siano stati formati in una maniera propria a ritenere in dentro del corpo le particelle dell'aere che noi respi-

riamo, a fine di rinchiuderlo ne' vasi, perche servisse egli per la sua molla e per la sua mescolanza al moto circolare del sangue, che non avrebbe potuto fare, se avesse avuta la libertà di uscire per i docci insensibili della pelle co' sudori e vapori.

D E L L E

FORZE CENTRALI,

Ovvero de' pofsi neceffari a' Pianeti, per farli deferivere le Orbite fuppoſte loro finora.

DEL SIGNOR VARIGNON.

GLI Antichi Aſtronomi davano a Pianeti velocità uniformi ſù l'orbite circolari, che loro facean deſcrivere. *Copernico* iſteſſo credea di non poterſi farne a meno: *Fieri nequit* (dic' egli *revol. lib. 1. pag. 2.*) *ut Caleſte corpus ſimplex uno orbe inaequaliter moveatur*, di maniera che per iſpiegar l'inegualità loro, erano aſtretti di ricorrere agli Eccentrici & Epicicli, dall' imbarazzo de' quali l'iſteſſo *Copernico* non ha potuto affatto diſbrigarſi.

Ma dopo lui ſon venuti Aſtronomi, che con un poco più di Fifica non anno avuta la difficoltà di far muovere i Pianeti con velocità realmente in ciaſcuno differente, e di cambiare ancora le loro orbite circolari in Ellittiche, di cui loro anno aſſignate due ſpezie: La prima è di *Kepler*, e queſta è l'Elliffe ordinaria, alla quale *Setbus Wardus* (chiun-

• 13. Novembre 1700.

(chiunque e' sia) crede che potrebbero sostituirsi le orbite circolari , servendosi di due punti presi in ugual distanza dal centro sopra uno de' loro diametri , come farebbesi de' fuochi di detta Ellisse. La seconda è del Signor *Cassini* , la quale consiste nell'avere i prodotti delle rette tirate da ciascun punto della sua circonferenza a' due suo' fuochi, in ogni luogo uguali ; quando che nell' Ellisse ordinaria, la somma di dette rette è quella , che sempre è la stessa .

Dal primo de' due Lemmi , che sieguono , si vedrà come il sentimento di *Copernico* sia poco conforme alla *Mecanica* de' Cieli ; perciocche, secondo detto Lemma , le forze necessarie a' Pianeti verso il di dentro delle loro orbite, per descriverle e far sì che non scappino per le loro tangenti , devono quasi che sempre drizzarsi a farli muovere con velocità realmente differenti ; e che in una infinità di casi , un solo ve ne sia , dove possano essi muoversi uniformemente.

Il Signor *Newton* e Signor *Leibnitz* son primi e soli , per quel ch' io sappia , che an ricercate queste gravità de' Pianeti : Eccole ancora in un' altra maniera . E poicche la maggior difficoltà consiste ne' moti variati di detti Pianeti sù le loro orbite , comincerò io da i Sistemi che li suppongono tali , e secondo l' ordine che anno essi immaginato , per terminare in fine con que' che li suppongono uniformi , quantunque siano i più antichi : tanto più , che questi non formano altro che un caso tra l'infinità di altri , come disamino nel Corollario secondo del primo Lemma seguente . Sia perciò dunque

DEFINIZIONE.

In una qualunque curva, dico *Raggi dell'e forza* del corpo che la descrive, quelle rette, che son tirate da detto corpo al punto dove concorrono le direzioni che deve esso avere per descriverla, senz' altro ajuto che della prima impressione in qualunque angolo con la prima di dette direzioni, e senza potere scappar per la tangente nel punto dove si ritrova, come avverrebbe senza di tali forze, ch' i' dirò *Centrali*, le quali son le sole che suppongo in lui in tutta la durata del suo moto.

LEMMA PRIMO.

Se suppongasi che un corpo L, la di cui forza Centrale tenda in C per LC, descriva una qualunque curva QLM in un mezzo che nè accresca nè scemi il suo moto, appunto come se e' si muovesse nel vuoto; la sua velocità secondo LM sù di detta curva sarà uniforme allora che tutti i raggi LC delle fræe saranno perpendicolari a questa istessa curva. All' incontro sarà essa sempre accelerata, qualora l'angolo CLP sarà acuto, e ritardata, quando sarà egli ottuso.

Dimostr. Siano i raggi CL, Cl, indiffinitamente l'un l'altro prossimi; sia inoltre descritto dal centro C l'arco LR., che incontri LC in R, dal qual punto R sia parimente RP perpendicolare sopra di Ll. Posto ciò è chiaro, che se la forza centrale del corpo L non facesse impressione sù di
det-

• *Fig. 1.*

detto corpo, che secondo PR (Ipotesi) perpendicolare alla curva QLM, e non secondo la direzione LP di detta curva, questa forza lo riterrebbe sù di questa istessa curva senza nè accelerarlo nè ritardarlo, non facendo nè prò nè contra il suo moto secondo L: Ma se ella facci lui ancora impressione secondo LP, l'accelererà; perciocchè quel che deve risultarli di velocità in questo verso, la deve accrescere. Per l'istessa ragione questa forza centrale ritarderebbe il moto di questo corpo secondo LQ per l'impressione contraria di LP, che farebbe sù di lui. Or fin tanto che il raggio di tendenza LC è obbliquo alla curva, la forza centrale del corpo L verso C non opera solamente secondo PR, ma secondo LP ancora a seconda del suo moto verso M, se l'angolo RLP sia acuto, o contro di detto moto, se l'angolo sia ottuso. Dunque parimente la forza centrale tendente in C accelererà per allora, o ritarderà sempre il suo moto, fuorchè quando detto angolo sarà retto. Locche &c.

COROLLARIO I.

Un corpo dunque, che descriva una qualunque curva con le forze centrali che tendono tutte ad un istesso punto C, non farebbe il suo moto uniforme sù di detta curva, se non se allora che fusse questa un cerchio, e C il suo centro; poicché fuor del circolo non vi ha curva, le di cui perpendicolari tutte concorrano ad un istesso punto.

COROLLARIO II.

*. Perche dunque il moto sù di quella curva che si vorrà ALM sia uniforme, bisogna, che le forze centrali del corpo mosso tendano secondo i raggi della sua sviluppata AC, cioè, che i raggi delle forze siano raggi essi stessi LC della sviluppata, poiche tutti e singoli son a lei perpendicolari. In tal caso R & P confondendosi con L, la forza centrale tendente in C non farà più impressione secondo la direzion della curva, ma solamente secondo la perpendicolare LC; in maniera che il moto del corpo L secondo LM non sarà più accelerato nè ritardato; locche farà allora gli archi Ll (ds) scorsi in ragion de' tempi (dt) impiegati a scorrerli, ovvero $ds = dt$.

S C O L I O.

Fra le molte regole che io ho delle forze centrali, così *centrifuga*, che *centripete*, io quì non mi servirò di altra, che di quella che io diedi a 31. Marzo ultimo, all' Accademia. E per non supporre cosa che sia detta altrove, in poche parole ecco la dimostrazione.

L E M M A II.

* *Ritrovare le forze centrali in generale di un corpo L, che descriva una qualunque curva.*

60-

* *Fig. 2.** *Fig. 1.*

SOLUZIONE.

Siano ancora del centro C della prima figura i raggi CL , Cl , indiffinitamente prossimi con gli archi LH , lR , il primo de' quali incontri AC in H , & il secondo CL in R ; dal qual punto R sia tirata RP perpendicolare su di Ll . Siano inoltre $AH = x$, HC , ovvero $LC = r$, $Rl = dz$, $Ll = ds$; v = alla velocità del corpo mosso in L secondo LM , dt = al tempo (istante) che detto corpo impiega a scorrere Ll , y = alla sua forza centrale in L , o a quella gravità che egli ha verso C . Posto ciò, si terrà dv per accrescimento della velocità che risulta da detta forza (y) al corpo mosso secondo Ll nell'istante ds ; & dds per quello spazio, che detto corpo scorre in virtù di tale accrescimento di velocità; Prendendo in fine $AC = a$, si avrà parimente $a = x + r$; locchè dà $dx + dr = 0$, ovvero $dx = -dr$, differenziando positivamente il tutto.

In questo conto la forza assoluta (y) in L verso C , essendo a quella che 'l corpo mosso riceve da lei secondo Ll : $LR \cdot LP :: Ll (ds) \cdot LR$
 (dx) ; questa forza secondo Ll farà $= \frac{y dx}{ds}$. Ma i

spazj scorsi con delle forze costanti e continuamente applicate, come per ordinario è 'l peso il quale è ancora una forza tutta istantanea, essendo in ragion composta delle sue forze, e de' quadrati de' tempi impiegati a scorrerli; si avrà parimente $dds = \frac{y dx}{ds} \times dt^2$. Dunque $y = \frac{dds}{dx dt^2}$ Locchè &c.

SCQ

S C O L I O.

Se a questa Figura 1 si aggiunga una curva TD, le di cui ordinate HT (perpendicolari sopra AC) esprimano i tempi, secondo i quali si devono regolare i moti del corpo, qual si suppone descrivere la curva QLM; e che dopo di aver tirate a punti corrispondenti L, T, di dette curve date QL, DT, le tangenti LN, TK, con CN perpendicolare a CL, s'immagini ancora un'altra curva BO, qual abbia le sue ordinate per tutto corrispondenti HB

$E \propto LN \propto HK$
 $= \frac{E \times LN \times HK}{LC \times HT}$, di cui E sia una grandezza costante arbitraria, & BG la sua tangente in B: Si avranno ancora in generale le forze centrali $\gamma = \frac{LN \times TK^2}{HG \times LC \times HT^2}$

. Quantunque però semplice ella sembri questa formola, per essere in grandezze tutte finite, e per facile che in fatti ne sia l'uso, bisogna pur confessare che sia molto inferiore alla precedente: Quindi è, che noi non ci atterremo a questa, ma all'altra, che ne servirà sempre di regola generale per l'avvenire.

R E G O L A

$$\gamma = \frac{drdr}{dxdt^2}$$

AVVERT. Ecco alcuni usi di questa regola ne' seguenti Problemi, secondo l'ordine qui sopra avvisato, in prendendo sempre i tempi (t) come l'ajo

Paje ACLQ $\left(s \frac{rdz}{2} \right)$, ovvero $dt = rdx$ secondo la

Prop. 1. sez. 2. lib. 1. del Signor Newton De Philosoph. nat. princ. mat.

PROBLEMA I.

* Siano, come il Signor Newton, Signor Leibnitz, con Kepler suppongono, le orbite de' Pianeti vere Ellissi, nel comun fuoco delle quali sia il Sole; ritrovare quali debbano essere le gravità, o gli sforzi di detti Pianeti verso il Sole, perche così descrivano le orbite Ellittiche.

SOLUZIONE.

Sia dunque l'orbita di un qualunque Pianeta L, l'Ellisse ALB, i di cui fuochi C, & D, nel primo de' quali sia il Sole C. Tenendo le stesse maniere di sopra (Lemma 2.), cioè $CL = r$, la parte R l dell'arco bl (descritto dal centro C) $= dz$, $Ab = x$, $AL = S$, & $y =$ alla forza centrale, o al peso verso C del Pianeta in L; sia inoltre l'asse maggiore (dell'Ellisse) $AB = a$, e la distanza (de' fuochi) $CD = c$.

La natura dell' Ellisse ordinaria, di cui qui si parla, darà $dr \sqrt{aa - cc} = dz \sqrt{c - aa + 4ar - 4rr}$ per sua equazione al fuoco C, ovvero (in prendendo $bl = aa - cc$) $bdr = dz \sqrt{4ar - 4rr - bb}$. Dunque $\frac{4ar - 4rr}{4r - 4r} \times \frac{dz^2}{b^2 ds^2} = \frac{bbdr^2 + bbdz^2}{b^2 c^2}$, ovvero $\frac{r}{r} = \frac{r dz^2}{r dz^2} \text{ (avert.)} = \frac{dz^2}{dz^2}$; e prendendo dr per costante, $\frac{21 b^2 r ds}{ds^2} = \frac{21 b^2 r ds}{11} \text{ (Soluz.)}$

Lemma

* Fig. 3.

Le^m. 2.) $\frac{4addx}{rr}$, ovvero $\frac{2a}{bbrr} = \frac{dsds}{dxdr}$ (reg.)

$= y$. Cioè (a cagion della frazion costante $\frac{2a}{bb}$),
le forze centrali , o li pesi del Pianeta L , verso il
Sole , o fuoco C , come $\frac{1}{rr}$, ovvero in ragion reci-
proca de' quadrati delle sue distanze LC (r) da
detto fuoco. Locche &c.

COROLLARIO I.

L'istesso $\left(y = \frac{2a}{bbrr} \right)$ si rinverrà per l'I-
perbole, di cui C farà il fuoco interiore; poicché in-
prendendo solamente $bb = cc - aa$, perciocché
ha ella $c > a$, avrà parimente l'istessa equazione
 $bdr = dz \sqrt{4rr + 4rr + bb}$, come l'Ellisse precedente,
fuorchè $-4rr$, che quì si cambia in $+4rr$.

COROLLARIO II.

Se oltre a ciò si cambino i segni di $4rr - 4rr$
per l'Iperbole di cui C farebbe il fuoco esteriore, l'
equazione $bdr = dz \sqrt{4rr - 4rr - bb}$, che ne risulti.

rà, darà parimente $y = \frac{2a}{bbrr}$: Cioè le forze centra-

li riguardo a detto fuoco in ragion reciproca de'
quadrati delle distanze cl ; con questa sola differen-
za, che saranno quì dette forze centrifughe, o di leg-
gerezza, quando che nell'Ellisse, e negli altri fuo-
chi dell'Iperbole, eran esse centripete, o del peso.

COROLLARIO III.

Se si faccia ora $BC = m$; avendo nell'Ellisse $aa - cc (bb) = 4am - 4mm$, e nell'Iperbole $cc - aa (bb) = 4am + 4mm$, ovvero da una parte, e dall'altra $bb = 4am$ in facendo $a (AB)$ infinita, come nella parabola, in cui allora l'Ellisse, e l'Iperbole si cambiano; non occorrerà altro che sostituire quest'ultimo valore di bb nella formola $y =$

$\frac{2a}{4m} \frac{1}{1}$ della Soluzione, e del Coroll. I., per avere

$y = \frac{1}{2m} \frac{1}{1}$ al fuoco di detta Parabola; cioè le

forze centrali ancora, che tendono a detto fuoco in ragion reciproca de' quadrati delle distanze $CL, (r)$ da questo istesso fuoco al corpo, che la descrive.

COROLLARIO IV.

Quindi in generale le forze centrali, che tendono a qualunque fuoco della sezion conica, sono in tutte dette sezioni in ragion reciproca de' quadrati delle distanze da detto fuoco a corpi che le descrivono,

S C O L I O.

Tutto ciò è conforme a quel che i Signori *Newton* e *Leibnitz* anno a loro modo dimostrato: Il primo nelle *Proposiz. 11. 12. e 13. del lib. I. del suo eccellente trattato De Phil. nat. princ. mathem.*; Et il secondo nel Mese di Febrajo degli Atti di *Leiptik* del 1689.

A V V E R T I M E N T O II.

Dall'avvertimento, che alla regola precedente siegue, si vede, che 'l mio primo disegno li era di ricercare le forze centrali de' Pianeti nell'ipotesi di *Kepler*, del *Signor Newton*, e *Leibnitz*, come il più filico, in proponendomi di fare sempre $dt = r dz$; ma avendo considerato di poi che questa ipotesi de' tem. i non sia la sola che si faccia nell'Astronomia, ecco come ho soddisfatto a tutto, in prendendo solamente $r dz$ costante in questa Regola, come ella la suppone, qualunque mai siano le ipotesi de' tempi, o i valori di dt .

P R O B L E M A II.

*Lasciando le cose come nel Prob. I. *, toltone che qui si suppongono i tempi (t) che il Pianeta L impiega a scorrere gli archi AL dell' Ellisse ALB in ragion degli angoli ADL, ovvero degli archi AE descritti dal fuoco D come centro, quale appunto Sethus Wardus lo suppone con molti Astronomi moderni, i quali ritengono qui da Kepler non altro che la sua Ellisse, cioè $AE = t$, ovvero $Ee = dt$: Si cercano ancora in questa ipotesi gli sforzi, o pesi di questo Pianeta L verso il Sole C.*

S O L U Z.

Sia di più descritto l'arco Lr dal fuoco D, come centro, & $AD = m$ costante. Essendo proprietà dell'ell'Ellisse ordinaria, di cui si parla qui, l'a-

ye-

* Fig. 3.

vere $DL + LC = DI + IC$, e gli archi IR, Lr descritti (*ipot.*, di centri $C, \& D$, dando allo 'ncontro $DL + RC = Dr + IC$; ne risulterà $LR = r$. E per conseguenza ancora $Lr = IR$ (*ipot.*) $= dz$. Ma $LD(a-r) \cdot DE$, ovvero $AD(m) :: Lr(dz)$.
 $Ee(dt) = \frac{mdz}{a-r} : \text{Locche dà } dt^2 = \frac{mm dz^2}{a-r^2}$.

Ma nella soluzione del Problema precedente si è ritrovato $bdr = dz \sqrt{4a^2 - 4r^2 - b^2}$, ovvero $4ar - 4rr = dz^2 = b^2 dr^2 + b b dz^2$; locche dà
 $\frac{4ardz^2 - 4r^2 dz^2}{b^2} = dz^2$, e donde inoltre

risulta $2dsdds = \frac{4arddz^2 + 8arddzdz^2 - 8r^2 dz^2 - 8r^2 dddz}{b^2}$,

ovvero $\frac{dsdds}{dx dz^2} (y) = \frac{2arddz^2 - 4r^2 dz^2 + 4arddzdz^2 - 4r^2 dddz}{b^2}$

(avvertimento $2ddz = \frac{drdr}{r}$) $= \frac{2arddz^2 - 4r^2 dz^2 + 4arddzdz^2 - 4r^2 dddz}{b^2}$

$\frac{2arddz^2 - 4r^2 dz^2 + 4arddzdz^2 - 4r^2 dddz}{x dz^2} = \frac{2arddz^2}{b^2 dx dz^2}$ (per ca-

gion di $dx = -dr$ *soluz. lem. 2.*) $= \frac{2ardz^2}{b^2 dx dz^2}$ (perche

$dx = \frac{mm dz^2}{a-r^2}$) $= \frac{2a \times a-r^2}{bbmm} = \frac{2a}{bbmm} \overline{DL}^2$
 cioè, che le forze centrali, che tendono in C sareb-
 bero quì come i quadrati delle distanze dal Pianeta
 L all'altro fuoco D dell'Ellisse, che egli descrive.
 Locche &c.

S C O L I O.

Si vede bene dal Corollario del Problema I, che tutto ciò si possa applicare all' Iperbole, & alla Parabola. E questo per quel che si attiene all' Ellisse ordinaria introdotta da *Kepler* nella Stronomia: Vediamo ora quella del Signor *Cassini*.

P R O B L E M A III.

* Sia presentemente l'Ellisse del Signor *Cassini* l'orbita ALB de' Pianeti, sicche C & D essendo ancor esse i fuochi presi su' l' suo asse maggiore AB, dia sempre $CL \times LD = AC \times AD = AC \times CB$, sopra di cui detti Pianeti si muovono in tempi (t), che siano ancora come gli angoli ADL corrispondenti agli archi AI, scorsi, cioè, che siano in ragione degli archi circolari AE descritti dal fuoco D come centro: in maniera che prendendo detti archi AE per i cennati tempi (t), si abbia ancora $Ee = de$; Si dimandano gli sforzi, o le gravità necessarie a detti Pianeti verso il sole C per far loro descrivere tali Ellissi.

S O L U Z.

Siano ancora $CL = r$, $AL = s$, $Ab = x$, $Rl = dz$, $CD = c$, & AD , ovvero $CB = m$; sia inoltre AC , ovvero $BD = a$. Per la supposizione avremo $a = m + c$; e per la natura di tale Ellisse am ($AD \times BD$) $= r \times DL$ ($CL \times DL$): Donde risulta $LD = \frac{am}{r}$: Locchè per la Geometria ordinaria, (il

cal-

* Fig. 2.

calcolo è più lungo, che difficile) darà per equazione al fuoco C di detta Ellisse $ds^2 =$

$$3a^4m^4 + 8a^2m^2r^4 - 4a^2m^2c^2r^2$$

$$2a^2m^2c^2r^2 - a^4m^4 + 2a^2m^2r^4 - c^4r^4 + 2c^2r^4 - r^2 \times dr^2$$

In maniera che prendendo $p = 8a^4m + 8a^2mm^2r^4 - 4a^2mm^2ccrr$, & $q = 2a^2mm^2ccrr - a^4m^4 + 2a^2mm^2r^4 - c^4r^4 + 2ccr^4 - r^8$, si avrà parimente $ds^2 = \frac{pdr^2}{pds^2 - pdz^2}$, donde risulta

$$qds^2 = pds^2 - pdz^2, \text{ ovvero } ds^2 = \frac{pdz^2}{p-q}; \text{ Locche}$$

$$\text{dà parimente } 2pdrds = p - q \times dpdz^2 + 2pdzddz - dp + dq \times pdz^2$$

$$= \frac{pdqdz^2 - qdpdz^2 + p - q \times 2pdzddz}{p - q} \left(\text{Avert. 2. } ddz \right)$$

$$= \frac{drdz}{r} \left(\frac{p - q}{p - q} \frac{pdqdz^2 - qdpdz^2 - 2ppdrdz^2 + 2pqdrdz^2}{r \times p^2 - q} \right)$$

$$\text{Dunque } \frac{dxds^2}{dxds^2}, \text{ ovvero (Reg.) } \frac{p - q \times 2r dx dz^2}{dr \text{ Soluz. , Lem. 2.)}$$

$$\times \frac{ds^2}{qdp - prdq + 2ppdr - 2pqdr} \times ds^2 = \frac{p - q^2 \times 2r dr dz^2}{p - q^2 \times 2r dr dz^2}$$

$$\text{Or poicche } LD = \frac{am}{r}, \text{ si avrà ancora la sua differenziale } Lr = \frac{-amdr}{r^2}; \text{ \& in conseguenza } L^2 =$$

$$(L^2 - Lr^2) = ds^2 = \frac{a^2mm^2dr^2}{r^2} = \frac{r^4ds^2 - a^2mm^2dr^2}{r^2}$$

$$\text{Di più } LD^2 \left(\frac{a^2mm^2}{r^2} \right) = \frac{r^4}{L^2D^2}, \text{ ovvero } \overline{4D^2} (mas) ::$$

Memor. 1700.

6

L^2

$$\frac{r^4 ds^2 - aammr^2}{r^4} \frac{dr^2}{dr^2} = \frac{r^4 ds^2 - aammr^2}{r^4 ds^2 - aammr^2 - aammr^2}$$

$$\left(dr^2 = ds^2 - dz^2 \right) = \frac{r^4 ds^2 - aammr^2 - aammr^2}{aarr}$$

$$\left(\text{a causa di } ds^2 = \frac{pdz^2}{p-q} \right) = \frac{pr^4 - aammr^2 + aammr^2 - aammr^2}{p-q \times aarr}$$

$$\times dz^2 = \frac{pr^4 - aammr^2}{p-q \times aarr} \times dz^2. \text{ Dunque in sostituendo}$$

questo valore di ds^2 nel precedente valore di y , si avrà la forza centrale ricercata $y =$

$$\frac{aaqrdrp - aaqrrdq + aaaprrdr - aaapqdr}{p-q \times pr^4 - aammr^2 \times adr}$$

Ma secondo i valori primi di p , e di q , si avrà $dp = 32aammr^3dr - 8aammccrdr$, & $dq = 4aammccrdr + 8aammr^3dr - 4c^4r^3dr + 12ccr^3dr - 8r^7dr$. Dunque sostituendo questi valori di dp , & dq nell'ultimo valore di y , si avrà in fine

$$y = \frac{\begin{aligned} &+16a^4mmqr^3 - 4a^4mmccqr^3 - 2a^4mmccpr^3 - 4a^4mmpr^5 \\ &+ 2aac^4pr^3 - 6aacpr^3 + 4aapr^3 - aappi - aapqr \end{aligned}}{p-q \times pr^4 - aammr^2}$$

per l'espressione delle forze centrali, che tendono al fuoco C dell'Ellisse del Signor Cassini descritta in tempi, che sono come gli angoli ADL, com'è suppone. *Locche &c.*

PROBLEMA IV.

Non variando le cose da quel che sono nel Problema 3., fuor che in vece di supporre, come il Signor Cassini, i tempi (t) sopra di AL in ragione degli

Fig. 3.

an-

angoli ADL, si suppongono nella maniera di Kepler, cioè in ragione de' spazi, o delle aje ACL, sicche se avrà qui dt , come i spazi LCL, che la regola suppone costanti, ovvero $dt = r dz$ costanti. Si richiedono ora le forze centrali, che tendano al fuoco C dell' Ellisse del Signor Cassini, necessarie ad un Pianeta, perche descriva egli questa Ellisse in tale ipotesi di tempi.

S O L U Z.

Poiche (Solut. Prob. 2.) $ds^3 = \frac{r dz^2}{p - q}$, si avrà parimente $\frac{p}{p - q} = \frac{dz^2}{dz^2}$, ovvero $\frac{p}{p - q} = \frac{p}{p - q}$

(ipotesi) $\frac{p}{p - q} = \frac{p}{p - q}$. Dunque (essendo supposta lt , costante) $\frac{p}{p - q} = \frac{p}{p - q}$

Dunque parimente $\frac{p}{p - q} = \frac{p}{p - q}$, o (regul.) $y = \frac{p}{p - q}$ (poiche $dx = -dr$ Se-

lut. Lem. 2.) $= \frac{p}{p - q} = \frac{p}{p - q}$ (poiche so-
pra Solut. Prob. 2. $dp = 2aammr^3dr - 8aammccrdr$,
& $dq = 4aammccrdr + 8aammr^3dr - 4c^4r^3dr + 12ccr^5dr - 8r^7dr$) $=$

$= \left\{ \frac{26aammr^4 + 4aammccr^2 + pp - 2aammccpr - 4aammpr^4 + 2c^4pr^4 - 6ccpr^6 + 4pr^8 - pq}{r^2 \times p^2 - q} \right\}$

farà l'espressione delle forze centrali richieste per
S a que-

276 *Memorie dell' Accademia Reale*
 queste Ipotesi de' tempi presi nell' Ellisse del Sig.
 Cassini, secondo Kepler . Locche, &c.

P R O B L E M A V.

* In vece dell' Ellisse sia il circolo ALB, come l'Eccentrico degli Antichi, su'l di cui diametro AB sian due punti C, & D, distanti ugualmente dal loro centro F, quali noi chiameremo fuochi, perciocchè per nostro uso tengon luogo de' fuochi dell' Ellisse. Concepiamo ora che i Pianeti descrivono questi cerchi in tempi (t), che siano come gli angoli ADL corrispondenti agli archi AL scorsi, come Sethus Wardus lo suppone: cioè in maniera che l'arco AE (descritto dal fuoco D come centro) sia $= t$, ovvero $dt = Fe$ compreso tra i raggi DL, Dl, indiffinitamente l'un l'altro prossimi. Si dimandano gli sforzi, o le gravità di tali Pianeti in ciascun punto L di queste orbite, verso il fuoco C occupato dal Sole, come fa la Terra nell' Eccentrico degli Antichi.

S O L U Z.

Dopo di aver fatto parimente CL, Cl, indiffinitamente l'un l'altro prossimi, e l'arco lb (descritto dal centro C), che incontri CL in R; sia il raggio FL, con FG & FO perpendicolari su di LC, & LD prolungata; sia ancora $CL = r$, $Ab = x$, $AL = s$, $Rl = dz$, con AD , o $BC = b$, $DL = m$, presentemente variabile, DF ovvero $FC = c$, & $AF = a$; donde risulta $a = b + c$.

Ciò posto, si avrà $Ll (ds) \cdot Rl (dz) :: FL (a)$.
 $LG = \frac{ads}{ds}$. Inoltre $Ll (ds) \cdot LR (dr) :: FL (a)$.

FG

* Fig. 4.

$$FG = \frac{adr}{aadr^2} \cdot \text{Dunque } CG (\sqrt{FC^2 - FG^2}) = \sqrt{cc - \frac{adr^2}{aadr^2}}$$

$$\frac{ds^2}{ds^2} \cdot \text{Dunque parimente } CL (r) = \frac{adr}{ds^2} +$$

$$\sqrt{ccds^2 - aadr^2} \text{ ovvero } rds - adr = \sqrt{ccds^2 - aadr^2};$$

$$\text{e quadrandola, } r r d s^2 - 2 a r d s d a = c c d s^2 - a a d r^2$$

$$- a a d s^2 = c c d s^2 - a a d s^2, \text{ ovvero } 2 a r d s = r r +$$

$$a a - c c \times d s \text{ (sia } 2 a n = r r + a a - c c) = 2 a n d s,$$

$$\text{ovvero } \frac{a a r r d s^2}{n^2} = \frac{d s^2}{n^2 d s^2} = \frac{d s^2}{d s^2} + \frac{d r^2}{a a r r d s^2 - n^2 d s^2}$$

$$\text{dà parimente } d s^2 = \frac{a a r r - n^2}{a a r r d s^2 - n^2 d s^2}, \text{ o } d r^2 = \frac{n^2}{a a r r d s^2 - n^2 d s^2}$$

$$\text{I triangoli inoltre } D L F, \& F L C \text{ avendo (Ipote.)}$$

$$\text{le loro basi } F C, \& F D \text{ uguali faranno parimente}$$

$$\text{uguali; Donde risulterà } r r + m m = 2 a a + 2 c c; \text{ e}$$

$$\text{differenziando } r d r + m d m = 0, \text{ cioè } r d r = -$$

$$m d m, \text{ ovvero } d m^2 = \frac{r r d r}{m m} = \frac{a a r^2 d s^2 - r r n^2 d s^2}{m m^2}$$

$$\text{Dunque (facendo ancora l'arco } L r \text{ del centro } D)$$

$$\text{si avrà } L^2 (d s^2 - d m^2) = \frac{a a r r d s^2}{a a r r d s^2 - a a r^2 d s^2 + r r n^2 d s^2} - \frac{m m m^2}{m m m^2}$$

$$= \frac{a a m m r r - a a r^2 + r r n^2}{m m m^2} \times d s^2. \text{ Si ha ino'tre } L D^2 (m m).$$

$$\overline{E D}^2, \text{ ovvero } \overline{A D}^2 (b b) :: L r^2 \left(\frac{a a m m r r - a a r^2 + r r n^2}{m m m^2} \right.$$

$$\left. \times d s^2 \right). \text{ E se } (d s^2) \frac{a a b b m m r r - a a b b r^2 + b b n^2}{m^2 n^2} \cdot d s^2.$$

$$\text{Ciò posto, } d s^2 = \frac{a a m m r r d s^2 + a a r r d s^2 d d s - 2 a a r r d n d s^2}{n^2} \left(\text{Avvert. 2. } d d s =$$

$$\frac{a a m m r r d s^2 + a a r r d s^2 d d s - 2 a a r r d n d s^2}{n^2} \right)$$

$$\frac{a a b b m m r r - a a b b r^2 + b b n^2}{m^2 n^2} \cdot d s^2.$$

$$\text{Ciò posto, } d s^2 = \frac{a a m m r r d s^2 + a a r r d s^2 d d s - 2 a a r r d n d s^2}{n^2} \left(\text{Avvert. 2. } d d s =$$

$$\frac{a a b b m m r r - a a b b r^2 + b b n^2}{m^2 n^2} \cdot d s^2.$$

$$\text{Ciò posto, } d s^2 = \frac{a a m m r r d s^2 + a a r r d s^2 d d s - 2 a a r r d n d s^2}{n^2} \left(\text{Avvert. 2. } d d s =$$

$$\frac{a a b b m m r r - a a b b r^2 + b b n^2}{m^2 n^2} \cdot d s^2.$$

$$\text{Ciò posto, } d s^2 = \frac{a a m m r r d s^2 + a a r r d s^2 d d s - 2 a a r r d n d s^2}{n^2} \left(\text{Avvert. 2. } d d s =$$

$$\frac{a a b b m m r r - a a b b r^2 + b b n^2}{m^2 n^2} \cdot d s^2.$$

$$\text{Ciò posto, } d s^2 = \frac{a a m m r r d s^2 + a a r r d s^2 d d s - 2 a a r r d n d s^2}{n^2} \left(\text{Avvert. 2. } d d s =$$

$$\frac{a a b b m m r r - a a b b r^2 + b b n^2}{m^2 n^2} \cdot d s^2.$$

$$-\frac{drdz}{r} \Big) = -\frac{2aar^3\phi dz^2}{n^5} \left(\text{perciocche } 2nn = rr \right)$$

$$+ aa - cc \text{ dà } dn = \frac{rdz}{2n} \Big) = -\frac{aar^3\phi dz^2}{n^5} \left(\text{poic-} \right.$$

che *Soluz. Lem. 2.* $dx = -dr \Big) = \frac{aar^3\phi dz^2}{n^5}$. Dunque

$\frac{diddt}{dxdt^2}$, ovvero (*reg.*) $y = \frac{aar^3dz^2}{n^6dt^2}$ (a cagion del

precedente valore di dt^2) $= \frac{aabbmmmm - aabbbmmrr + bbn^6}{rr + aa - cc}$

farà l'espressione delle forze centrali richieste, nella quale nn è $= \frac{rr + aa - cc}{rr + aa - cc}$, & il rimanente, secondo i nomi dati dal principio di questa soluzione. Locche &c.

P R O B L E M A VI.

* Senza variare alcuna cosa dal Problema V., se invece di prendere gli angoli ADL, ovvero gli archi AE per misure de' tempi (t) impiegati a scorrere gli archi AL corrispondenti, si misurino nella maniera di Kepler, per gli spazi, o le aje ACL $\left(\frac{rsdz}{2} \right)$, sicche si prenda $t = rsdz$, ovvero $dt = rsdz$; si cerca sapere gli sforzi, o le gravità del Pianeta L verso C, che li faccian descrivere l'Orbita circolare nell'Eccentrica ALB.

S O L U Z.

Il fuoco D con le rette OL, DI, FO, e gli Archi AEe, Lr, sono quì inutili; e senza di essi (come nella Soluzion precedente del *Prob.V.*) si avrà $2ardz = rr + aa - cc \times ds$ (sia ancora $2nn = rr + aa - cc$)

$= 2nnds$: Locche dà $\frac{a}{nn} = \frac{ds}{rda}$ (*ipot.*) $= \frac{ds}{rda}$, ovvero $\frac{aa}{n^2} = \frac{ds^2}{r^2da}$; e facendo dt costante, $\frac{2adddt}{n^2} = \frac{ds^2}{r^2da}$
 $\frac{-4aan^3dn}{n^5} = \frac{-4aadn}{n^3}$. Ma avendo (*ipot.*) quì sopra

$2nn = rr + aa - cc$, si avrà ancora $dn = \frac{rdr}{n}$. Dun-

que $\frac{2adddt}{ds^2} = \frac{-2a.rdr}{n^6}$ (*Soluz. Lem.2.*) $= \frac{2a.rdr}{n^4}$; & in

conseguenza ancora $\frac{aar}{n^6} = \frac{dsdls}{dxds^2}$ (*reg.*) $= y$, ovvero

$y = \frac{a.a^2}{n^6}$, (perciocche $nn = \frac{rr + aa - cc}{2}$) $= \frac{8aar}{rr + aa - cc^2}$,

cioè, che le forze centrali (y), che tendono verso

C, faran quì come le frazioni $\frac{y}{rr + aa - cc^2}$ corrispon-

denti; Locche, &c.

COROLLARIO I. Indi si vede, che se il centro C delle forze (y) sia in B, avendo allora $c=a$, ovvero $aa-cc=0$, dette forze centrali tendentino in B, faranno come le frazioni $\frac{1}{r^5} \left(\frac{1}{CL^5} \right)$ corrispondenti, cioè in ragion delle quinte potenze de'

de' raggi CL, (allora BL) delle forze centrali richieste.

COROLLARIO II. Ma se 'l centro di queste forze fusse infinitamente dilungato, le grandezze c ,

& r , essendo allora infinite, la formola $\frac{r}{rr+ac+cc}$

precedente, si cambierebbe quì in $\frac{r}{rr-cc}$. In que-

sto caso però il punto C infinitamente dilungato fa $CG=CF=c$, se si supponga $LG=g$, si avrà parimente $r=g+c$; & in conseguenza $rr=gg+2gc+cc$, ovvero $rr-cc=gg+2gc=2gc$, a cagion di c (*ipot.*) infinita riguardo a g . Dunque in tal caso delle forze centrali, che tendono verso C, secondo LC parallela ad AB, si avran parimente queste forze

$$\left(\frac{r}{rr-cc} \right) = \frac{r}{2gc} = \frac{r}{2c^2} \times LG; \text{ cioè come le}$$

frazioni $\frac{1}{LG}$ corrispondenti, o in ragion reciproca

de' cubi delle ordinate LG parallele ad AF, perche le grandezze (*ipot.*) infinite c , & r , rendono co-

stante la frazione $\frac{1}{c^2}$.

SCOLIO. Questi due Corollarj sono stati sciolti già nella Memoria de' 31 Marzo nell'art. 11, e 19, siccome dal Sig. *Newton* lib. 1. *prop.* 2, e 3.

Ecco tutto ciò, che si attiene a differenti sistemi nel variato moto de' Pianeti sù le loro Orbite, mi rimane ora a dire del loro movimento uniforme.

PRO-

P R O B L E M A VII.

* *Ritrovare le forze centrali o le gravità necessarie a Pianeti, perche descrivano qualunque Orbite con moto uniforme.*

S O L U Z.

SI è veduto quì sopra (*LEM. I. Coroll. 2.*), che per un tal movimento le forze centrali, ovvero le gravità di detti Pianeti debbano drizzarsi tutte secondo le perpendicolari alle orbite che descrivono, cioè secondo i raggi corrispondenti delle Sviluppate di queste istesse Orbite. Descrivendo un corpo *L* una qualunque curva *ALM* (*r*) con le forze centrali, che tutte tendano secondo i raggi corrispondenti *LC* (*r*) della sua Sviluppata *AC*, deve averle sempre $= \frac{1}{r}$, cioè da per tutto in ragion reciproca de' suoi raggi corrispondenti. Dunque, &c.

Per dimostrare questa nuova proposizione, immaginiamo su l'orbita *ALM* da descriversi il picciolo lato *QL = LI*, che prolungato formi la tangente *LH*, e dal centro *L* l'arco *LN*, di cui raggio sia il picciolo lato *LI*; In tal caso si avran li triangoli simili *LCI*, & *LN*; che farà *LC* (*r*). *LI* (*ds*) :: *LI*, (*ds*). *LN* = $\frac{ds^2}{r}$. Or li spazj scorsi da un corpo mosso da una forza costante, e continuamente applicata, qual si è la gravità, la quale ancora

• *Fig. 5.*

cora è tutta forza istantanea, essendo in ragion composta di detta forza, e de' quadrati de' tempi impiegati a scorrerli; Si avrà ancora $N \propto y dt^2$, poichè N è quello spazio, che il corpo L corre in virtù, e secondo la direzione della forza y nell'istante

dt , che scorre Ll . Dunque $y dt^2 = \frac{d^2}{r}$, ovvero

$$y = \frac{d^2}{r dt^2} \text{ (Lemm. 1. Coroll. 2.)} = \frac{1}{r} : \text{cioè, che le}$$

forze, o i pesi necessari al corpo mosso per cagion di esempio al Pianeta L , per descrivere qualunque orbita ALM con moto uniforme, devono essere in ragion reciproca de' raggi corrispondenti (LC) della Sviluppata di detta curva. *Locche &c.*

COROLL. Dunque qualunque sia la natura delle Orbite, che si fan descrivere a Pianeti con un moto uniforme, si rinverranno i raggi delle Sviluppate di dette Orbite col ritrovar sempre le forze centrali necessarie a detti Pianeti per descriverle: Quindi è, che non mi tratterò di vantaggio in determinar i raggi delle Sviluppate, essendone la maniera conosciutissima dataci dal Sig. *Bernoulli* Professore in *Basilea* negli Atti di *Leipsik* del 1694. Mese di Giugno, e dal Sig. *Marchese* dell'*Hopital* nell'*Analisi degl'Infiniti piccioli* sez. 5., e da molti altri. È sufficiente qui l'avvertire, che nel sistema degli Antichi, e di alcuni Moderni, quali fan muovere con moto uniforme i Pianeti su le Orbite circolari, i pesi, o le forze centrali di tali Pianeti debbano essere sempre uguali a ciascun di esse, e tendere sempre al centro del circolo, riducendosi a questo punto la sua Sviluppata.

Questa si è la maniera di ritrovare le forze centrali, o i pesi de' Pianeti in tutti i Sistemi, così
anti-

antichi, che moderni: E questo si è quel che si era proposto a dimostrare.

O S S E R V A Z I O N I.

Oltre alla regola di cui quì sopra ci s'iam serviti per determinare tutte le forze centrali, la di cui ipotesi di rdz costante dà parimente $y = \frac{dz^2 + rddx}{rdz^2}$,

ovvero (*Soluz. lemm. 2.*) $y = \frac{dz^2 - rddz}{rdz^2}$, per simiglian-

te Regola eccone alcune altre, che mi caddero in pensiero poco tempo dopo di averla ritrovata, e che non dispiacerà di vederla.

* Siano due corpi L, & F, le di cui masse s'iano m, μ ; le gravità p & π ; la lunghezza delle cadute verticali l , & λ ; la loro durata t , & θ ; s'iano ancora f , & ϕ le loro forze centrali verso C, & D, sostituite alle loro gravità in descrivendo le curve M/L, & N/F; PL & EF le lunghezze scorse in virtù di dette forze in ciascun istante; in fine dt , & $d\theta$, quest'istessi istanti: Ecco tutto per ordine.

Corpi mossi	L. F.
La loro Massa	m, μ
Le loro gravità	p, π
Lunghezza della lor caduta verticale	l, λ
Tempi delle cadute	t, θ
Le loro forze centrali verso C, & D } in descrivendo le curve M/L & N/F }	f, ϕ
Lunghezze scorse in virtù di dette forze in ciascun istante }	PL, EF
Quest'istessi istanti	$dt, d\theta$
	No

t Fig. 6, e 7.

Ne siegue, per quel che io ho dimostrato nelle Memorie dell' Accademia 1693 pag. 2. intorno alla caduta de' corpi, che prendendo con *Galileo* per costanti i pesi, si avrà sempre $ml\pi^2 = \mu\lambda p\pi^2$. E poichè le altezze, & i tempi son qui variabili, ne siegue, che sarà ciò vero ancora nelle altezze infinitamente picciole, come sono dl , $d\lambda$, e negl' istanti dt , $d\theta$, duranti i quali sarebbero scorse dette picciole altezze per virtù de' pesi p , & π , quali non fossero costanti, che in questo istante: Ne siegue dico, che si avrà parimente allora $m\pi dl d\theta^2 = \mu p d\lambda dt^2$.

Ma se si confideri, che le forze istantanee son sempre uniformi e costanti in ciascun istante, tutto che sian per altro esse variabili in tempi finiti; l'accrescimento, o scemamento infinitamente picciolo, che in ciascun istante se ne fa, essendo un nulla riguardo ad esse, si vedrà, che le lunghezze PL , & EF (parallele ad IC , & fD) dalle quali i corpi L , & F , che presentemente si suppongono descrivere le curve M/L , & N/F , sarebbero rimosse dalle Tangenti IP , & FE verso dette curve in virtù delle loro forze centrali f & ϕ (tendentino in C , & in D) fra gl'istanti dt , & $d\theta$, che questi corpi scorrono gli elementi lL , & fF di queste istesse curve: Si vedrà, dico, che le lunghezze PL , & EF faranno come scorse da detto corpo in virtù delle gravità costanti & uniformi, come sarebbe allora ciascuna di dette forze in ciascun istante. Prendendo dunque ora tali forze in luogo delle gravità di detti corpi, cioè f , & ϕ in luogo di p , & π ; & PL , EF , in vece di dl , $d\lambda$; si avrà parimente questa regola generale $PL \times m \phi dt^2 = EF \times \mu f d\theta^2$, ovvero $\frac{PL \times m}{\phi dt^2} = \frac{EF \times \mu}{f d\theta^2}$, donde si vedono gli usi, riguardo

all'

alle comparazioni, che si vorran fare delle forze centrali de' corpi mossi in qualunque linea curva, e delle loro masse, &c. Ecco dunque le altre che solamente ella mi ha date, facendo $\frac{EF \times p}{\bullet d\theta^2} = 1$, e secondo quel degli elementi /R descritto dal centro * C, LR, & LI, che si prenderà per costante nella curva M/L.

In fatti prendendo parimente $\frac{\bullet d\theta^2}{EF \times m} = 1$, la

regola precedente $\frac{f d\theta^2}{PL \times m} = \frac{\bullet d\theta^2}{EF \times m}$ darà parimente

$$\frac{f d\theta^2}{PL \times M} = 1, \text{ cioè } f = \frac{PL \times m}{ds^2}, \text{ ovvero } f = \frac{PL}{ds^2}, \text{ percioc-}$$

che m è costante (*ipotesi*). Ne siegue immediatamente ancora da ciò, che gli spazj (PL) scorsi, in virtù delle forze costanti, e continuamente applicate, come la forza f in ciascun istante, sian sempre come i prodotti ($f ds^2$) di dette forze per i quadrati de' tempi della loro applicazione: cioè PL, come

$$f ds^2, \text{ ovvero } PL = f ds^2, \text{ o ancora } f = \frac{PL}{ds^2}.$$

Ma secondo i nomi di sopra (*Soluz. Lemm. 2.*) dati a CL, ovvero Cl, di r ; /R, ds ; & LI, ds ; si troverà

$$1. \text{ Facendo } ds \text{ (/R) costante, } PL = \begin{cases} \frac{ds^2 - r ddr}{r} \\ \frac{dr ds - r dds}{1 dr} \end{cases}$$

2. Fa-

Fig. 6.

$$\begin{aligned}
 & \left\{ \frac{dz^2 + r dr dz}{r dz} \right. \\
 2. \text{ Facendo } dr \text{ (LR) costante, } PL = & \left\{ \frac{dz^2 ds^2 + r dr ds dz}{r dz^2} \right. \\
 & \left\{ \frac{dz^2 ds^2 - r ds^2 dr}{r dz^2} \right. \\
 3. \text{ Facendo } ds \text{ (Ll) costante, } PL = & \left\{ \frac{dz dr ds^2 + r ds^2 dz}{r dr dz} \right.
 \end{aligned}$$

Dunque in sostituendo tutti questi valori di PL successivamente in $f = \frac{PL}{dr^2}$ si avrà parimente

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Facendo } dz \text{ costante, } f = & \left\{ \frac{dr^2 - r dr}{r dr^2} \right. \\
 & \left\{ \frac{dr ds^2 - r ds dr ds}{r dr ds^2} \right. \\
 & \left\{ \frac{dz ds^2 + r dr dz}{r dz ds^2} \right. \\
 2. \text{ Facendo } dr \text{ costante, } f = & \left\{ \frac{dz^2 ds^2 - r dr ds dz}{r dz ds^2} \right. \\
 & \left\{ \frac{dz^2 ds^2 - r ds^2 dr}{r dz^2 ds^2} \right. \\
 3. \text{ Facendo } ds \text{ costante, } f = & \left\{ \frac{dz dr ds^2 + r ds^2 dz}{r dr dz ds^2} \right.
 \end{aligned}$$

Queste sei Regole in prendendo parimente dz , ovvero dr , o ds per costanti, daranno l'istesse forze centrali, che quelle le quali si diducono dalla

Re.

Regola di cui s'è fatt'uso quì sopra , prendendo parimente rdz per costante , & y per le forze , che quì dico f : Egli è facile a farne la pruova ; ond'è , che non ci tratterremo di vantaggio sù di ciò , e molto meno sù de' casi di LC, IC , ordinate parallele tra di esse , che anno queste stesse Regole itremate solamente ciascheduna del primo termine del Numeratore della sua frazione.

A V V I S O.

Io credo di aver avvertito , che nell'art. 15. della prima delle Memorie dell'Accademia Anno 1699 pag. 11, in citando il Sig. *Leibnitz* , e'l Sig. *Bernoulli* Professore in *Groningue*, come ugualmente ritrovatori dell'equazione che io dò dell'*Ilocrona* Paracentrica , s'ami uscito di mente di citare ancora il Sig. *Bernoulli* Professor in *Basilea*, il quale oltre alla costruzione data di detta curva negli Atti di Lipsia del 1694 mese di Settembre , ne avea parimente donata nel mese di Giugno di quest'istessi Atti l'ultima equazione dell'art. 16 di detta Memoria con una maniera di sciegliere le variabili , la quale riduce detta equazione alla precedente, come si vede nell'art. 17 dell'istessa Memoria.



M E M O R I A

SU' LE CAGIONI DELLA VOCE DELL'UOMO,

E suoi differenti tuoni.

DEL SIGNOR DODART.

I. **N**ON possono troppo a fondo disaminarsi gli usi delle parti, nè con precisione soffrire tal faccenda di esser trattata. Nè questa inchiesta & esattezza an per fine scoperte puramente curiose & assolutamente inutili, o devon riguardarsi come alcuno de' principali fondamenti della Teologia naturale; e pure la cognoscenza esatta degli usi spesso è necessariissima alla pratica Medica: perciocchè a cagion di esempio (a), come potranno applicare con prudenza i rimedj utili alle malattie della voce se non si sappian quelle parti, che .

(a) Come potranno applicare, &c.) Alcuni intendentissimi per altro *av creduto*, che tutto ciò, che in questa Memoria poteva io addur di nuovo sì lo stabilimento non tanto del Principale quanto del sol organo del suono e della voce, escluso ogn' altro organo, anche l'aspera arteria, riguardava a render curabile ogni malattia della voce, e che questo fusse la mia mira. Ma questo è molto lungi dalla mia idea, poicché le verità, quali io spero di quì stabilire intorno a questo articolo, possono rischiarare la pratica Medica, e non già assicurarne gli effetti: far risparmiare i rimedj superflui, e non dimostrarli efficaci.

che la formano, e precisamente qual'organo la produce?

II. *Galeno*, già più di 1500. Anni sono, disse che la *Glotta* ha l'organo principal della voce. E' questa una picciola apertura o fessura lunga da 4 ad 8 linee sù l'estremità del canale dell'Alpera Arteria nel fondo della gola. La figura di questa fessura nell'atto di produrre la voce sembra formata dall'intersecazione di due circoli uguali. (b) Ecco il principal organo della voce secondo *Galeno* (c), quale sembra il primo che abbia riconosciuto questa verità. Frattanto egli è certo, per tutto ciò che n'è rimasto dagli Antichi sù di tal ma-

(b) Intersecazione di due circoli nguali) *Quest' apertura è a un dapresso come un triangolo isoscele misto, con la base quasi rettilinea, e con due lati curvilinei, qualora semplicemente si respira, o parla basso, ovvero si soffi: Et allora il muscolo Aritenoide è rallentato, & i due lati divisi nel fondo della gola firmano la base di detto triangolo; ma quando si voglia produrre la voce, allora il doppio muscolo Aritenoide s'accorta, & i due lati del triangolo divisi si congiungono nel fondo della gola, e si fissano nell'orlo inferiore dell'Aritenoide, percioche sono essi sempre uniti per davanti, ove la punta dell'angolo interiore è fissata verso il fondo della Tiroide. Vedi la fig. sù la nota c.*

(c) Ecco il principal'organo della voce secondo *Galeno*) Vedi VII. Dell'uso delle parti cap. 12. & in altri luoghi, come VII. cap. 5, VIII. cap. 1, XIII. cap. 6, ov'egli dice che la *Laringe* sia dessa, senaa designare altrimenti la *Glotta*.

materia, che Galeno istesso (d) con tutti gli altri che l'an preceduto (e) crederono, che l'Aspe-
ra

(d) Che Galeno istesso) nel cap. 5 del lib. VII. Dell'uso delle parti.

(e) Che l'an preceduto) possono contarfi 24. Autori, la maggior parte più antichi di Galeno, & alcuni del suo tempo, ch' e' cita nel lib. VII. Della composizione de' medicamenti secondo la differenza delle parti. Tutti detti Medici dicono Arteriaci que' remedi, che si ordinano per la fiocagine, e diminuzione, o perdita della voce, siccome ancora per l'accrescimento di questa, e per renderla più forte a Banditori, a Comici, & Oratori, che spesso dovevano allora parlare al Popolo in pubblica Piazza, & a campo aperto. Or questi Medici tutti tenevano che la voce fusse effetto del suono dell'Aspera arteria, poicché i più antichi non conoscevano altra arteria: e perciò chiamavano questi remedi Arteriaci. Erano essi persuasi con Ippocrate, che una porzion del liquido, qual si tracanna, trapelasse nel canal dell'Aspera Arteria, provando ciò Ippocrate con una speranza, che'l Sig. Mety a mie preghiere riface, e verificò quella d'Ippocrate (vedi il libro d'Ippocrate del cuore.) Galeno adotta l'istessa speranza e dottrina, e dà i modi per far sì che porzione di quel che si beve entri nell'Aspera Arteria senza risvegliar la Tossè. (Vedi VIII. De Placit. Hippoc., & Plat. cap. 9. & altrove VI. de us. part. VII. de comp. med. part.) Questo può ben porsi in uso per le malattie del doccio dell'Aspera Arteria, ma sarebbe inutile per affodare, o accrescer la voce: Perciocché gli effetti di que' remedi, che allora si ordinavano sù la mira d'introdurli nell'Aspera Arteria, per curar la fiocagine, o accrescer la voce, con maggior ragione possono attribuirsi

ra Arteria contribuiffe al suon della voce per mezzo

buirfi o alle impressioni che facevano essi su 'l palato e nel fondo della bocca , ovvero agli esercizi che con datti remedi s'ingingnevano per l'accrescimento della voce, e non già all'introduzione nell'Aspera Arteria , come ora vedremo.

In un frammento d'Antyllus, che si ritrova tra le collezioni di Orihalio lib.vi. cap.8. può vederfi un racconto curioso & utile degli esercizi della voce presso gli Antichi , e del loro effetto in molte malattie . Non si farà male a leggere ancora il cap.9. e 10, ne' quali luoghi si ravviseranno i molti esercizi particolari , che faceansi non solamente per assodar la voce e dilatare i bronchi , ma per riparare ancora a molte malattie del polmone , & a molte altre che non vi aveano se non se una corrispondenza lontanissima , come sono le debolezze & acidezze dello stomaco , le indigestioni , i disordinati appetiti delle femine incinte, &c. (Vedi Galeno de tuend. valet. xi. cap. 11. Aezio lib. III. cap. 5. Paulo Egineta lib. I. cap.19.)

Con questa occasione devo dire , che molto ben si farebbe a leggere un pò più gli antichi di quel che non si fa , e particolarmente su 'l regolamento , e su gli esercizi ; essendo certo, che in questa parte ci eran molto superiori , siccome in molte altre arti non meno importanti ; abbenche inferiori a noi in molte conoscenze : Nè farebbe a noi difficile di trar profitto da ciò che essi an di buono , adattandolo al nostro costume molto differente da quel che allora essi tenevano ; Così dopo di avere studiate le loro storie , si giudicherà se tal differenza sia vantaggiosa per essi o per noi . Vedi Mercuriale lib.III. Gymnastic. cap.7. & Vl. cap.5.

zo del suo canale, (f) paragonandolo al corpo di un Flauto: & egli è certo, che tutti i Greci dopo *Galeno* an supposto tale l'uso dell'Aspera Arteria in tutta la pratica Medica per le malattie della voce. (g) Tutti i Moderni, che sono in mia conoscenza, (h) senza eccettuarne i Notomisti, *Vesalio* istesso che ha cercato sempre di contradir *Galeno* in molte altre cose, e gli Autori Notomici dopo *Vesalio*, da quel secolo fino a questi nostri ultimi tempi, anno con gli Antichi creduto che l'Aspera Arteria per mezzo del suo canale avesse qualche parte almeno nel suon della voce. *Fabrizio Acquapendente* solo, che scrisse su'l fin del XVI secolo, (i) sù di ciò non si è molto spiegato, come l'Uom che parli su'l dubbio d'ingannarsi. Niun'altro però che dopo *Vesalio* ha scritto lino a *Fabrizio*, o dopo questo lino a tempi nostri, l'ha in questa parte di con-

(f) Contribuisse al suon della voce) *Vedi Galemo VII. de us. part. cap. 3, 4, 6, & altrove.*

(g) Per le malattie della voce) *Vedi Galen. VII. de compos. Medic., secondo la differenza delle parti cap. 1 2. Vedi ancora Oribasio nelle sue Collezioni lib. VI. cap. 8. Paolo Egineta lib. III. cap. 28. nel principio, e nel 3. art. Aezio lib. VIII. cap. 51.*

(h) Tutti i Moderni) *Vedi Vesalio della fabbrica del corpo umano lib. I. cap. 38. VI. cap. 4.*

(i) Sù la fine del XVI. Secolo) *cioè nell' Anno 1600, come dalla sua lettera Dedicatoria a Lionardo Donati e dal suo libro può conoscersi, nel quale sebbene vi sian dagli errori, come i migliori Autori non ne van di senza, merita però molto di esser letto, essendo pochi gli Autori così attenti, come egli è, e che sieguono così bene il loro argomento.*

continenza imitato, per quel ch' i sappia. (k)

III. Questa contradizione nascosta della Teoria Fisica in se stessa, e la manifesta contradizione tra ciò che v' ha di vero in detta Teoria e la

(k) Gli Autori che anno scritto dopo *Vesalio* sino a *Fabrizio*) reccherò qui alcuni de' più celebri *Prattici*, e *Notomisti Moderni*. *Prattici*. *Fernelio lib.I.cap.8.* *Ollerio su l'Aforismo 40.della Sezione II.* *Bartolomeo Perdulcis lib.XIII. cap.15. del suo corso di Medicina: Sennerto lib.II.parte II. cap.1.* *Boneto delle malattie lib.II. Sezione XVIII. cap.15.* *L'istesso Autore nella sua Polialtea lib.II.cap.32.* *De Catharro sù la Medicina di Jonston not.34.* *Ettmullero nella sua pratica cap.13.sotto'l titolo delle Malattie della voce, e sotto un'altro titolo della Fiocagine.* *Notomisti*. *Fuchsius II. part. dell' Epitome della struttura del Corpo Umano lib.V. cap.3. 1551.* *Di Lorenzo lib.III cap.19. 1599.* *Casserijs della Laringe lib.II. dell'Azione della Laringe cap.13.p.148. cap.26. pag.175.177. lib.III. degli usi della Laringe cap.1.pag.180.dell'edizione di Ferrara 1601.* Potrebbe aggiugnersi, se si volesse, il suo Maestro *Fabrizio d'Acquapendente almeno nella seconda parte cap.6. pag.151.dell'edizione in fogl.dell'Anno 1613, se dalle citazioni di Galeno, che in questo luogo affastella, non si vedesse che e' piuttosto per rispetto ad un nome così grande, che in que' tempi facea molta autorità, che di suo proprio sentimento consenta al parer di detto Autore.* *Galparo Bauhin Istituzioni Notomiche del petto pag. 135. 136. della IV. Edizione di Basilea in 8. 1609.* *Riolano il Figlio Anthropographia lib.IV.cap.11.p.291. dell'Edizione del 1650.* *Manuale Anatomicum lib. IV. cap. 14.* *Bartholini lib.II cap.10.* *De Fistula pulmon.* *Bourdon de Ven.*

• la pratica medica, mi anno impegnato a sviluppare la prima contradizione, e difaminare a fondo la seconda: Nello che fare mi sono imbattuto in molte cose, che rimiro come altrettante verità (1) finora forse sconosciute, o per lo meno non così chiare come erano a desiderarsi

per
tre medio c. 5. 1676. Diemerbroek *Notomia lib II. cap. 14. pag. 227.* Edizione di Lione del 1683. *Notomia dell' Uomo del Signor D onis. V. Dimostrazione pag. 332, 349, 350.* Verduc dell'uso delle parti to. II. cap. 12. 1696.

(1) Sinora forse sconosciute) *Un Celebre Professore di Notomia mi ha dato l'avviso, che'l Sig. Perrault Accademico aveva insegnato ne' suoi Saggi che la Glotta era l'unico organo della voce, e che l' can. le dell'Aspera Arteria non vi avesse parte alcuna, e che'l Sig. Bernier aveva insegnate le stesse verità, e molti altri Autori ancora. Se'l Sig. Perrault ne ha parlato, lo avrà fatto nel Trattato del Fragore tom. II. de' suoi Saggi part. II c. 12. dalla pag. 142 fino a 146. Se questo Celebre Professore veramente ha ritrovato, che la Glotta sia l'unico Istromento della voce, e che l'Aspera Arteria non vi abbia parte formale, altri l'avran potuto trovar com'esso: Et in tal caso consento, che'l già detto da me in pubblico, e quel che reco in questo rapporto sù di tal soggetto, sia riguardato come un semplice Commentario di detto luogo de' Saggi. Sarebbe questa la minor giustizia, che io rendessi ad un'Autore di un così chiaro merito, di cui mi reco a somma gloria di essere stato per due Anni intieri Discepolo; & a cui devo, come ancora al suo Illustre Fratello, l'onore di essere socio di un'Accademia, di cui vorrei averne il merito per esserlo. Riguardo al Sig. Bernier io non ho ritrovata cosa*

per rischiarare la Prattica Medica , e per una più vera Teorica Fisica.

Ecco la somma di dette verità.

1. Se egli è vero , come è verissimo, che la *Glotta* sia il principal'organo formale della voce , ella sarà l'unico ; e'l canale dell'*Aspera Arteria* non può avervi alcuna parte formale.

2. Se l'*Aspera Arteria* non ha , riguardo alla *Glotta* , l'uso che 'l corpo di un Flauto ha rispetto alla sua linguetta ; la Bocca dovrà avere , riguardo alla *Glotta* , l'uso del corpo di un'altro Istrumento da fiato di una specie sconosciuta alla Musica.

3. Nè

*cosa nel suo Compendio Vranzese della Filosofia Epicurea del fu Signor Cassendi , se ciò non sia nel Tom. VII. di detto Compendio pag. 625. della prima Edizione in 12. Eccone le parole : I Muscoli della Laringe servono in tanto alla voce per le cartilagini aprono essi , e stringono la linguetta per produrre la voce acuta , o grave , come altrove ho detto . Io non so dove questo altrove ne invii ; ma se e' non dice altro di questo che in accorcio riferisce , non par che contenga cosa di più di quel che Galeno ne ha detto , il quale stabilisce la Glotta , o Linguetta , principal' Istrumento della voce . Or se si possa dire che sia ella il solo Istrumento della voce , o il contrario , io non veggio esclusione alcuna dell'*Aspera Arteria* , come quella che vi ha qualche parte per mezzo de' suoi anelli cartilaginei : Che però il Sig. Bernier non ha altro vantaggio su di Galeno , che nel non essersi dichiarato a favore dell'*Aspera Arteria* , come lo anno Fabrizio d'Acquapendente , Spiegelio , Verheyen , e forse alcun' altro a me sconosciuto.*

3. Nè la bocca nè le narici anno a'cuna parte nella produzion della voce, ma contribuiscono molto al suon di essa, cioè alla sua forza, & alla dolcezza.

4. La bocca niente opera per la produzion del tuono; ma egli è chiaro, che l'agevola in acconciandosi a proporzione.

5. Le proporzioni della cavità della bocca co' tuoni son probabilissimamente proporzioni armoniche: non già quelle armoniche proporzioni prossime corrispondenti a ciascun de' tuoni della voce, ma lontane.

6. L'uso della bocca in ciò non ha veruna corrispondenza con l'uso del corpo del Flauto, nè con quello dell'Oboè, nè della canna d'Organo con l'Anima.

7. Non ha parimente il detto uso della bocca rapporto alcuno con l'uso della maggior parte de' docci che rendono i suoni della linguetta d'organo, fuorchè con que' docci che son destinati ad un certo suono; e ciò solamente a riguardo del corpo del doccio, non già a riguardo della linguetta.

8. La sola *Glotta* fa la voce, e tutti i suoi tuoni.

9. La *Glotta* non è come la linguetta, o anima, che dicono.

10. Non può ben'ispiegarfi il di lei uso per quello della linguetta dell'Oboè, e molto meno per quelle dell'Organo.

11. Nè per alcun'istrumento da fiato, che si usi nella Musica.

12. Tutto l'effetto della *Glotta* per i tur ni dipende dalla tensione delle sue labbra, e dalle differenti sue aperture; locche manifestamente comprende la maggior maraviglia, che sia ne' movimenti voluntarij, & in conseguenza una delle più forti

forti pruove, che possa la Fifica porgere al a Teologia naturale, per rendere tenabile e qu u palpabile il sapere infinito e la potenza del Creatore.

IV. In accorcio ho detto quel che ho in pensiero di esporre al giudizio dell'Assemblea. Se gli Antichi (m) e quali che tutti i Moderni si sono ingannati in alcuna di quelle cose, nè si sono avveduti delle altre, non è fermamente ciò addivenuto per difetto di genio o di applicazione, ma per un certo abbagliamento, a cui soglion soggiacere i più grandi Uomini: In fatti uno spirito mediocre con picciola attenzione può a primo occhio veder la verità e le pruove di tutto ciò che si è detto-

(m) Se gli Antichi, &c.) Si vede perfettamente dalla lettura del libro di Galeno della Distensione degli Istrumenti della voce cap. 2., poichè sebbene questo luogo non escluda distintamente l'Aspera Arteria da tutta quella parte, che ha nel suon della voce, egli è impossibile di dirizzare il raziocinio, come questo gran Autore ha fatto in detto luogo, per far comprendere, senza dirlo, che la sola Glotta faccia la voce. Ma questo passo è contro di molti altri, e nel cap. 6. ritornando a dire, che il capo dell'Aspera Arteria per la superficie interiore delle sue cartilagini sia cagion dell'a voce, riconfonde le cose che voleva egli metter in chiaro, e sì le lascia sin'oggi. Forse che più distintamente ne avrà parlato ne' libri della Generazion della voce, ch'è cita lib. VII. de usu part. cap. 5. Ma que' si son perduti, e questo appena si ritrova impresso in latino, ch'è il libro qual si legge meno di tutte le opere di Galeno, sebbene è meriti di essere ben letto.

detto, riducendo dette cose a' principj di Musica e di Fisica i più volgari.

Eccoli.

1. La voce è un suono.
2. Il suono è un'aere violentemente percosso.
3. La materia della voce è l'aere contenuto ne' polmoni da giù spinto in alto, e da dentro fuori.
4. Il rimbombo di qualunque suono, & in conseguenza della voce ancora, suppone la voce già formata, e siegue il suono.
5. I corpi risonanti visibili son que', che spinti dall'aere recator del suono, son capaci di riflessione e di molla, & in conseguenza di vibramento.
6. I corpi sonori e risonanti visibili, suonano e risuonano secondo la loro dimensione in lunghezza.
7. Da questa dimensione nasce il tuono.
8. I corpi risuonanti risuonano particolarmente secondo l'uguaglianza, o le proporzioni armoniche della loro dimensione, cioè del loro tuono, col suono a cui corrispondono; & essi più o meno lo fanno secondo i gradi di questa proporzione, dall'unifono, e proporzioni armoniche le più vicine, sino alle più lontane.

Si avvisa ciò vero in tutti gli strumenti di Musica, ma più sensibilmente in quelli da fiato che negli altri.

Sono questi i principj di tutto ciò che son per dire intorno alla voce, e tuoni di essa. Le rimanenti verità esposte in questo discorso potran rinvenirsi con l'andare a seconda (per così dire) delle conseguenze, che immediatamente e propriissimamente nascono da tali principj: e per risparmiare la fatica agli Uditori, le spiego.

1. Ho detto, che l'Aspera Arteria non abbia
parte

parte nel suon della voce , & al risuonamento ; e credeva , che bastasse il dirlo e che non bisognasse altro che una leggier occhiata per conoscere detta verità ne' principj . Avendo però comunicato questo discorso a Persone istruite , le loro obiezioni mi an fatto conoscere che non sarà inutile il provar detta proposizione , la di cui verità è importantissima per la pratica Medica nelle malattie della voce : Ond'è , che io la dimostro almeno sommarariamente .

Non si parla , nè si canta , che in rendendo l'aere . Il canale dell'Aspera Arteria non può produrre alcun suono di voce , che per mezzo dell'aere , qual da basso in alto rendendo il fiato vi scorre , E' converrebbe per tal'effetto , che l'aere , quai vi passa mentre si parla o canta , vi passasse non solamente con velocità , ma con violenza : Ma non v'è così la bisogna : Qualora in cantando siam costretti di riprender fiato , si respira con una estrema velocità , e pur tuttavia senza suono , perciocchè la *Glotta* è rallentata ; ma nell'attual canto si rende lentamente l'aere , e con un'estremo regolamento . Inoltre l'aere , in uscendo da polmoni , non incontra cosa che li sia di ostacolo e dal fondo di essi fino a sotto l'Aspera Arteria li faccia violenza , passando egli insensibilmente da bronchi più stretti a più larghi ; e molto men n'incontra dal basso del canal largo dell'Aspera Arteria fino alla *Glotta* esclusivamente : Sin quì non vi è violenza , dunque non vi è suono .

2. Ma questo aere regolato e lentamente spinto fino a questo luogo , giunto alla *Glotta* ristretta con sue labbra più o meno distese per produrre la voce o i suo' tuoni , e passandovi con una velocità più o meno grande sempre però rapida

da, (n) cagiona, e soffre violenza in tale stretto, e di per se, e per l'angustia del luogo, in molte guise, che sarebbe molto lungo lo spiegarlo.

Ecco

(n) L'aere cagiona, e soffre violenza, &c.) *Risultano tutte queste maniere da quel che siegue. La doppia membrana, che socchiusa costituisce la Glotta, è nella parte inferiore, qual riguarda il canal dell' Aspera Arteria fatta a volta di terzo punto, la di cui chiave è un'angolo acuto curvilineo riguardato per la parte concava; donde siegue, che essendo l'aere un liquido, il canal dell' Aspera Arteria debba esser considerato come un doccia di fontana; la Laringe come un Sifone; la sua apertura, cioè la Glotta, come il Zampillo del Sifone; la forza, con la quale l'aere è spinto, come il peso della conserva; l'aere urtato da detta forza per traverso della Glotta, come un getto d'acqua. Or ciascun sà, che questa lanciata per traverso d'un Sifone a piombo terminato da una lamina piana ben livellata e forata da un Zambillo a perpendicolo ben ritondo e limato, forma il getto dell'acqua a foggia di bacchetta rotonda e netta, mantenendo sua rotondità in un'altezza altrettanto più grande, quanto sarà maggiore il peso; siccome per lo contrario il Sifon conico in dentro, il di cui diametro va scemando sino all'estremo, forma getti che si dispergono in goccioline più dapresso al Zampillo; e tanto più da vicino si dispergeranno, quanto il peso sarà minore. Egli è probabile, che la ragione di questa differenza tra queste due spezie di Sifoni, sia, che le parti dell'acqua, quali son presso ad uscire dal Sifon conico, l'une verso l'asse del getto vi si presentano per scappar fuori da basso in alto, le altre costrette da' lati inchinati del Sifone faccia-*

Ecco appunto il luogo preciso del suono, il quale è tutto intiero della *Glotta*, e non già del canale dell'Aspera Arteria, e molto men della *Laringe*.

Ma forse che questo canale avrà alcuna parte nel risuonamento? Sarebbe ciò facile, se si cantasse, respirando l'aere; ma si canta cacciando l'aere fuori. Or l'aere spinto lentamente passa, scorre con velocità per la *Glotta* nella bocca, col suono, di cui è portatore; e la bocca è quella che risuona e risponde a detto suono, il quale non può ripercuoterli nel canale dell'Aspera Arteria per traverso, e contro alla corrente dell'aere, che con velocità scorre da questo canale nella bocca per la *Glotta*.

Non

no i loro sforzi da dritta a manca, e da manca a dritta, continuando così in tutta la circonferenza del getto; di modo che le parti dell'acqua, che sono in essa, guizzino con una sciambievole tendenza l'una a traverso dell'altra, spicciando le une contro le altre. Facilmente può ciò adattarsi ad un Sifone, il di dentro di cui fosse formato a volta di terzo punto, e l'uscita composta di due segmenti di circolo adattati l'un'all'altro; perciocchè il contrasto delle parti della circonferenza del getto le une contro le altre, e contro l'asse di esso, deve essere altrettanto più grande quanto dette parti sono più inchinate le une contro le altre, di quelle del getto d'acqua formato da un Sifon conico. Sarebbe facile di veder l'effetto di un Sifone di questa interior figura in una conserva di mediocre altezza; Ma non è egli difficile il prevedere, che si dispergerebbe dal primo uscir fuori da dritta a manca, e da manca a dritta, tanto più se detto getto sia sottilissimo, e'l peso mediocre

Or

Non vò io dire, che tal canale non fusse propriissimo al risuonamento; ma e' converrebbe, perche sì fusse, o che la *Glotta* stasse al fondo dell' *Aspera Arteria*, come la è in molte spezie di Uccelli d' acqua, che perciò anno una grandissima voce; o che nell' Uomo, la di cui *Glotta* è nella sommità dell' *Aspera Arteria*, la voce, qual si forma dallo scorrimento dell'aere da basso in alto e dal di dentro in fuori, si facesse per un moto tutto opposto, e che allora la *Glotta* fusse bene stirata per gettare il suono. E questo è quello, che avviene manifestamente nelle Tossi convulsive, volgarmente dette *Quintes*; nelle quali dopo di aver tossito, fino a per-

Or quel che avviene all'acqua con maggior ragione deve avvenire all'aere spinto da basso in alto per traverso del Sifon dell' *Aspera Arteria*; perciocchè le parti dell'aere an minore unione tra di loro di quelle dell'acqua, e la compression dell'aere, che riceve dal petto, non può esser paragonata che a un mediorissimo peso d'acqua: Sicchè non può presumersi in questa figura di getto fra le altre lanciato da una forza così mediocre, che le parti intorno all'asse penetrino ben lungi nel loro corso le parti laterali del getto. Ecco il suono, che nasce dal contrasto e rompimento dell'aere. Or egli è facile di comprendere, che la sola uscita dell'aere tra due labbra stirate capaci di molla debba cagionare vibrazioni più o meno strette a proporzione che si ritroveranno esse più o meno stirate; ma ciò si attiene a' tuoni, di cui si farà parola appresso; lasciando il rimanente di questa Teoria all'intelligenza del Lettore, cui basterà questo poco, per non ristuccare con lungo discorso, senza isfruir di vantaggio l'Uditore in una pubblica *Assemblea*.

perder fiato, l'aere violentemente di fuori li tragge dentro, e da alto a basso per lo petto, attraverso della *Glotta* ristretta e convulsa, e produce in passando per detta fessura un suono più acuto di quel della *Tosse*, e talvolta la quinta di questa, donde forse ha preso il nome. Questo suono formato dal rapido corso de' l'aere succiato violentemente da alto a basso, entrato nel canal dell'*Aspera Arteria*, risuona così vivamente in essa, che spesso fa intendersi dalle case vicine, e da un capo della strada all'altro.

Ma questo suono non è la voce di cui si tratta; e questo stesso fa conoscere per la ragion de' contrarij, che'l canal dell'*Aspera Arteria* sia nell'Uomo in riguardo alla voce, quel che nell'*Organo* il mantiene; e che l'uso del corpo dell'*Istrumento* da fiato non possa essere imitato in altra guisa, che per la doppia concavità composta da quella della bocca, e da quella delle narici; ond'è, che *Fabrizio* chiama questa doppia concavità *Canale esteriore*, per distinguerla dal *Canale interiore*, cioè dall'*Aspera Arteria*. Io credo di aver pruovato, che questo canale interiore non abbia parte alcuna formale nella voce: Locche in questo discorso è il solo vero, che in qualche maniera importa alla pratica Medica per le malattie della voce; poicche il rimanente spetta alla *Fisica*, & alle arti che servono alla *Musica* pratica.

3. Quantunque differente appaja questo canale esteriore da quello di ogn'altro *Istrumento* da fiato per l'ineguaglianza delle parti, di cui è composto, e che sono nella maggior parte molliccie, e sembrano poco capaci di risuonamento: egli è chiaro e fermo, che produca egli un gran effetto almeno per mezzo del palato e delle narici, ma sopra più per

pe le narici . Si conosce ciò dall'alterazione che sperimentati nel suon della voce ne' catatri di testa , e quando per alcun accidente avviene , o per una affettata negligenza facciasi , che l' aere non passi libero per lo naso , o che affatto non vi scorra . Considerato ciò bene , si divisa che la cavità delle narici conferisca molto più di quella della bocca alla dolcezza della voce , e come egli sia falso il volgar detto , *parlare , o cantar per lo naso* ; perciocche qualora il naso è turato , il suon della voce è dispiacevole , perche allora si canta e parla per la sola bocca , e 'l suon , che viene fuori , non è mischiato con quello che an per costume di contribuirci le narici , come ogn' uno può vedere in cantando con la bocca chiusa ; perciocche allora si canta veramente , & unicamente per lo naso , e frattanto il suon della voce non è sì spiacevole , come quando si canta con la sola bocca , tenendo chiuso il naso , affine non abbia questi parte nel suon della voce , la quale allora simiglia a quella delle Anetre : lo che è propriamente parlare , o cantare per lo naso .

E questo dà luogo a sospettare , che tutte le differenti consistenze delle parti della bocca , di quelle ancora che sono le più delicate e le più deboli , contribuiscano al risuonamento ciascheduna a suo modo , e svariaticissimamente ; in maniera che può dirsi , che da questa specie di accoglimento di molti e differenti risuonamenti risulti tutta la dolcezza della voce dell' Uomo , da non essere imitata da qualsivia Istrumento di Musica . Gli Organisti par che vogliano imitare questa industria , perciocche in ciascheduno registro , che non mai sona solo tra li 24 o 25 del gran Organo , in quelli ancora de' più piacevoli,

vall accompagnano essi alcuni altri , la di cui piacevolezza & armonia si accresce con la mescolanza di uno , o più altri suoni.

Con ragion dunque si considera la bocca come corpo di un Istrumento da fiato , almeno per lo risuonamento.

4. Egli è molto probabile , che questo risuonamento non consista in una semplice riflessione, come quello che si osserva nelle Volte, ma in un risuonamento proporzionato a' tuoni spinti nella bocca dopo di essere stati formati dalle differenti aperture della *Glotta* : Poichè la cavità della bocca e delle narici si dilunga e si accorta , come ne' tuoni del basso e 'n quelli dell' alto vediamo farli : ho creduto ben prima di esser io Inventore di questa osservazione , che non aveva incontrata nè presso gli Antichi nè in alcun Autore di questo Secolo ; ma in riandando l'ho ben avvisata in *Fabrizio Aquapendente* (o) che l'in-

fe-

(o) (Avvisata in *Fabritio*) Nella 3. part. del suo lib. della *Laringe* organo della voce cap. 2. pag. 132 ediz. di Teodor. de Bry in. fol. 1607. verso il fin della pag. dic' egli , che niuno fino a lui avea conosciuto detto uso ; e con ragione . Non prevedeva egli però , che per un intiero secolo non se ne sarebbe parlato , nè reso lui quell' onor che si merita . *Casserio* di lui *Sc. lare di passaggio* disse qualche cosa , che fa credere di esserle ciò conto , senza però fermarvisi a citare *Fabrizio* di lui *Maestro* ; tanto egli è vero , che in queste inchieste gl' Inventori non han che sperare di sè , trattane la conoscenza e la comunicazione della verità . Il luogo di *Casserio* è nel lib. II. De *Laryng.* cap. 13. pag. 156, ediz. di Ferrara 1601. in fol.

segnò sù 'l fine del XVI. secolo, senza che mai Uomo, per quel ch' i' sappia, avesse di poi fatta menzione alcuna nè uso di tale scoperta.

Questo Autore intanto s'è ingannato in alcune circostanze dell'uso ch' egli ha dato a questo canale esteriore. Perciocche non si allunga & accorta esso per formare i tuoni, e molto meno ancora per gli accordj della quinta, dell'ottava, e dell'ottava doppia, a foggia della Trombetta, come *Fabrizio* l'ha creduto; ma solamente per rendersi più acconciamente proporzionato a tuoni alti egli li accorta, e per li tuoni bassi li slunga. Ne risulta la pruova da principj stabiliti per lo suono, per lo risuonamento, per le vibrazioni, e tuoni. Si conferma detta pruova con l'esperienza, che 'l canale si accorta e slunga di più in più in ogni cambiamento di tuono, qualunque e' sia, picciolo o grande, ancorche leggiero; perciocche di più in più si dilunga in abbassando la voce da mezzo tuono a mezzo tuono, di quarto in quarto di tuono, fino al tuono più basso; si raccorcia di più in più in alzandola insensibilmente fino al tuono più alto; e giammai non si bassa o s'alza il tuono, per picciola parte che sia, senza essere accompagnato da questi cambiamenti secondo il bisogno; in quella maniera che ne' minori cambiamenti di tuono debbon supponersi come sensibilmente si vede in tutti i trilli, i quali son tutti composti di alti e di bassi per l'intervallo di un tuono o di un semituono maggiore o minore, che al più più non differiscono se non se in un 9°. di tuono. Vedesi parimente il nodo della Laringe alternatamente alzare e bassare, e sensibilmente in tutti trilli, alzandosi per mezzo tuono alto, e per mezzo tuono basso abbassandosi. Or la Laringe

ge alzandosi accorta il Canale esteriore , & abbassandosi lo rende più lungo .

Ecco come farsi questo cambiamento di dimensione. L'Aspera Arteria si raccorcia , e raccorciandosi si slarga essa stessa , perche così dia fuori maggior quantità d'aere che bisogna per tutti i tuoni gravi ; allo 'ncontro l'Aspera Arteria si dilunga e tira , & in conseguenza si restringe per lo salimento della Laringe nel fondo della gola di più in più , a misura che i tuoni van salendo e'n conseguenza implegano minor aere. Questo accortamento & allungamento si veggono ad occhi farsi dal nodo della gola .

Questo accortamento dell'Aspera Arteria per lo tuono basso , & allungamento per l'alto , è una pruova dimostrativa, che non solamente il canal dell'Aspera Arteria non conferisca in cosa alcuna a' tuoni della voce , ma nè pur di per se corrisponda a tali tuoni ; perciocche si dilunga egli quando dovrebbe accortarsi , e si raccorcia quando dovrebbe allungarsi , se formasse tali tuoni o se a questi corrispondesse : Et io devo ancora aggiungere , che ciò nell' istesso tempo pruova , che il canal dell'Aspera Arteria faccia molto più del Mantice artificiale ; perciocche egli si accorta per allungare , e si dilunga per accortare la profondità del canal della bocca a proporzione di tutti i differenti tuoni , mezzi tuoni , e loro suddivisioni . Suppone questo un prodigioso artificio nell' esecuzione delle sei parti della Musica vocale : Perciocche a non far altro , che contare i soli tuoni o semituoni che si eseguono per queste sei parti , si vede , che 'l solo canale esteriore rappresenti , almeno nelle sei parti della Musica , i cinquanta docci che corrispondono

308 *Memorie dell' Accademia Reale*
 alle cinquanta taste, che riempiono le quattro otta-
 ve dell' Organo, contenendovi altrettanti tuoni e
 semituoni, a quali deve egli rispondero secondo il
 particolar grado di ciascheduno di detti tuoni o
 semituoni, senza contare le suddivisioni volgari del
 tuono e del semituono, che fanno ascendere que-
 sto numero in una somma molto più grande, cioè
 a 216 almeno; perciocchè ogni ottava è un in-
 tervallo equivalente per lo meno a sei tuoni, dun-
 que tutte le taste equivagliano a 24 tuoni. Ciascun
 tuono è diviso comunemente in nove *Comme*, alcu-
 ni glie ne danno 11, altri molto più, come vedraf-
 si; or 9 volte 24 fan 216. Il Mantice di cui si trat-
 ta, cioè l'Aspera Arteria, produce tutti questi dif-
 ferenti accorciamenti in allungandosi, e tutti detti
 varj allungamenti in raccorciandosi, in una pro-
 porzion regolata e sì delicata nella distesa di cia-
 scuna delle sei parti della Musica, che le diferen-
 ze di questi cambiamenti dell'Aspera Arteria nella
 distesa delle quattro ottave, che comprendono l'
 estensione di queste parti della Musica, al più più
 giungono alla nona parte di una linea; & ecco-
 ne la pruova. Una intiera ottava non porta al
 più che mezzo dito di differenza d' ascensione
 o discendimento del nodo della gola da un termine
 all'altro, il quale è di circa due dita per quattro ot-
 tave: Or due dita son 24 linee, tra gl' interstizj
 delle quali bisogna ritrovar per lo meno 216 divi-
 sioni; locchè fa un 9^o. di linea per intervallo tra
 una differenza all'altra. Quì appresso vedremo
 come dovrebbe accrescerli questo numero di sud-
 divisioni non solamente possibili, ma attuali, che
 tutto giorno si mettono in pratica, in cantando,

sea-

senza che vi si faccia riflessione alcuna: E quello è per quel che si attiene al *Mantice o Doccio interiore*. Bisogna ora vedere con qual proporzione il canale esteriore, cioè la bocca, corrisponda a tutte queste differenze.

5. Ne' Flauti, nell' Oboè, e nell' Organo, a cui tutti i suoni di detti due istrumenti da fiato si riportano, tutti i tuoni nascono dalla lunghezza, la quale misurata secondo la proporzion armonica, ciascheduna invariabilmente è addetta al suo tuono: Quindi è, che gli Organisti con tal dimensione disegnano il tuono. Il C sol ut di basso del Cembalo (p) è all'unifono d'un doccio di otto piedi nell' Organo. Il C sol ut da presso, in montando, consona con quel di quattro piedi, secondo la proporzion dell' ottava di uno a due, e così in tutte le quattro ottave delle taste, due piedi, un piede, mezzo piede, & a proporzione di tutte le altre consonanze. La quinta nella proporzione di due a tre. La quarta di tre a quattro, e così delle altre.

Questa precisa misura del doccio non può supplirsi in tutti i suoni, che son del genere de' Flauti, neppure ne' quattro de' sei suoni di linguetta che an tutto 'l rapporto all' Oboè, come ne' suoni d'Organo, chiamati la Trombetta, *Clarin*.

rom. 18

(p) (C sol ut di basso del Cembalo) E questi il tuono più basso delle quattro ottave che formano tutta la lunghezza delle taste, toltone G sol re alla quarta di sotto di detto C sol ut. Questo G sol re è nella maggior parte de' gran Cembali la prima tasta a contare da sinistra a destra: loche io aggiungo per coloro che vorran sentire il suono di C sol ut basso, e non sian pratici delle taste.

ron, ovvero tromba più acuta, e *Cromorno* o *registro* a Tromba. Non deeſi quindi dunque ricercar la cagione de' tuoni della voce dell'Uomo: Non dal Flauto; perciocche la lunghezza per li tuoni non può ſupplirſi irai: nè da' ſuoni delle linguette pocan- zi nominate; poicche biſogna, che abbiano eſſe queſta miſura precisa, non per lo tuono, ma per dar fuori il ſuono, che le diſtingua tra di eſſe e dal Flauto, nel tuono che ſuonano. Or egli è impoſſibile di ritrovar nell'Uomo ſimiglianti miſure.

La pruova è facile. Il canale eſterior dell'Uomo, cioè la Cavità della bocca miſurata da labbri fino al fondo della gola, non può avere più di quattro dita e mezzo o cinque al più più di lunghezza, qualora i labbri ſonò più ſporti in fuori, come ſi oſſerva in alcune voci di baſſo, che vogliano dar fuori il tuono più grave. La Laringe nel maggior ſuo abbaffamento, che non ſi ſcOMPAGNA mai dal ſuono più baſſo, non può aggiungerſi più di un altro dito di avvallamento: Facciamla dunque di ſei dita. Or le voci di baſſo più profonde poſſono giugnere ſino all'unifono di un doctio di otto piedi di lunghezza, ſedici volte più di quella del lor canale eſteriore. Non può dunque metterſi in agguaglio quella dell'Uomo con i corpi di altri Iſtrumenti non giugnendovi la lunghezza.

Riman dunque a vedere, ſe noi troveremo queſto paragone ne' ſuoni degli Organetti (q), o in quelli detti *Voce Umana* ne' grandi Organi.

Que-

(q.) Organetti): Li chiamo così per diſtinguerli da un altro Iſtrumento, che i Maeftri chiamano Reale, ovvero Spinetta, che io qui chiamo Reale di Percuſſione per diſtinguerlo da queſto qui, qual ſi ſuona per mezzo dell'aere. Queſto Iſtrumento è com-

5 V

poſto

Questi suoni sono all'unisono de' più gran suoni della linguetta d'Organo, di cui il C sol ut di basso è otto piedi lungo. Frattanto il più lungo doccio dell'Organello all'unisono di detto C sol ut non sorpassa le quattro dita; e 'l più lungo nella voce umana dell'Organo ne ha sei. Può dunque dirsi, che 'l canale esteriore della voce dell' Uomo abbia alcuna proporzione con questi suoni, e che sia in una mezzana misura tra l'uno e l'altro. Ma come può egli farsi, che questo suono nell' Organo sia unisono a' gran suoni della linguetta? forse perchè in questi suoni fa la linguetta ogni tuono, e 'l doccio altro non vi agglunga che l'agevolarlo, quando che negli altri suoni di linguetta, che anno maggiori dimensioni, il tuono non è solamente quello della linguetta, ma quello ancora della lunghezza del doccio. Vedesi ciò nell'accordio di questi gran docci di linguetta, che consiste nell'adattare il tuono di essa linguetta al tuono del doccio. Questo adattamento consiste in dare alla linguetta bastante lunghezza perchè uguagli le sue vibrazioni, quali son come quelle de' Pendoli a quelle del

posto di otto o quindici canne di simil diametro, ma di differenti lunghezze determinate a proporzione armonica di tuoni e semituoni di una o due ottave. Queste canne son di seguito poste per ordine, secondo la natural disposizione de' tuoni e mezz tuoni, con delle tramezzæ, affinchè non si tocchino. Il Signor Perrault chiama detto Istrumento Claquebois o SALTERIO (Il. parte del Fragore cap. 12. pag. 177.) e lo nota con molta ragione fra Strumenti, che sembrano non aver suono imitabile dalla voce disaminati a minuto, e che pur anno tutti i tuoni, venendo disaminati successivamente in tutte le sue parti.

del doccio, che son come le vibrazioni delle corde distese. Ecco la ragione della differenza tra i gran suoni della linguetta, e quello che si dice voce umana. Nell' Uomo non vi è parte, che possa compararsi con i corpi de' docci del a linguetta, quanto il canale della cavità della bocca e delle narici; poicche il doccio cortissimo formato dalla parte della Laringe ch'è al di sopra della *Glotta* non è più che di mezzo dito, & è incapace di allungamento e raccorciamento; nè può solo perciò mettersi in confronto col corpo de' docci produttori de' suoni detti *voce umana*.

Ma qual ajuto dà il doccio al suono, anche in quel di voce umana? è forse in accrescendolo solamente? ovvero in facendoseli proporzionale? certamente che la prima maniera è più probabile; perciocche il tuono da questi vien più vivo; e forse ancora con molta più probabilità lor giova in facendoseli proporzionale; poicche negli Organetti i docci dal basso delle tastie fino al soprano vanno insensibilmente scemando dalle quattro dita, che sono 48 linee, fino a poco più di 12 linee, secondo il progresso del suono più grave al suono più acuto; e nella voce umana dell' Organo le Canne insensibilmente abbassano dalle 6 dita fino alle 4, secondo l'istesso progresso.

Gli Artegiani veramente van tentoni per giungere a tal proporzione, ma pur vi arrivano o vi si accostano almeno; donde nasce la differenza tra 'l buono e 'l male Artefice, e tra l'opera buona o mala. Non potrebbe e' forse giugnerli a conoscere e dterminare tal proporzione? A me ciò non sembrerebbe impossibile se si cerchi ne' *diapason* tanto distanti quanto basta per comparare le picciole dimensioni con le grandi in alcuna delle

pro:

proporzioni armoniche ; forse così se ne verrebbe a capo , in maniera che si potrebbe dare agli Artefici d'Organo una sicura pratica per i suoni dell' Organetto e della voce umana , in disaminando le Canne dell'Organetto da fiato, come se fusse una Spinetta .

Attendendo , che altri di me più abile e meno occupato , metta in chiaro queste difficoltà , mi basta di conchiudere tre cose . La prima , che il canale esteriore accresca , temperi , e modifichi il suono secondo le proporzioni distanti , come quelle delle canne dell' Organetto , e della voce umana nell'Organo , quali fin' oggi per sola esperienza son conte.

La seconda conseguenza è , che 'l canale esteriore non aggiunga niente al tuono , ma bisogna pur confessare l'effetto suo maraviglioso nel risuonamento , e ciò si avvisa soprattutto dalla voce di basso ; (r) perciocche io ne ho inteso molti , che facean rimbombare le volte delle Chiese ; loche non ho osservato farsi dalle Canne d'Organo della lunghezza di 8 piedi.

Quin-

(r) Si avvisa dalla voce di basso) . Il risuonamento della bocca si conosce da una esperienza volgare , quantunque inveramente vigorosa : E questa , che con l'istrumento detto Tromba Marina , ovvero Tromba di Bearne, si fa, la quale se si tenga con una mano , e con l'altra si spinga la molla che ha nel mezzo , da cui si produce tutto il suono di tal istrumento , ella non produrrà rumore alcuno ; ma se si ponga tra' denti , e con la mano si spinga detta molla , produrrà ella nella bocca un sonoro mormorio che da molto lungi ancora si sente , e soprattutto i tuoni più bassi (v. il Signor Portault ne' suoi Saggi del

Quindi siegue, che 'l Canale esteriore non ag-
giunga cosa alcuna al tuono, il quale unicamente
fassi dalla linguetta dell' Uomo, cioè dalla *Glot-*
ta.

Per ordinario si paragona questa con la linguet-
ta dell' Oboè, e con ragione, se li consideri solamen-
te l'apertura dell' uno e dell' altra; ma poicche
l'effetto della linguetta dell' Oboè nasce più dalla
sua profondità che dalla sua fessura, tal paragone
non sarà confacevole mai a spiegar l'uso della *Glot-*
ta: Egli inoltre è certo, che la linguetta dell' Oboè
non abbia parte alcuna nella formazione del tuono
di detto Istrumento, che tutto fassi dalla lunghez-
za precisa dello stesso, ma solamente nel formar il
suono, giacche senz' essa e' non suonerebbe mai:
Dunque il suono addivien da lei, e non già 'l tuo-
no, che si produce dalla division della sua lunghez-
za

del Fragore II part. pag. 181, 182, 183) Reco' que-
sto passo, perche si conosca in qual maniera un risuo-
namento più forte del suon che lo produce possa dare
ad un suono uniforme tuoni differenti, quali non dif-
feriscono che per la variazione del risuonamento;
perciocche più chiaramente si osserva questo in detto
picciolo Istrumento, che nell' Oboè, sentendosi tutto
insieme e 'l suono della molla, che è sempre uguale
a se stesso e produce qualche dicono Falso Bordonio,
& il suono del risuonamento che fassi dalla bocca,
la quale, secondo che ella è più o meno aperta per
li diversi movimenti delle labbra, meno o più pro-
fonda secondo i differenti gradi di avvicinamento
o ritraimento della lingua, produce tuoni differenti
del risuonamento più alti o più bassi del suon dis-
so musicale.

za, e non già dalla lunghezza o profondità della linguetta, il di cui tuono è molto differente da quel dell' Istrumento. E questo per la linguetta dell'Oboè.

Qualche siegue riguarda le Linguette de' suoni di Linguetta dell'Organo.

La molla di ottone, detta *Linguetta*, che forma le sue vibrazioni sù 'l mezzo doecio di queste linguette d'Organo, chiamata *Echalotte*, o *Anima*, ha ben ella una distanza determinata, che può considerarsi come una spezie d'apertura; ma ella è differentissima da quella della *Glotta*. Può per la sua struttura ricevere vibrazioni sensibili all'occhio, quando che quella della linguetta dell'Oboè è sensibile solo alle labbra del Sonatore. Queste due sorti di linguette anno una notabilissima profondità, e da questa addivengono tutti i loro tuoni, che perciò non possono mettersi in aguaglio con la *Glotta*, per quel che riguarda la produzion de' tuoni; giacche questa non ha profondità alcuna, fuor che la doppiezza di una membrana e dell'intralciamiento delle fibre carnose e tendinose, dalle quali è intessuto l'intervallo di queste due membrane, il quale tutto 'nsieme non monta a un da presso alla grossezza di una linea: profondità da non esser posta in confronto con la minor linguetta del maggior soprano, e molto meno con quella del Trombone, e Fagotto, ch'è la più profonda, e la più cava. Dunque non può ella esser posta in paragone con qualunque altra linguetta.

Ma sembra ella molta la grossezza in sì picciola e breve fessura da poter gli orli di questa esser capaci di vibrazioni proporzionate per sì grande effetto; perciocchè dette vibrazioni accoppiate a certa misura di aperture, in alcune voci da basso giun-

giungono fino all' unisono C sol ut di basso (*r*), cioè ad un tuono, che risulta dalle vibrazioni di un doccio otto piedi lungo. Non può dunque mettersi in agguaglio la cagione che fa brandire le labbra della *Glotta* con altro Istrumento, che con quello (se tale può egli dirsi) che nasce dal vento impetuoso, che urta in una carta socchiusa, quale in luogo de' vetri incollata ripari i sportellini delle finestre: Che per brevità chiamerò *Impannata rombante*.

Nella *Glotta*, che è una specie di linguetta, le labbra sole son capaci di vibrazioni prodotte dal sottoccar dell' aere, che con violenza fra dette due labbra vien fuori; e queste vibrazioni devono esser varie secondo i gradi, in cui le cennate labbra diversamente tese o rallentate per tal effetto l'uno all' altro si avvicina, o l'un dall' altro si discosta. Possono ammetterli queste vibrazioni, & in esse sì corte & affollate una proporzion musica indiffinitamente lontana co' tuoni della voce, simile a un da presso a quella che deve supponersi tra l'apertura della linguetta del Basso, o di tutte altre parti dell' Oboè e tuono suo istesso. Gli abili Sonatori dell' Oboè san tagliare le loro linguette secondo questa proporzione, molto necessaria per aver dal corpo dell' Istrumento tutti que' suoni de' quali egli è capace, che tentoni cercano guidati solo dall' uso. Ma non sarebbe sì facile l'immaginare, che le vibrazioni delle labbra della *Glotta*, quantunque proporzionate a tuoni della voce, (*r*) (C sol ut di basso) Per cagion di esempio, quella del Signor Rossignol un tempo Musico del Signor Di Sourdeac, & ora il Signor Du Four Musico della Cappella Reale.

voce, come que' della linguetta dell'Oboè col tuono del suo corpo, fussero la sola cagione del tuono; perciocchè, siccome si è detto e dimostrato di sopra, il tuono del corpo dell'Oboè nasce dalla dimentione sua propria, e non già da quella della linguetta: Or egli si è ancor ivi supposto, che 'l tuon della voce nell'Uomo non possa formarsi dalla misura del corpo dell' Istrumento, cioè dalla misura della profondità della bocca e delle narici; & altrove si è provato, che li tuoni della voce dell' Uomo non potean farsi dalla profondità della sua linguetta, cioè dalla sua *Glotta*, che quasi è nulla o ben poca, e che quantunque fusse detta profondità altrettanta che quella della linguetta dell' Oboè, non potrebbe sola produrre i tuoni di cui si parla, siccome quella dell'Oboè non produce i tuoni del corpo dell' Istrumento. Che riman dunque? La bocca ha molto poca profondità da poter rendere i tuoni che si avvisano nella voce dell' Uomo, la *Glotta* è infinitamente men profonda di questa; dunque la sola apertura di essa *Glotta* unita alle vibrazioni delle labbra più o men affollate, a proporzione che sono esse più o meno stirate, non pare che possa produrre i tuoni della voce. Et ecco in che consiste questo non conosciuto Strumento da fiato di natura, cotanto antico quanto il genere umano istesso, & allo 'ncontro sì sconosciuto tra Strumenti da fiato nella Musica, & all' industria umana inimitabile.

7. L'arte istessa che ha saputo inventar i Flauti, gli Organi, i registri a Tromba, e l'Oboè, dal suono che 'l fiato produsse pinto a caso nelle Canne o nelle Sompogne, non ha potuto render piacevole il suono d'una *Impannata rombante*, quantunque abbia ella osservato farsi tutti i tuoni dal

so-

solo moto del violento e tempestoso vento , e dal solo grado dell' inegual sua velocità, producendo la minore i tuoni di Basso i più bassi , e la maggiore que'de' più alti Soprani: e pur tutto ciò per mezzo di una sola aperitura, e per le differenti sue vibrazioni. Quello però , che finora non ha osato di tentar l' arte , il Creatore ha fatto : E con un placido moto di aere, che scorre per una fessura variamente modificata, ha egli nella sola *Glotta* dell' Uomo con l' ajuto del solo canale esteriore formato il più sonoro , il più aggradevole , e 'l più perfetto , anzi 'l più proporzionato Strumento , o per meglio dire il solo giusto fra tutti i Strumenti o che artificiali siano o naturali: Perciocchè tutti gli altri o da fiato o da corde , anche i più perfettamente accordati, toltone il solo violino, son falsi a paragon della voce .

Non si può frattanto mettere in confronto questo sì perfetto Istrumento per la Musica , che con l'Istrumento il più difficile del Mondo ad imitarsi , e 'l più opposto alla Musica . Bisogna perciò dimostrarne la differenza. L'arte del Sommo Creatore nella semplicità di questa Mecanica , e nella prodigiosa molteplicità de' suo' usi , merita tutta l'attenzion nostra; potendoti quindi sperare di scoprire una porzione di questa ammirabile Mecanica .

La differenza tra l' *Impannata rombante* e l'Istrumento della voce dell' Uomo , è questa : L'aperitura della prima , essendo sempre l'istessa & incapace di per se a modificarsi, non può diversi tuoni produrre se non se per le spinte & urti esteriori i più alti , per mezzo di un rapido movimento, che tutto dalla sola quantità d'aere dipende qual accorre per valicar la fessura , e dalla violenza dell'

dell'urto che tal velocità cagiona, e dall'agitazione in cui mette gli orli di detta fessura. Per lo contrario quello pignimento cagiona il tuono basso, quando la velocità della stessa quantità di aere viene spinta con minor violenza alla cennata apertura, quale di per se non è capace di mutazione. Donde siegue che col tuono aguto vien sempre accompagnato il suono altrettanto più forte, quanto egli è più aguto; e col tuono grave il suono tanto più debile, quanto egli è più basso, senza che possa ciò variar mai; poicche la velocità dà il tuono a tale istrumento, il vigor di cui nasce dalla quantità dell'aere premuto e forzato. Or riguardando a questo Strumento, la velocità dell' aere, la spessezza delle vibrazioni negli orli della fessura, e la quantità dell' aere, devono essere sempre uniti per produrre il tuono alto, e divisi, per rendere il basso: quando che la *Glotta* umana resa capace di aprirsi e chiudersi più o meno, & il petto di spingere l'aere con maggior grado di forze, rende la voce umana più forte o più debile, come in ciascun tuono si vuole, & in tutti i tuoni nella loro natural distesa, come appresso dirassi.

Vediam dunque donde dipendono i movimenti che producono i tuoni della voce umana, & indi cercheremo ciocche sà li differenti gradi di forza in ciascun tuono,

La *Glotta* umana posta nell'atto di formar la voce è capace del solo proprio movimento, che è quello delle sue labbra, qual consiste nell'avvicinarsi l'uno all'altro per lo traimento delle loro fibre, che è tutta la loro azione; Poicche queste fibre son fortemente attaccate per la loro estremità anteriore, e per la loro estremità posteriore sodamente ferme, & ogni fibra di ciascun lato nelle
pie.

pieghe di una doppia e molto forte membrana congeguate, la di cui molla si drizza a dilungare le labbra uno dall' altro; tutto il moto, che dette fibre in contraendosi posson fare per avvicinar le labbra, si è di scemare la loro curvezza, sforzando la molla delle membrane. Assolutamente parlando, ann'esse, quando si voglia, molta forza per cambiare in linea retta la natural curvatura, che tiene le labbra della *Glotta* sempre socchiuse per la respirazione e per la voce; ma quando si toccan esse l' un l' altro in tutta la loro lunghezza, si toccan in maniera, e con tanta forza e giustezza, che un atomo d'aere non può scappar dal polmone, per molta quantità ch' e'ne contenga, e per qualunque sforzo che posson fare tutti i muscoli del basso ventre contro il diafragma, e questo contro detti due piccioli muscoli; allora, poicche la respirazione è soppressa, non vi è voce affatto. Si vede per lo meno da ciò, che se queste fibre sono capaci d' un azione molto forte per produrre il contatto scambievole delle labbra della *Glotta*, son esse con maggior ragione più adattate per avvicinarsi insensibilmente l'una all'altra, e che fuor di ciò non sono proprie per altro; e che la fermezza della loro unione d'avanti, e del loro arresto di dietro, contribuisca a rendernele capaci in maniera, che senza di detto attaccamento e di detto arresto non servirebbero esse nè alla voce, nè al canto, nè ad altr' uso men nobile, quantunque infinitamente più importante, più spesso, e più necessario. Egli è importanto vero, che contribuisca alla sua dilatazione per lo tuono basso della voce, ma questo farsi in rilasciandosi e secondando a' moti de' muscoli dilatatori della Laringe per i tuoni più bassi.

Posto ciò, fiam noi nel dritto di presumere, che

che i differenti gradi dell'apertura de' labbri della *Glotta* producano i differenti tuoni di ciascuna delle lei parti, che formano il pieno musico, cioè Basso, Baritono, Tenore, Contralto, Mezzo Soprano, e Soprano: Et ecco come. La voce non può farli che dalla *Glotta*, come si è provato: I tuoni della voce sono modificazioni della stessa; devono dunque esser prodotti dalle modificazioni della *Glotta*: Ma questa è capace d'una sola modificazione, qual si è il dilungamento & accostamento icambievole delle sue labbra; per questa parte dunque produce ella i differenti tuoni della voce. Questa modificazione comprende due circostanze, una capitale e prima per le produzioni della voce, l'altra è una conseguenza di questa, ma sì necessaria & infallibile, che la prima non può essere senza della seconda. La prima è, che le labbra dal tuono più basso fino al più alto si stirino di più in più; la seconda, che quanto più si distendono, più esse si avvicinano. Dalla prima ne siegue, che le loro vibrazioni saranno altrettanto più spesse quanto più il tuono andrà avanzandosi al Soprano, e che la voce sarà giusta quando dette due labbra saranno ugualmente stirate, e falsa, quando inegualmente lo saranno: locchè v'è perfettamente di accordo con la natura degl' Istrumenti da corde: Dalla seconda ne siegue, che quanto più saranno alti i tuoni, più esse si accosteranno: locchè v'è di pari perfettamente con gli Strumenti da fiato governati dalle lingue. I gradi delle stirature nelle labbra sono le prime e principali cagioni de' tuoni, quantunque le loro differenze sian poco sensibili e difficili a dividersi, I gradi di avvicinamento sono conseguenze inseparabili della stiratura primiera cagione de' tuoni, ma egli è più facile il con-

cepire, che determinar questi gradi. Atteniamoci dunque qui per dar un'idea più precisa della cosa, e diciamo: Questa modificazione consistere in una tensione, donde nasce la numerosa suddivisione di un intervallo di picciolissimo spazio, il quale (e) quantunque picciolo, che e' sia, è egli, parlando strettamente, capace di una suddivisione infinita. Eccone le pruove sensibili.

Egli

(e) Il quale quantunque picciolo che e' sia).
Nè in Fisica, nè in Metafisica ha ciò bisogno di pruova. Gli Epicurei, & alcuni Cartesiani non an lasciato di contrastarlo: Ma ella è inutile la contestazione per istabilir verità di per loro chiare. Egli è bene frattanto di sapere fin dove possa giugner l'arte nella divisione delle superficie; perciocchè vincendo ciò l'immaginazione di tutti coloro che non ne an veduto l'effetto, rimarran meno sorpresi quindi a poco nel vedere una linea divisa in più di 9600 parti. Gli Ingegneri de' Strumenti Matematici dividono il dito in più di 400 parti uguali visibilissime, donde siegue, che possano essi dividere attualmente l'intervallo di una linea in 32. La sola arte, da molta industria aiutata è quella che fa tal divisione, la quale puol esser riputata grossolana, qualora gli occhi possano conoscere ciascuna delle parti di essa divisione. Così gli occhi con l'aiuto del Microscopio potrebbero in ciascuno di detti piccioli intervalli moltiplicati 300 volte, com'egli è facile, di segnare parti 300 volte più picciole; locchè monterebbe a più di 9600 parti uguali in una linea. Ma l'arte soccorsa dalla natura va molto più lungi per le mani de' Battitori, e Tiratori dell'Oro, quali senza pensarvi, e con istrumenti molto grossolani dividono una linea d'Oro, i Battitori in più di 30034 parti uguali, & i Tira-

tori

tori d'Oro in più di 12327. parti. La dimostrazione si veggia nella Filica del fu Signor Rohault prim. part. cap. 9. pag. 53 e 54 dell'edizione di Parigi in 4^o 1671.

Non è dunque questa la difficoltà, ma 'l sapere, se io con ragione abbia detto che la sola apertura della Glotta faccia solamente il suono, e col dilatarsi e restringersi produca i suoni della voce. Un dottissimo Amico gran Matematico no'l consente: egli aggiunge all'apertura della Glotta le vibrazioni delle sue labbra, & a queste due cagioni due altre, la prima l'accortamento della Glotta, e la seconda il moto dell'Epiglotta considerata, in riguardo a detta Glotta, come le laminette di stagno o di piombo negli Organi, che gli Artefici di essi chiamano Orecchie, applicandole a' due lati dell'apertura di qualunque doccio; di tutti i suoni d'Organo, e fra gli altri in quelli detti di Flauto, e di Doublette, o Zafolini. Siano d'accordo nelle due prime cagioni, che nel fondo si riducono ad una; La difficoltà riman per le altre due ultime, su le quali dico, 1. Quanto più saranno le cagioni più dovranno essere le combinazioni d'azioni e de' gradi d'azioni in esse, e per conseguenza la Meccanica dell'Organo della voce e suoi effetti saranno ammirabili e difficili a spiegarsi, ond'è che niente si scema dalla difficoltà per tal moltiplicazione. Ma non dirizzo noi abbiamo di moltiplicar le cagioni e schivar la difficoltà. Trattasi dunque unicamente di cercare e conoscere la verità. Or le due cagioni pretese son fondate sopra due errori di fatto. Riguardo alla prima io dico, che essendo fermata la Glotta nelle sue due estremità, non si raccorci punto: Se potesse ella esser raccorciata, avverrebbe ciò per l'avvicinamento scambievolmente delle cartilagini d'avanti e di dietro; ma se ciò fosse sarebbe ella rilasciata, nè

dunque in istato da produrre la voce. E' posta ella in questo stato qualora vien tirata a contrò senso dall'azione de' muscoli esteriori, i quali operando su la base della laringe (la Cartilagine Annulare, o Cricoides) si dirizzano con i loro attaccamenti alla cartilagine anteriore (Tiroide) & alla cartilagine posteriore (Aritenoide) a dilungar l'una dall'altra da innanzi in dietro, per rendere per d'avanti e per dietro sodo un fondamento alla tension particolare e volontaria delle labbra della Glotta. Fan dunque a un da presso in questo stato dette cartilagini l'effetto d'un Tamburo, cioè la laringe l'effetto della Cassa, i muscoli quello delle corde dette Tiranti, quali tengono a dovere la pelle del Tamburo, siccome tutti i Nodi che stirano la pelle fanno uniti l'effetto delle fibre delle labbra della Glotta. Questo paragone non dee in tutto l'rigor prendersi: Et ecco il primo error di fatto. Per la seconda, qual si è che 'l moto preteso dell'Epiglotta contribuisca a tuoni bassi per l'avvicinamento verso l'apertura del Flauto, cioè verso la Glotta; egli è certo, e confessato da tutti i più diligenti Notomisti, che questa cartilagine non abbia movimento volontario & attivo nell'Uomo, ma la cagion della voce è un'azione, e questa è volontaria; eccoci dunque ritornati alla semplicità dell'Organo, come io l'ho esposto, che è l'apertura delle labbra stirate. Le cagioni si ridurranno a due, se così pur si voglia, purché si consideri e confessi, che le differenti aperture sono gli effetti de' stiramenti vari, e che questi siano inseparabili dalle differenti aperture.

Per darne alcuna idea ho aggiunta la figura in cui la linea esteriore rappresenta l'apertura della Glotta, e le linee puntate interiori tre differenti gradi d'avvicinamento sciambievole delle due labbra. Questi saran che agevolmente possa ogn'uno

immaginarsi gli altri gradi quasi che innumerabili. L'apertura che qui si dà alla Glotta è molto più grande a proporzione della naturale, disegnata così per evitar la confusione delle lettere e delle linee.

Spiegamento della Figura.

Suppongo I., che la Figura $ADBDA$ rappresenti la Glotta tanto aperta quanto è necessaria per formar la voce la più grave. II. Che indi la Glotta si restringa in EE secondo gli Archi AEB , AEB , per rendere un suono più aguto: III. Che dipoi si restringa in FF , in GG , e così di mano in mano per formar suoni sempre più aguti.

In tali differenti situazioni possono questi Archi esser considerati come Archi di Parabola, quali for-
mano con la retta ACB segmenti doppi, che rappresentano, come spiragli per dove esce l'aere. Egli è chiaro, che essendo questo spinto con la stessa velocità, la quantità che ne vien fuori sia proporzionata all'apertura della Glotta, cioè alla superficie de' doppi segmenti, la quale è proporzionata agli assi DD , EE , FF , GG .

Se indi si supponga che l'aere, qual esce, formi un suono aguto di più in più per intervalli uguali, può allora crederfi che le labbra della Glotta più o meno stirate sian considerate come corde distese, le quali s'accortino inegualmente per alzare il tuono per intervalli uguali. Questo in-gual accortamento delle corde per lo tuono alto è chiaro nel Monocordo. Da detta ineguaglianza nell'istrumento della voce ne nasce un'altra nello scemzamento del picciolo diametro della sua apertura. Può dunque supponersi, che questi assi DD , EE , o le metà di essi DC , EC ,
X 3
FC,

Egli è impossibile di vedere come tale suddivisione si faccia, ma non è già difficile il saperlo con intiera certezza, e determinarla ancora sino ad un certo segno. 1. (v) può ciascun vedere le differenze delle aperture della laringe ne' differenti sessi, e nell' età varie di ciascun sesso, senza segarli. Si vedranno minori aperture della *Glotta*, e minor profondità del canale esteriore, nell' età e nel sesso i più propri a cantar da Soprano; e si rinverrà tutto 'l contrario nell' età e nel sesso i più propri a produrre i tuoni, che richiedono maggior aere,

FC, CC diminuiscano in proporzion continua; sicche se l'apertura della metà della *Glotta* DC forma un suono, e l'apertura FC ne fa un p'ù aguto per un Eptameride, vi è luogo di credere, che DC sia ad EC, come 435 a 424, o che DE sia $\frac{1}{11}$ di DC. Per l'istessa ragione, se di nuovo si alzi per una mezza Eptameride la voce, la *Glotta* in EF si restringerà per la quantità EF, che sarà ancora $\frac{1}{11}$ di EC, e così di mano in mano, come nel testo si è detto.

(v) Può ciascun vedere &c. Il Signor Mercurio de' Notomici della Compagnia mi ha dimostrato in vari tempi da 15 o 16 Laringi de' due sessi dal loro nascere sino all' età decrepita. Ho io misurate in esse le aperture della *Glotta*, esaminata prima la situazione riguardo alle cartilagini così anteriori che posteriori, e la composizione. Se a piacere vi ho considerate le unioni de' muscoli propri, e comuni della laringe, tanto interiori che esteriori. Da queste riflessioni, che io ho fatte sulla struttura di dette parti ne ho didotto tutto ciò che ho detto intorno alla sua azione, composizione, e fabbrica di tutti detti pezzi: poiche la più grande, e principal parte di tutti essi è molto differente da quel che altre volte io avea

let.

letto ne' Notomisti: Ho pregato il Signor Meri a disaminar di nuovo detta parte, e soprattutto la composizione della Glotta, che io non ho avuto l'agio di fare, se non se col segamento di due sole laringi, nelle quali l'ho io ritrovare conformi a se stesse in tutte le circostanze essenziali, segandole per davanti della laringe socchiusa dalle cartilagini posteriori. Era ella formata, come nella Memoria ho detto, da una matassa di fibre quasi carnose in un de' due soggetti, e nell'altro tendinose fortissimamente attaccate per davanti verso la parte bassa della cartilagine anteriore, e per di dietro tutto sotto alle cartilagini posteriori. I muscoli esteriori propri della laringe nascono tutti dal circolo cartilaginoso, su di cui le altre cartilagini tanto l'anteriori che le posteriori son poggiate, & an tutto il loro moto. Questi muscoli esteriori sono attaccati all'orlo inferiore delle cartilagini mobili, le fibre di essi dirizzate da basso in alto obliquamente si dividono dal mezzo per due parti opposte, anteriore & posteriore della cartilagine annulare per appiccarsi alle parti laterali inferiori della cartilagine anteriore, e delle cartilagini posteriori. Quanto a muscoli interiori della laringe, sembra che gli Autori sin oggi l'abbian poco disaminati: vedi Diemerbroeck lib. II. cap. 15. di sua Notomia pag. 220. dell'edizione di Lione 1683., dove cita egli Riolo no su l'origine di detto muscolo, senza dire da qual Opera abbia egli preso il sentimento che lui attribuisce. Io non so che Riolo, qual ha detto che nell'Uomo la Glotta è formata dall'estremità del Muscolo Tiroaritenoides (Antropografia lib. IV. cap. 11. pag. 291.), faccia altro motto su di ciò. Quello che chiama estremità del muscolo Tiroaritenoides è quel che io ho detto matassa di fibre tendinose. Son esse dirizzate come la Glotta da avanti in dietro, e sostanute

secondo l'istessa direzione d' un piano di fibre carnose parallele a queste tendinose. Quanto al muscolo Tiroaritenoidico, in una sezione fatta a mie prebber il Signor Mery dimostrarmi ch' egli è composto da molte differentissime direzioni di fibre tendinose e carnose, che formano la Glotta; e le direzioni che egli ave osservate nel muscolo Tiroaritenoidico son molto tra di loro differenti per formare più muscoli, o almeno un muscolo composto di tre direzioni differentissime. Mi fe ancora vedere al di sopra della matassa tendinosa longitudinale della Glotta un pinno di fibre carnose trasversali, che potrebbero ben essere una delle cagioni, che sostengono la centina del contorno della Glotta, e servir d' Antagonista alla matassa, & al piano longitudinale, senza metter in conto la molla, qual puol essere nella membrana che cuopre & involge tutto ciò. Questo però richiede maggior esame; perciocche non bene ancora son io sicuro, se la matassa tendinosa, qual' è una fortissima corda, quantunque delicatissima, faccia un muscolo a parte ben circoscritto e distinto dal piano carnosu, che se l'unisce nell'istessa direzione. Sospetta il Signor Mery che questa matassa tendinosa sia un semplice ligamento; come in fatti l' appiccamento di queste fibre alle due cartilagini opposte, e la fabrica ordinaria del muscolo lo persuadono. Ma la necessità indispensabile d' un moto di tensione in questa parte può far credere una struttura straordinaria, che non può mancare al bisogno, secondo la Meccanica del Creatore, per cui si veggono tanti altri esempi nella Notomia comparata. In attendendo che il Signor Mery divisi tutto ciò, e mi sembra di averne bastante conoscenza per osare a profferire esser sicuro, che l'uso de' muscoli esteriori della la-

ringe, riguardo alla voce, sia di tener ferma la cassa composta di cartilagini della laringe, e metterla in istato di dare bastante fondamento al moto de' muscoli propri della Glotta, quali soli son capaci di fare il lavoro di questa maravigliosa apertura stirandola d'avanti in dietro, & a contro senso per fianchi in tutti i gradi necessari alla voce, & a tutti i tuoni di cui è capace: Loc che sarà tenuto per provato da chi considererà bene le conseguenze della Meccanica pur ora descritta.

Egli è vero, che 'l luogo dell'inserzione de' muscoli esteriori alle cartilagini anteriori, & alle posteriori, non porge loro gran forza da tener pronta la cassa della laringe, perciocchè essi muscoli si appiccano solamente all' orlo inferiore di queste cartilagini, essendo ivi precisamente il centro del loro moto per davanti e per di dietro, che solo può concorrere a tirare contro senso la tensione volontaria della Glotta su di questi due appiccamenti; ma 1. Questa situazione de' muscoli sarebbe molto men propria per dilatare e chiudere la Cassa, che per tenerla pronta, 2. La cartilagine anteriore, oltre a questi due muscoli esteriori propri, ha in detto luogo il contatto o l'unione di due gran muscoli bronchiali, locchè serve lei d'un valevole ritegno contro la tensione della Glotta. Le due cartilagini posteriori non han' esse un simile vantaggio, quantunque ne abbiano men bisogno; perciocchè il punto fisso della Glotta dalla parte di dietro è precisamente nel centro del movimento di queste cartilagini, contro l'arresto delle quali assicurato da due muscoli molta carnosità non può operar con efficacia; quandoche il punto fisso della Glotta dalla parte di avanti, quantunque attaccato assai vicino al centro del movimento della

CAR.

aere e minor velocità ne' moti, cioè a cantar le parti di Tenore o de' Bassi. 2. Ciascuno in se stesso può sentir chiaramente il restringimento di detta apertura, riflettendo su di ciò che nella sua gorga passi, quante volte si voglia dal silenzio far passaggio a parlare, e dalla voce della parola a quella del Canto, e soprattutto ne' tuoni alti secondo l'ordine musicale, perciocchè queste due voci son differentissime senza neppur cambiar di tuono. 3. Sperimentasi ancora la differenza de' gradi di tal restringimento nell'estensione della sua voce dal Tenore sino a tuoni più alti, maggiormente quando si passi immediatamente da un tuono di più del Tenore alla quarta, alla quinta, o alla sesta soprana, e precisamente quando questa sesta è forzata. 4. Si veggono le aperture delle linguette di varj membri di Musica nell'Oboè, e si osserva, che le linguette del Basso nell'Oboè.

Cartilagine Tiroide, è molto più distante dal centro di questo moto, e sarebbe in conseguenza più capace di forzare il ritegno di questa cartilagine. Se ella non fusse rassodata da quattro muscoli molto più forti di que' che tirano la Glotta: Perciocchè sebene questi ultimi siano più in forze per la loro situazione, possono non aver bisogno di tutto il lor vigore per gli usi della voce, e quando mai ne avessero bisogno, lo che non avviene, sarebbe difficile che due piccioli muscoli vincessero lo sforzo di sei, i quattro minori de' quali sono per loro corpo almen così forti com'essi, e i due altri incomparabilmente maggiori. In fatti questi sei muscoli si oppongono alla Glotta nella suppression volontaria della respirazione, qual dipende da un'azione della Glotta incomparabilmente più forte di quella donde farsi la voce.

Oboè an per lo meno doppia apertura delle linguette del Soprano, & a proporzione son più grandi di quelle del Tenore. 5. E' si sà, che per ricever suono da qualunque linguetta di Oboè, bisogna frignerla tra sue labbra sino ad un certo segno, locche non può farli senza diminuire il suo picciolo diametro. 6. In fine e' si sà che se s'imbocchi la linguetta separata dall' istrumento qualora moderata compression e, delle labbra l'ha posta in istato di dar fuori il suo tuono naturale, se poi ella si venga a frignere di vantaggio, il tuono sarà più alto; in guisa che un Uomo abile & esercitato nel suono dell'Oboè può successivamente farle formare più tuoni differenti. Ho io veduto il Signor *Filidor* Padre toccar di corso tutti i tuoni e semituoni d'un ottava & in là, sù d'una linguetta di Fagotto tolta dal corpo dell' Istrumento.

Egli è dunque certo, che le differenti aperture della *Glotta* producano o accompagnino almeno inseparabilmente differenti tuoni tanto negli Istrumenti da fiato naturali, com'è la *Glotta* umana, quanto in quelli da fiato artificiali, quali sono le differenti parti della Sinfonia dell' Oboè, & in altra guisa ne' differenti docci de' suoni di linguetta nell'Organo.

E' ancora certo, che lo scemamento dell' apertura alzi il tuono della *Glotta* e delle linguette, e che l'accrescimento di detta apertura abbassi il tuono.

In fine è fermo, che l'apertura minore faccia il tuono aguto, perciocche l'aere vi passa più sollecito, & in conseguenza con più violenza; e che l'apertura più grande faccia il grave, perciocche l'aere vi passa con minor velocità, & in consequen-

za con minor violenza: E di là nasce, che se più debil fiato si dia ad alcuna qualunque linguetta, renda questa il tuono basso, quale allo 'ncontro alza quando il fiato più fortemente si pigne. Quindi è che 'l suono del Flauto e di linguetta d'Organo sia più uguale e più giusto di quel che si fanno per l'imboccatura de' Sonatori di Flauto e di Oboè, perciocche il pignimento dell'aere non mai varia nell'Organo essendo regolato da' pesi invariabili che premono i Mantici, quandoche i Sonatori di Flauto e di Oboè lo spingono ora più ora meno, sicche spesso sonan essi falso.

Questa velocità del tragetto d'aere per la *Glotta* non suppone precipitazione nel corso dell'aere contenuto nel soffietto dell' Uomo, cioè nel canal dell'Aspera Arteria, ma allo 'ncontro suppone in detto canale un piacevole & uguale corso in tutte forti di tuoni. Frattanto i differenti tuoni della *Glotta* vengono da differenti gradi di velocità, che tiene l'aere in uscendo per detta apertura: E questo perche detta fessura più o meno si apre. Così, se un' istessa quantità di alcun qualunque liquore pinta da un' istessa forza in un medesimo uoccio successivamente si presenti a' forami o zampilli di varj diametri, essa più velocemente passerà per quello di minor diametro che per lo più grande: (x) vedesi ciò sensibilissimamente ne' differenti Sifoni delle Fontane zampillanti. Or la *Glotta* è un Sifone, che di per se varia all' infinito per la facilità che tiene di accrescere il suo diametro e dimezzarlo in tutti

(x) Vedesi ciò &c.) Può fra gli altri osservarsi questo modo nel Trattato de' moti delle acque, e di altri liquori III., & IV. part. composto dal *fr* Signor Mariotte.

tutti gradi tra gli estremi del suo accrescimento e diminuzione.

Bastantemente si è parlato della cagione della diversità de' tuoni per mettere in qualche chiarezza la prima maraviglia dell' istrumento musico naturale dato all' Uomo: Perciocchè molto e ben si vede, ch' essendo il polmon dell' Uomo una conserva d' aere molto picciola per poter bastare a questo artificio d'aere chiamato, Voce musicale, in una lunga durata di voce, o per lunghi passaggi composti di semicrome e biscrome quali non soffrono interrompimento alcuno o ripigliamento di fiato, vi bisogna un' estrema destrezza nel dispensar l' aere con ritetba per non rimaner in sulle secche: E nell' istesso tempo si vede, che 'l Creatore ha prevenuto a tal inconveniente col solo espediente di render la *Glotta* capace di stringersi e dilatarsi.

La seconda maraviglia di questa, qual fa la sua terza differenza con l' *Impannata*, li è l'esser stata resa propria non solamente a produrre tutt' i tuoni nell' estensione intera della voce, ma tutt' i gradi ancora di forte e di debòle in ciascun de' suo' tuoni, e questo con lo stesso espediente di render capace la *Glotta* di restringersi e dilatarsi: Et eccone il modo. Il suono dipende dalla velocità, e 'l tuono dal grado della celerità di quell' aere che vien fuori per la *Glotta* e dell' intervallo dell' e sue vibrazioni; la forza dalla quantità dell' aere accresciuta, e la debolezza dalla scemata. Come dunque può conservarsi l'istesso tuono, e crescere la quantità dell' aere? giacchè una più gran quantità di questo passando per l'istessa apertura deve scorrervi più velocemente, & alzare in conseguenza il tuono: Ma noi supponiamo che il tuono sia sempre l'istesso, o che il suono sia più forte, o che si renda più debile. Avvien

Avvien ciò perchè la *Glotta* si aprè per lasciar via scappare maggior aere, e si restringe per farne scorrer meno, e si dilata precisamente tanto quanto bisogna per quel grado di forza che se li vuot dare, e si stringe tantò quanto bisogna per passare dal forte al debile senza cambiar tuono: Giacche egli è assolutamente indifferente per la velocità dell'aere, o che più aere si presenti alla *Glotta* dilatata quanto bisogna per lasciar passare questa quantità d'aere con la stessa celerità che aveva passando dal debile al forte, o di restringerla precisamente quanto conviene per conservare l'istesso grado di velocità in una minor quantità d'aere passando dal forte al debile. In questa proporzione & in questa giustezza consiste il maraviglioso di quest'Opera, il di cui successo per tener il tuono nel cambiamento della forza dipende da una industria, che l'intelligenza umana non è capace a molto dapresso determinare così giusta come il natural istinto fa.

Picciola riflessione bisogna per isviluppare questa doppia maraviglia della produzion de' tuoni, e del forte e debile di ciascun di essi, e per far conoscere oltre a ciò come i moti voluntarj della *Glotta* necessarj per produrre i differenti tuoni in tutti gradi di forza son ammirabili nella lor delicatezza, nella giustezza, e nella loro prontezza, e come son complicati nel caso del forte e del debile in un istesso tuono. Frattantò per esperienza si conosce e per mezzo del giudizio di un orecchio giusto & esercitato, come son essi facili, pronti, sicuri e giusti con tutta detta complicazione. Son queste tre circostanze differenti, delicatezza, giustezza, e prontezza, che bisogna considerarle separatamente per non confonder cosa. Queste conseguenze tutte traspajono ora, ma da quel che siegue si apprenderà la differenza.

renza qual vi è tra 'l concepire & sfaglio le opere naturali, e diffaminarle per minuto.

Per conoscer dunque fin dove giunga la delicatezza de' moti che producono i tuoni, bisogna considerar quel che siegue.

Convien che si risovvenga ogn' uno che l'apertura d'una linguetta di basso d'Oboè imboccata sia non più che di una linea, e che quella di Soprano, di mezza linea. Egli è più che probabile, che riguardo alle aperture può farsi agguaglio della *Glotta* umana con l'apertura della linguetta dell'Oboè: Si possono dunque stimare le dimensioni dell'apertura della *Glotta* umana nell'azione, da quella d'una linguetta d'Oboè. La moderata premittura delle labbra del Musico, che imbocca questa linguetta, scema qualche cosa da detta apertura, & egli è certo che in ogni linguetta e nella *Glotta* d'una voce Soprana, siccome di tutte altre voci, il restringimento necessario per produrre il tuono più alto deve lasciare ancora qualche distanza tra le due labbra della *Glotta* per lo valico dell'aere, perciocche senza di questa non si produrrebbe la voce. Ecco dunque il picciolo diametro della *Glotta* di un Soprano ridotto da questi due scemamenti a circa un quarto di linea; ma io vò lui concederli una linea intiera come ad una linguetta di basso: A questa voce di Soprano sù le prime non dà altro che due ottave; se li potrebbe dar di vantaggio per questo prim' ordine di divisione senza niente alterare: perciocche ho io un esempio vivo di più di 16. tuoni interi di estension di voce piena, senza metter in conto i tuoni forzati alti e bassi, quali non si contano in Musica ma sì in Fisica, perciocche son essi tuoni meno piacevoli invero, ma giustissimi intanto e sensibilissimi, prodotti dalla *Glotta*. La-
scio

scio questo vantaggio per non dar luogo a pensare che io vada in cerca del maraviglioso.

Quando l'esempio di quella estensione fusse unico, non lascierebbe di esser vero, nè la suddivisione men effettiva & attuale; ma di questi esempi si trovan molti, quando si cercano, & (y) Io ne sò due, uno Soprano e l'altro Basso quasi che di una sì grande estensione; quantunque le voci di Basso per ordinario l'abbian maggiore de' Soprani.

Potrebbe si dunque sù l'esempio di questo Soprano far conto di 16 tuoni intieri con qualche cosa di più. Ma poichè tali esempi non son comuni contentiamoci d'una estensione meno straordinaria, qual'è di 12. Ecco l'apertura della *Glotta* comè quella d'un Basso, quale non ha che circa una linea di diametro divisa in 12 parti. Divide l'arte nelle misure volgari una linea in 6 parti per l'esattezza e facilità del Passo; può dunque facilmente comprenderfi che possa la natura dividerla in 12. Si sa ancora che ella la divide attualmente in 12., poichè l'estensione ordinaria della voce va a compire due ottave che son 12. tuoni intieri; e si comprenderebbe ancora una maggior divisione, se

(y) Io ne sò due &c.) Il Soprano della Signora de la Lande Figlia del Signor de la Lande Soprantendente della Musica Reale. Ha ella una terza minore al di là delle due ottave, e tutto d'una voce piena così forte, così pura, e così dolce in A mi la di alto, che nel mezzo della sua estensione, senza contare due gran tuoni un poco men naturali, l'uno più alto, qual'è Be fa si, ancora C sol ut, isforzando, l'altro di basso, quale è la Chiave di F ut la. Il Basso del Signor Du Four Musico della Cappella Reale, di cui si è parlato nella nota 1.

vi fusse un simigliante fondamento di crederla, poichè l'arte istessa può divider la linea in più di 32. parti: Essendo egli un assioma, come si è detto, che ogni quantità, fisicamente parlando, è divisibile all'infinito.

Vediam dunque se vi è alcun fondamento da credere in questo una maggior suddivisione: ella mi sembrerebbe indubitabile, quante volte un tuono può suddividersi. Ma ogn'un sa ch'ei primieramente si suddivida in due semituoni, indi in 90 11 particelle, che la Teoria musica chiama *Commas*, come si è detto. I Fisici possono dividerlo quanto che loro piace; perciocchè se di due corde unisone perfettamente su d'un Monocordo si accorti una nella 2000. parte della sua lunghezza, un giusto orecchio si accorgerebbe della dissonanza, la quale è la 4. parte d'un 49.^{mo}, cioè $\frac{4}{49}$ di tuono, per esperienza fatta dal Signor *Sauveur*. Ma una voce giusta intonata all'unisone delle due corde prima della dissonanza, cantando intonerà al suono della corda accortata. Così ho io inteso dire da un chiaro Matematico, qual'è insieme ottimo Musicista e Sonatore di molti svariati Strumenti, come pure ho sperimentato cento volte in me stesso che la suddivisione d'un sol tuono preso dall'unisone, e per insensibili scemamenti guidato fino ad un altro tuono prossimo, non ha egli limiti affatto. Bisogna impertanto darli qualche termine, almeno per renderci intelligibili, e lasciare alcuna idea di tutto questo. Il Matematico, di cui ho parlato, divide l'ottava in 810 parti uguali: L'ottava s'uguaglia a sei intieri tuoni e poco più. In contandoli uguali, per ciascun tuono vi son 135 parti uguali. Egli non è questo un calcolo fatto in aere o puramente speculativo, ma una divisione effettiva eseguita su.

Memor. 1700,

X

di

di un Monocordo inventato e collrutto per l'accordo d'un Cembalo senza andar tentoni e dalla pratica avverato. In fatti e' si adopera per accordare quest' Istrumento per mezzo dell' unisono con le differenti divisioni di detto Monocordo determinate da numeri destinati a tutti tuoni, o giusti come le ottave, o temperati come tutte le altre consonanze delle taste. Potrei dunque seguir tal calcolo; ma mi contenterò di quello che'l Sig. *Sauveur* dà a ciascun' intervallo da un tuono all' altro, cioè al tuono mezzano 49 parti, ch'ei dice *Eptameridi*; quindi è che in due ottave, cioè in 12 tuoni, l'*Eptameridi* son 602. Queste *Eptameridi* sono sensibilissime, essendo precisamente la differenza d'una quinta moderata del Cembalo o dell' Organo ad una quinta giusta. Or non vi è Musico che facilmente non intuoni questa differenza, non v' essendo voce giusta che non intuoni la quarta parte all' unisono di qualunque Istrumento, come già ho detto; ma noi ci contentiamo della metà: Duplicando dunque il numero 602, avremo 1204. : Ecco il secondo ordine di suddivisione nell'intervallo minor d'una linea. Et ecco il terzo.

Il suon della voce in ciascun di questi tuoni puol essere affottigliato da insensibili diminuzioni. Questo affottigliamento necessariamente suppone & ad occhi veggenti, secondo quel che si è detto, che si moderi il fiato, e si restringa la *Glotta*. Tutti i Sonatori di Oboè praticano così, nè possono altrimenti fare, come per pratica e per teorica ancora si vede; perciocchè questo più e meno non cambia affatto il tuono. Di là nasce un terzo ordine di suddivisione nell' intervallo minor d'una linea, e dett' ordine consiste in moltiplicare il numero precedente de' svariati tuoni, & in conseguenza

altrettante differenti diminuzioni di un diametro minor d'una linea, per lo numero degli scemamenti dell' affottigliamento . Or queste diminuzioni sono in rigore innumerabili, o impossibili per lo meno a dimerminarli con numeri . Riduciamle intanto ad un preciso , e facciamne quattro : D'ciam dunque quattro volte 1204. fanno 4816. Nè questo è l'intero , perciocchè tutte le cennate divisioni nel picciolo diametro della *Glotta* suppongono l'avvicinamento scambievole delle due sue labbra; quindi viene , che debbano esse ugualmente partire tra di loro questi gradi di avvicinamento , quantunque delicati e' siano . Raddoppiamo dunque il numero 4816., e faremo 9632. Se taluno sperimenta questo calcolo alterato , consideri che quì li tratta della *Glotta* d'un Soprano , qual nella voce attuale non può avere maggior intervallo di un quarto di linea : locche renderebbe quadruplo il numero di sopra .

Ecco dunque un diametro minor d'una linea diviso attualmente in 9632 parti , qual numero di suddivisione d'un sì picciolo intervallo sembrerebbe sorprendente, se a mio credere non fusse ben provato: Et in fatti egli è molto minore e men maraviglioso di quello che 'l Creatore ha prodotto : Perciocchè oltre l'aver io fatta l'apertura della linguetta del Basso uguale a quella del Soprano, non ho curato ogn'altro grado di suddivisione de' numeri multiplicabili molto più di que' sù de' quali ho io fatto il conto: Et oltre a ciò ho supposto le parti uguali , quando che fermamente son esse ineguali , Ma di qual ineguaglianza , & in qual proporzione ? giacche e' sembra , che si possa fin là pur gire , dovendosi considerar le labbra della *Glotta* come corde stirate. Or quantunque secondo

Il calcolo del Sig. *Sauveur* le 301 Eptameridi dell'ottava siano particelle tra loro uguali, pur essendo queste divisioni adattate alle corde, la tension di queste è inegualmente divisa per tale adattamento: Sicche la prima Eptameride occupa su la corda un maggiore spazio della seconda, la seconda della terza, la terza della quarta, e così per ordine fino all'ultima.

Questa ineguaglianza è regolata secondo la proporzione di 435 a 424, e questa proporzione è dimostrata dallo stesso Autore. Essendo così, occuperà la prima Eptameride $\frac{1}{41}$ parte dell' intiera corda, e la seconda $\frac{1}{41}$ del rimanente dell' istessa corda, e la terza $\frac{1}{41}$ dell' altro rimanente di questa, camminando sempre così dalla più bassa Eptameride fino alla più alta. (2)

Tutto ciò molto ben si comprende: (aa) Ma
chi

(2) Dalla più bassa &c.) Questa sarà la 301 in un ottava, per conseguenza la 602 delle due ottave che io dò alla voce, e la 1204 Semi-Eptameride, poicche si è detto e provato con l'esperienza, che un giusto orecchio distingue un quarto d' Eptameride di differenza di due corde unisone, una delle quali sia stata accordata su 'l Monocordo in una parte minore di $\frac{1}{4000}$, e che una giusta voce possa intunare e l' unisone e la differenza.

(aa) Ma chi può comprendere &c.) Geometricamente parlando, son esse tra di loro incommensurabili, ma devono riguardarsi come commensurabili, poicche si tratta d'un'arte pratica, & in conseguenza dispensata dal rigor Geometrico. Frattanto suppone ella 1204 gradi di suddivisione d'uno spazio molto picciolo, qual v'è sempre stremando, e che
in

chi lo può senz'ammirarlo? 1. Una tal divisione attuale innumerabile in un sì piccio o intervallo, e tanto nelle sue parti ineguale; & 2. Una inegualgianza sì proporzionata tra particelle cotanto innumerabili, e sì inegualmente ineguali!

Questo è quanto doveva io dire sù la dilicatezza de' movimenti delle due labbra che formano l'apertura chiamata *Glossa*, quali si stringono per la produzione de' suoni e de' tuoni. Rimane intanto a dire alcuna cosa della maraviglia, qual nasce dalla giustezza della voce.

Sù di questa può in un motto dirsi che detti movimenti, essendo così delicati quanto son bastevoli per produrre il loro effetto, debbano essere e sian effettivamente in tal dilicatezza infinitamente precisi, sicche egli è impossibile che si appartino dal più al meno o dal meno al più quanto è una

In ciascun grado di diminuzione è sempre diviso in 435 parti, o più tosto in 870, in contando, come io fo, i gradi di avvicinamento per Semi-eptameridi. Bisognerebbe dunque, per valutare e distinguere queste diminuzioni e loro proporzioni dalle più basse Semi-eptameridi fino alle più alte, che ugualmente son giuste in pratica l'une e l'altre, 1. Dividere tutta la corda in 870 per tener la prima Semi eptameride, 2. Dividere questa prima in 870, dandone 869 alla seconda, $868 \frac{1}{2}$ alla terza, $867 \frac{1}{3}$ alla quarta, e così fino all'1204 operazione, accorrendo in ciascuna operazione di tre cifre i denominatori delle frazioni; donde si produrrebbe summa che vince ogni immaginazione umana. Questo calcolo si deve al Signor Sauveur.

è una picciola parte del diametro d'un fil di seta, qual'è sette volte minore di quel d'un capello;essendo impossibile che un giusto orecchio e raffinato non se ne avvegga; percioche l'intervallo d'una linea non è al più capace che di 25 diametri d'un capello mediocrementemente fino; donde siegue che ciascuna delle divisioni supposte per l'ultima moltiplicazione è minore della 284 parte del diametro d'un capello. Il diametro del fil di seta semplice non è maggiore della settima parte di quello d'un capello. Devo questa precisione alla destrezza del Sig. *Homborg* che a mie preghiere ne ha fatta la sperienza: Co' proprj occhi dunque ho riconosciuto un fatto, donde si deduce che la 54^a parte del diametro d'un fil di seta sarebbe uguale a ciascuna delle suddivisioni della *Glotta* del terzo grado, se dette suddivisioni fossero tra loro uguali. Così se mai si faccia alcun errore insensibile all' orecchio, questo addiverrebbe per una parte molto minore d'una 54^a del diametro d'un fil di seta, poicche gli ultimi gradi di suddivisione son sensibili all' orecchio, ciascun de' quali è uguale per lo meno alla 54^a parte di un sì picciolo diametro, e la maggior parte incomparabilmente minore. Questo per la giustezza.

Per la prontezza con cui le due labbra della *Glotta* posson produrre moti sì delicati e precisi, basta considerate che una voce giusta guidata da un raffinato orecchio prende qualunque tuono nel suon disteso senza vagillare, e, preso questo tuono, non lascia di toccar tutti tuoni e gl' intervalli, passando dall'uno all' altro, spesso con una velocità di biscoma quanto il fiato può soffrire ne' lunghi passaggi, e da un capo all'altro d'una modulazione durante più battute nelle diminuzioni.

9. Queste tre circostanze son maravigliose sì, ma facilissime a comprenderfi; e manifestamente ne risulta quel che direbbeſi miracolo se non fuſſe ordinario, e che ſi deve per conſeſſenza riguardar filoſoficamente come un miracolo. Mi ſi concederà dunque di chiamarlo così. Queſto miracolo conoſciuto da tutto il Mondo da che gl'Uomini ſi ſono avvſati di farvi riſleſſione è perpetuo, generale, e così certo come tutto ciò che ſi è detto, ma infinitamente più ammirabile, perciocchè egli è aſſolutamente impoſſibile a concepirſi in natura. Ritrovaſi tal miracolo pertanto in tutti i movimenti volontarj, ma in queſto riſalta più che in tutti gli altri; Quindi è che io vi addatto queſta riſleſſione divenuta già volgare dopo il Signor *Descartes*.

Eccola: L'effetto di tutti queſti movimenti sì delicati, sì giuſti, e pronti, è ordinato da una intelligenza creata che non ſà tali movimenti, che di per ſe non ha potere alcuno ſù gl' Iſtrumenti che l'eſeguono, che non conoſca detti Iſtrumenti, o che almeno ad eſſi non avverte, che non concepiſce aſſatto i moti quali devon produrre tal effetto, e che impertanto non ha altro che 'l volere l'effetto per farli ubbidire dalle cagioni mecaniche che li producono in una maniera a lei ignota, cioè per parti ſconoſciute che non fanno nè l'intelligenza che lor comanda, nè quello che loro ordina.

Queſto miracolo, come ho detto, incontraſi in tutti i moti volontarj, egli però è certo che in niuno di eſſi ſi oſſervi in una maniera sì maraviglioſa, come in que' che ſi appartengono alla Muſica così ſtrumentale che vocale. Sarà egli facile di vieppiù convincerſi di ciò in conſiderando riguardo a' Strumenti qualche da un ſol Uomo ſi faccia, e qualche

si operi dalla mente nella testa di esso, sonando ad arpeggio un Liuto, o a capriccio l'Organo, o accompagnando ad aria coll' Arciliuto o col Cembalo &c. ma sopra ogn'altro in difaminando, secondo questa Memoria, ciocche avvenga nell'Istrumento della voce.

Tutte queste riflessioni, e molte altre che io taccio, possono facilmente presentarsi alla mente di ogni Uomo attento, & a proporzione della elevezza di coloro che vorran fissarvisi possono divenire esse utilissime; Perciocche l'effetto lor naturale deve essere d'innalzar la mente alle più alte cose che la Teologia naturale comprende, quale è la più importante e più nobile fra tutte le umane conoscenze. (bb)

Que-

(bb) La Teologia naturale &c.) *Un Autore intanto di molto merito, e ben rinomato in un Opera impressa, degna per altro della pubblica attenzione, ha stimato poter dire qualche siegue: Non vi è oggi più idea alcuna del vero Filosofo, dopo che questo augusto titolo si strazia e dà a gente curiosa & oziosa che si addanno a conoscere alcuni segreti della natura, e tutta lor vita passano in fare sperienze sù l'aere, e sù le virtù della calamita. Non so persuadermi, che l'Autore abbia avuto pensiero di far cadere in dispregio la Fisica presso del pubblico, e qu'ancora che la coltivano, come dopo Bacone & Descartes non si è tralasciata. Ma'l Pubblico durerà fatica a non credere che 'l natural senso di queste parole disegni non solamente i Fisici, ma i migliori Fisici ancora, cioè qu' che studiano sù la natura in una maniera utile alle arti che da questa dipendono, con i necessari avvedimenti per accertarsi del vero, e che per non far perdita del*
tenta-

tempo, si applicano nella Fisica alle sole inchieste, cui può giungere la mente umana., e si restringono tra limiti della ragione e de' sensi. Confesso, che questa maniera di coltivar la Fisica mi sembra sì ragionevole e sì filosofica ancora, che non poss' comprendere come l'Autore abbia potuto riguardar tali Fisici come indegni del nome di Filosofi, e come gente curiosa & oziosa che sua vita passa tra cose inutili: Dà frattanto egli per esempio di cose inutili il far l'esperienza sù l'aere, e sù le virtù della calamita: E pur sarebbe difficile ritrovar due esempi più propri a dimostrare che la Fisica sia utilissima non solamente alla Teologia naturale, alla quale ella tutta intiera ave un necessario e natural rapporto, ma alla società civile, e talvolta ancora alla Religione. La minore di queste due ricerche, qual'è della natura dell'aere, cioè del suo movimento, del suo peso, e della sua molla, è utilissima alla Mecanica, alla Navigazione, alla Medicina, alla Chirurgia; e le novelle scoperte che vi si son fatte servono a sciogliere un infinito numero di Problemi che rischiarano tutte queste arti. Per la Calamita, la sola Bussola fa sicuro il commercio de' due Emisferi, e serve per la comunicazione del Vangelo da uno all'altro; E pur la Bussola è una conseguenza di due sole tra le innumerabili proprietà della Calamita.

Socrate, che non sarà in vil preggiu presso l'Autore, non ha disprezzato simili ricerche: Aristotano voleva renderlo sovragevole al Popolo Ateniese sù l'idea esagerata d'un Vecchio che si applicava seriamente a sanfaluche (v. Aristotano atto 1. scena 2. e 3. delle Nubi). Intanto queste sanfaluche erano il Cielo e i più piccioli Insetti, corpi i più grandi e più minuti della natura, e perciò i più ammirabili. Socrate allo 'ncontro non con altro difendevasi, che in
di-

dicendo credere egli queste ricerche superiori a lui (v. l' Apologia di Socrate in Platone) ; Nè ciò mi sorprende : Era la Fisica ancora in que' su' tempi sì giovane presso i Greci , che può dirsi che non guari più di 150 Anni ella ancora bamboleva .

Platone cotanto dall' Autore stimato, e con molta ragione, si meriterà presso lui l' augusto titolo di Filosofo, perciocchè egli è Autore del Timeo, il quale altro non è che una Fisica Teologica celeste e sublunare , e pur l' Autore non lo crede perciò men Filosofo . Platone introduce in tutti i suo' Dialoghi gli Eroi della Filosofia: Così nel Timeo, Socrate dà il motivo a parlare & esorta Timeo a spiegar l'origine, l' Autore, la fabrica del Mondo, delle Creature intelligenti, dell' Uomo, degli Animalì, e delle Piantè, & egli con tutta attenzione lo sente discorrere di tutto ciò. Egli è vero , che 'l Timeo sia una picciola parte delle Opere di Platone , che l'istesso Timeo non siasi ristretto alle ricerche di alcuni segreti della Natura, e che Platone non abbia menata sua vita in fare sperienze : Ma tanto peggiore per la sua Fisica . 1. E' sarebbe a desiderare , che Timeo si fusse un pò più ristretto di qualche non ha fatto : che non avesse intrapreso a spiegare la natura delle Anime per mezzo delle figure , & avesse atteso a ricercar nella natura qualche gli Uomini possono ritrovarvi , e che avesse fatte maggiori sperienze notomiche , e sopra di ogni altra cosa , che Platone, più savio e più dotto di Pitagora, si fusse applicato a rinvenir regole per distinguere nella Fisica il possibile dall' impossibile , le cose che dian speranza di poterli ritrovare , da quelle di cui con certezza niun Uomo potrà mai venire a capo : Perciocchè su di queste ultime cade tutto 'l disprezzo , che Socrate fa di tutti i Filosofi suoi antecessori applicati unicamente alla Fisica , cercando l' impossibile come il possibile.

fibile, l'uno e l'altro senza regola e senza condotta, & affermando con ugual temerità qualche men sapevano, e qualche credevano di sapere il più sicuramente. (v. Senofonte nell' Apologia di Socrate.)

2. *Del rimanente chi è che passa sua vita in speculazioni e sperienze Fisiche? I Medici stessi che sono obbligati ad applicarvi per l'utile che si reca alla lor arte, impiegano tempo incomparabilmente maggiore alla pratica della Medicina, & alle altre bisogne della vita. I Professori di Filosofia appena danno la quarta parte del lor tempo per insegnar la Fisica. Crederebbe l'Autore, che Uomini, quali fanno professione di Medicina e di Filosofia, fossero perciò men Filosofi in facendo il lor dovere nel ricercare qualche devon conoscere, e nel coltivare quello che essi devono insegnare? Se particolar Uomo che viva a suo bellagio o viaggi o con Amici si dia bel tempo, s'occupi a riflessioni sù la potenza infinita e sù l'impercettibil arte del Creator della natura, sarà egli un Curioso dispreggevole, perche non distorna i suo' ocelli dalle maraviglie che se li porgono inanzi di per loro & in tutti momenti; e sarà egli Ozioso, perche si occupa nel suo ozio? Allo 'ncontro qual tempo si richiede per fare scoperte considerabili nella Storia, e nelle cagioni naturali? E' questo spessissime volte sì corto che nè si può designare nè misurare. Un guardo, una semplicissima riflessione facilissima e naturalissima, bastano per iscoprire una verità sconosciuta, per dedurne conseguenze, per immaginare sperienze decisive, e tutto ciò in camminando, nel mezzo delle faticende, & in tutti stati della vita. La fatica e 'l tempo s'impiega nell' eseguire e scrivere, e siccome niuna legge ne forza, così niuna ne vieta: Et essendo così, io non credo che persona potesse biasimare chiunque sua vita menasse in ricerche innocenti che possono divenire
uti-*

utilissime alla società civile: Anzi credo ancora che sarebbe desiderabile che vi fusse un numero di Fisici un poco maggiore di qualche non è, occupati a questo solo senza pregiudizio de' doveri alla Religione & alla Società. I Medici, & i Filosofi di Professione ne trarrebbero profitto, e questi Fisici lontani da' tumulti degli affari, da' sordidi interessi, e dall' ambizione, contenti di un onesto bisognevole, impiegando una parte di quel che loro avanza alla ricerca della verità Fisica, sarebbero più che Filosofi.

*Io però ho sovente avvisato che una parte di coloro che anno il gusto per l'eloquenza e per gli affari, sentan dispiacere per le scienze esatte e per le arti: forse perche queste cose richieggono molta attenzione che nella loro immaginazione non s'incontra, e che non riguardino alle passioni che per ordinario muovono gli Uomini. Le scienze intanto nè si contrastano nè si disprezzano l'un l'altre, anzi che si ajutano e scambievolmente si rendono onore. Si può dunque essere Fisico e saper la Morale, senza perciò essere men Fisico; come in fatti ho io conosciuto due Uomini tutti e due gran Matematici e gran Fisici, & intanto gran Filosofi nel sentimento che l'Autore l'intende, cioè saccettissimi nella Morale, registratissimi ne' loro costumi, e fedelissimi in tutti doveri della vita civile e della Religione: L'ho inoltre tutti e due veduti giunti al più sublime grado della Dialettica e dell'Eloquenza, senza essersi a queste per alcun tempo applicati, e senza quasi avvedersene. Essendo così, son persuaso che l'Autore non sarebbe inferiore di quel ch'egli è, Filosofo, Eloquent, utile al Pubblico, in una parola, pregevolissimo per infiniti versi; se avesse applicato per alcuni momenti una parte de' talenti della sua mente ad alcune ricerche fisiche: perciocchè, *L'avrebbero queste per lo meno dimostrato come non**

con

Questo è quel che doveva io dire sù la voce a sù' differenti tuoni che ella può produrre nel canto . Non pretendo aver interamente votata questa materia , (*cc*) ma credo di non aver detta cosa non vera . Le maraviglie da me esposte son grandi, se le cagioni che ho recate son vere; che se non lo fossero, dovrebbero esservi cagioni più nascoste , e forse lontane dalla comprensione della mente umana; & allora l'opera del Creatore sarebbe molto più ammirabile.

OS-

convenga passar sua vita per giugnere al conoscimento della verità in molte cose importanti, e per metterlo in istato di comunicarle . Ma senza entrare in queste ricerche , non bisogna altro che poca riflessione per conoscere che l'augusto titolo di Filosofo non si re in la profano col darlo a Fisici , quando avrà egli considerato che l'applicazione, che sù la Fisica fanno, scemi il loro pregio, che la Scrittura Santa istessi in un de' suoi libri , quale comprende tutta la Sapienza morale politica e civile, esorta tutti a considerare ciascuno a suo modo le Opere dal Creatore fatte, maggiormente perche le considerassero , & in considerandole apparassero almeno a conoscerlo , ad ammirarlo, & a temerlo (Eccles.III.14.) Questo è quello che senza dubbio l'Autore ha letto non solamente ne' luoghi che san qui citati, ma in infiniti altri ch' egli facilmente aggiugnerà ; v. Salmo XVIII. 2. 6. 7. XXV. 4. 5. 6. LXV. 3. LXXXVI. 12. XCI. 5. 6. CII. CX. 2. 3. 6. CXXXVIII. 14. 15. 16. CXLII. 5. CXLIII. 4. CXLVII. 15. 16. 17. 18. CXLVIII. Dan. III. 57. &c. Rom. 1. 18. 19. 20. 21.

(*cc*) Non pretendo &c.) Dopo tutto quel che si è detto , rimarrebbe ancora a renderfi ragione, 1,

Del.

Della forza della voce umana, che sembra essere fuor d'ogni proporzione paragonata con la dimensione del suo canale e della sua linguetta 2. De' tuoni che pajono di non non essere a sufficienza spiegati per l'apertura della Glotta, e per la vibrazione delle sue labbra.

Quanto alla prima difficoltà, per la forza della voce non si richiede in rigore la profondità del canale. Il Sufolo umano ha spesso agutissimo suono senza alcuna profondità, poicche e' suona immediatamente nell' aere vago, percosso dall' aere qual esce dalle labbra increspate e socchiuse a forma di Glotta.

Ripuardo alla seconda difficoltà, non avendo il canal della voce dimension proporzionata a' tuoni, e fra gli altri a' bassi, per non avere dimension molta da rendere il tuono e dominar la linguetta dell' Uomo, e' sembra che converrebbe, per formare il tuono, che la linguetta dominasse il canale, cioè ch' essa sola desse il suono, come avviene nella voce umana dell' Organo, ove la linguetta è molto lunga per supplire agl' intervalli delle vibrazioni d'un doccio di misura per rapporto al tuono che la sua lunghezza li dà. Perciocche le vibrazioni della linguetta di un doccio di Organetto son come quelle de' Pendoli, quando che quelle de' docci sono come le vibrazioni delle corde stirate, cioè molto più veloci e più spesse in ugual lunghezza, che quelle de' Pendoli; Sicche gl' intervalli delle vibrazioni d'una corta linguetta di Organetto possono essere uguali agl' intervalli delle vibrazioni d'una lunga corda stirata, che son quelle d'un doccio di misura; ma le vibrazioni della Glotta son simili a quelle delle corde stirate. Or poicche queste due corde son cortissime, se fossero esse formate per sonare, non dovrebbero di per loro produrre altro che tuoni agutissimi & esilissimi. Son esse.

esse dunque lontanissime dal supplire ad un canal di misura . Ecco la difficoltà, che non distrugge nè l' fatto nè le cagioni proposte , ma richiede miglior rischiaramento .

Si dirà forse , che la consistenza di queste corde supplisca per le vibrazioni a quella lunghezza che lor manca : Perciocche negl' Istrumenti a corde di metallo , le corde d' oro e di ferro passate per l' istessa trafila , e similantemente stirate , & ugualmente lunghe , suonano una quinta più l' una che l' altra , quella di ferro nella quinta alta , e quella d' oro fino nella quinta di basso (v. Armonia universale del P. Merfende lib. III. dell' Istrumenti da corde prop. 15. pag. 151. dell' ediz. in fol. 1627 .) I Musici dicono , che ciò giunga fino all'ottava; locche è vero, parlando armonicamente , non già in rigor meccanico . Che che ne sia , egli è probabile che maggior differenza di consistenza s' incontri indiffinitamente tra le corde d' oro e quelle delle labbra della Glotta , che tra le corde di ferro e quelle d' oro , quantunque sian queste d' un metallo molto più dolce e più legato del ferro . Potrà dirsi ancora che la consistenza sì composta del canale esteriore potrebbe in alcun modo supplire alla profondità ; perciocche se le vibrazioni de' docci d' Organo son come quelle delle Corde stirate , potrebbe essere che un doccia d' Organo composto da una lamina d' oro , avrebbe un' altro tuono di quello della dimensione ordinaria ; e se la differenza del tuono corrispondesse a quella che si ravvisa nelle Corde , non sarebbe egli impossibile che in due terzi di lunghezza rendesse egli per lo meno il tuono della quinta superiore ad un doccia della lunghezza ordinaria e del solito metallo . Ma questo non noi soddisfa , 1. a cagion delle strabocchevoli differenze che bisogna supporre , 2. perciocche le labbra della Glotta non son

Cag.

Corde fatte per sonare, ma per brandire, e per percuotere l'aere, locche basta per lo suono, e per variare i tuoni con i differenti urti, 2. perche la differenza de' tuoni nelle Corde di Metallo non nasce solamente dalla lor consistenza, ma da molte altre circostanze che non si possono adattare a' labbri della Glotta.

Ritorno dunque a dire, come nella Memoria, che la complicazione dell'apertura di essa Glotta e della molla delle labbra tirate, può rendere i tuoni indipendentemente dalla profondità del canale e dalla lunghezza delle Corde; perciocche il solo urto dell'aere basta per lo suono, e l'aere mosso velocemente nell'aere intiero può bastantemente rompere per produrre il suono, e molto differentemente per formare i tuoni. Il sapere come tutto ciò faccia una sensazione, non è tanto quistione quanto una spezie di mistero fisico, che si dimostrerà impossibile a concepirsi in natura. Qui però mi basta il fatto; perlocche mi ho io fatta lavorare una linguetta d'Organo a guisa di un doccio d'Organetto di sei dita, alla quale ho io solamente fatt'aggiungere l'anima necessaria per l'imboccatura senza alcun doccio: E pur questa linguetta ha'l suono del doccio di 8 piedi, siccome nell'Assemblea pubblica si sperimentò. Questo per lo canale, per cui non occorre altro. Quanto alla lunghezza delle corde, si sa, che'l Signor Mario fabrica Cembali pieghevoli, che spiegati sono nella maggior loro lunghezza di due piedi e mezzo, i di cui bassi di ottone coperti e ricoperti, o da fil di rame, o di argento dorato, per vieppiù render basso il suono, sono unisoni con i bassi de' più lunghi Cembali di sette piedi; donde nasce, che per tale artificio, i suoni come 2; Pretende egli ancora che possa ciò andar infinitamente più lungi di qualche non ha egli avuta necessità di far correre. Così la lunghezza delle corde sino ad un
cer-

certo punto potrebbe essere supplita. In questa difficoltà dunque non si tratterrebbe di altro che del più e del meno: senza però ricorrere a questi supplementi basta qui ripetere, che nell'Istrumento della voce dell'Uomo i tuoni sono indipendenti dalla misura del canale, e da quella delle labbra considerate come una specie di corde. In fatti bisogna che si vada la faccenda; perciocchè l'effetto dell'istrumento della voce dell'Uomo non può esser posto in dubbio. Così poco dopo osservai che una Impannata rombante rese il suono maggiore d'un doccio di 8 piedi, malgrado la inegual proporzione delle sue labbra e della sua profondità, che evidentemente era pochissima o quasi nulla. Ma si è egli detto nella Memoria che questa Impannata rassomigli più propriamente all'Organo della voce; bisogna dunque che nell'Istrumento della voce dell'Uomo le vibrazioni delle labbra della Glotta rendano il suono, come la linguetta lo dà al corpo dell'Oboè; e che la velocità e quantità dell'aere mosso attraverso dalla Glotta diano i tuoni, e producano i tremori di essa, come le dimensioni dell'Oboè producono i tremori della sua linguetta, e formano i tuoni dell'Istrumento. Son io così persuaso, che in tutti gli Strumenti di Musica i tuoni tutti nascano dalle quantità e da' gradi di velocità dell'aere rotto.



O S S E R V A Z I O N E

D E L L E

MACCHIE DEL SOLE

Comparsa nel Mese di Novembre 1700.

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

¶ **O**sservando il Sole a mezzo giorno a 9 di questo Mese avvertj sù la di lui Orbita una gran macchia composta da molte picciole unite insieme, come per ordinario sono, e come nelle Figure può vederfi. Eran corsi alcuni giorni che il Sole non facea vederfi nè osservare; non saprei perciò dire se detta macchia fusse cominciata a comparire prima di tal giorno. Dal Mese di Maggio 1695. non ne avea veduta alcuna, e quella che allora comparve teneva l' istessa figura di questa; io però non saprei dir con certezza che fusse la stessa. Frattanto se, come altre volte ho detto, si supponga che nella materia fluida del Sole siavi corpo irregolare, donde tali macchie a noi ci si presentano in differenti lati girando di detta materia con un movimento uguale, si avviseranno trà l' osservazione del mese di Maggio 1695. e questa qual, 72 rivoluzioni della macchia, di 27 giorni 7 ore 7¹/₂ per ciascheduna, tempo a un da presso definito per la rivoluzione di dette macchie intorno al Sole, o del Sole istesso intorno al suo asse. Vi farebbero
mol.

È 13. Nov. 1700.

molte riflessioni a fare sù di dette macchie , rimetto però tutto allo spiegamento altrove dato sù di molte simiglianti osservazioni . Avverto solamente i Curiosi di tali osservazioni , che tal macchia potrà rivedersi sù l'orlo Orientale del Sole a 28 di questo istesso Mese.

O S S E R V A Z I O N E

D E L L A C O N G I U N Z I O N E

Inferiore di Venere col Sole , fatta nell' Osservatorio Reale.

DEL SIG. DE LA HIRE.

* **T**utte le Osservazioni de' Pianeti , che gli Antichi Astronomi an potuto fare per avere la loro vera polizione , le an fatte per mezzo delle Armille, e per le loro distanze tra le Stelle fisse . *Tycho Brachè* essendosi negli ultimi tempi industriato di perfezionare l'antica Stronomia , con ragion si lagna di non poter dare esecuzione a' disegni ch' egli avea per conoscere le vere distanze de' Pianeti dal Sole, che per i giri quali non possono giugner mai ad una somma giustezza . Si duole degli Orologj molto manchevoli, quantunque e' ne avesse fatto lavorar gran numero sù' principi che per allora e' teneva ; l'unico appoggio dunque era il quadrante del circolo grande invero e molto ben diviso , donde traeva tutto 'l vantaggio che sperar
Z 2 mai

* 17. Nov. 1700.

se ne potesse con l'ordinarj merli che avea procurato di correggere. Ma dopo la scoperta de' Cannocchiali e l'adattamento di essi fatto a' quadranti del circolo, & agli altri Istrumenti nel primo Anno dello stabilimento dell' Accademia Reale delle Scienze, cogli Orologj a pendolo scoperti e regolati nell' istesso tempo, si ritrovò l'affare nello stato di fondare una nuova Astronomia tanto per la giustezza de' suoi Orologj, per mezzo de' quali si può misurare certamente il tempo minor d'un secondo, quanto per l'ajuto de' Cannocchiali attissimi ad osservare a pieno giorno gli Astri.

Son circa 20. Anni, che avendo considerato i vantaggi che l'Astronomia potea quindi ritrarre per ridurli ad una maggior perfezione di qualche prima non era, con somma accuratezza mi diedi a metter in esecuzione il disegno che avea formato di correggere le Tavole Astronomiche, affinche accordassero col Cielo quanto più giustamente potea farli: Et avendo da S.M. ottenuti i soccorsi necessarj per tal affare, allogai nell'Osservatorio gran quadrante di circolo murale, guarnito de' suo' merli ad occhiali, esattamente nel piano della Meridionale. Allora scopri per detti merli le Stelle fisse nel Meridiano col Sole, e fra le altre la Stella del Cane maggiore, che io osservai ancora per merli armati di occhiali di un quadrante di circolo portatile che avea il raggio di tre piedi. Questa scoperta che niuno avea prima di me fatta, mi diè campo di comparare per mezzo dell' Orologio a pendolo immediatamente il Sole con questa Stella & averne in conseguenza esattamente l'ascenzion retta; e con le altezze del Sole osservate a mezzo giorno parimente con l'istesso quadrante di circolo ne determinai la declinazione.

Non

Non sò parola degli altri Elementi necessarij per tali ditterminazioni, li quali erano per altre osservazioni fatte con l'istessi Strumenti ben note, come le altezze del Polo, quella dell' Equatore, l'Obliquità dell'Eclittica, e le refrazioni. Dopo di aver continuate così dette osservazioni per più Anni continui, formai le Tavole del moto del Sole senza aver riguardo a sistema alcuno. Sono esse quell' istesse Tavole appunto del Sole, ch' io diedi alla luce nel 1686., le quali da tutte le altre Osservazioni dopo fatte si sono ritrovate ferme e giuste.

M'applicava nello stesso tempo ad osservare con l'istesso Metodo tutt' i Pianeti che ho veduti durante il giorno, essendo il Sole molto alto sù l' Orizzonte. Per Venere però l' ho sempre osservata nella sua congiunzione, quando ella era nell' inferiore col Sole, discostata al più più due gradi o nell' Oriente o nell' Occidente o nel Settentrione o nel Mezzo giorno. Queste osservazioni non ancora da me fatte mi an data con altrettanta giustezza la posizione di Venere, come se io l'avessi veduta nel Sole.

L'Osservazione che quì reco è di tal natura; e per aver più esattamente il tempo della sua vera congiunzione e 'l suo luogo, io l'osservai per alcuni giorni prima che fusse ella unita al Sole, & alcuni giorni appresso.

In tal maniera ditterminai la differenza ascensionale di detta Stella al Sole, e similmente la differenza della dechinazione; sicche essendo conosciute l'ascenzion retta e la dechinazione del Sole ne' tempi di dette osservazioni, sarebbero conte ancora quelle di Venere. Era questo Pianeta allora retrogrado, come suol esser sempre nella sua congiunzione inferiore, e con un Cannocchiale di 16 pie-

di vedevali tre volte più grande della Luna mirata a nudi occhi; perciocchè il suo diametro era allora di un minuto; e 'l Cannocchiale lo rendeva di 90. Appariva ella in crescendo così delicata, come a un da presso snol apparir la Luna, quando ella è di due giorni, e le Corna erano Orizzontali nel giorno della congiunzione in ascension retta. Avvisai parimente con l'istesso eccellentissimo Cannocchiale; che la parte inferiore crescente aveva ineguaglianze molto più considerabili di quelle della Luna; come più altre volte osservai; donde può farsi giudizio che questo Pianeta abbia delle macchie come tutti gli altri.

E' molto vantaggioso l'osservar detta Stella a mezzo giorno; perciocchè siccome il lume del Sole scema la maggior parte del suo scintillare, ch'è molto grande, vedesi ella benissimo terminata e molto netta, e senza que' colori, che per ordinario si scorgono, quando nella sera o nel mattino si osserva senza frammetterlo tra l'occhio e 'l Cannocchiale un Cristallo legiermente colorito.

Ecco le osservazioni da me fatte, delle quali io ne feco alcune delle più vicine alla congiunzione, e delle più esatte; come più necessarie per la determinazione della congiunzione.

A 24. Agosto 1700: il centro di Venere fu nel Meridiano dopo mezzo dì a ore 0. 41'. 45'', e la sua vera altezza meridiana era di 39°. 36'. 52".

A 27., il centro di Venere passò nel Meridiano dopo mezzo giorno ad ore 0. 24'. 47'', e la sua vera altezza meridiana era di 39°. 48'. 53".

Nel primo di Settembre 1700., il centro di Venere passò nel meridiano prima di mezzo giorno all' 11. ore 55'. 21". La sua vera altezza meridiana era di 40°. 33'. 20".

A. 3.

A 3. Settembre, il centro di Venere passò nel meridiano prima di mezzo giorno ad 11. ore 42'. 32". La sua vera altezza meridiana era di 40°. 57'. 11".

A 4. detto, il centro di Venere passò nel meridiano ad 11. ore 27'. 41". del mattino; e la sua vera altezza meridiana era di 41°. 11'. 1".

Se si mettano in dilamina queste osservazioni, che son molto giuste; e si prendano le parti proporzionali, si ritroverà che 'l centro di Venere dovè passare nel meridiano a 31. di Agosto dopo mezzo dì ad ore 0. 1'. 16'. , e poicché il moto diurno di Venere nell'ascension retta era in detto giorno di 5'. 55". , come può conoscersi dalle osservazioni da me recate, si ritroverà che 'l centro di Venere sia stato unito al centro del Sole in ascension retta; o, ch'è lo stesso, il centro di Venere siasi ritrovato nel medesimo circolo meridiano col Sole a 31. di Agosto ad ore 5. 8'. 18". della sera.

Per mezzo delle differenti altezze meridiane di Venere si ha; in prendendo le parti proporzionali, che nel tempo della sua vera congiunzione in ascension retta dovrebbe ella esser elevata su l'Orizzonte del luogo; che avesse l'istessa latitudine dell'Osservatorio, dove ella passava allora nel meridiano 40. 24'. 46". Ma essendo l'altezza dell'Equatore di questo luogo l'istessa con quella dell'Osservatorio, quale io ho determinato di 41°. 10. 0"., ne segue che in questo stesso tempo la declinazione di Venere sarebbe Australe di 45'. 14".: Locche si ave ancora per mezzo delle altezze del Sole.

Su di questi principj; e su di ciò che noi abbiamo determinato su l'obliquità dell'Eclittica, si rinverranno col calcolo ordinario, il tempo, e 'l luogo della vera congiunzione di Venere, e la sua latitudine.

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

• IO non potei vedere il Sole se non due giorni dopo li 28. del Mese di Novembre, nel qual giorno avea io calcolato dover ricomparire le macchie del Sole, che si eran vedute verso la metà di questo istesso mese: Cercai con diligenza se non vi fosse alcuna reliquia delle macchie, o alcune picciole fiaccole, che per ordinario si osservano dopo che le macchie sono svanite; io però non potei ravvisar cosa alcuna nè in quello, nè nel giorno appresso.

S O P R A

L' A C I D O

DELL' ANTIMONIO.

DEL SIGNOR HOMBERG:

• IL Signor Charas ha dato un modo per estrarre un liquor acido dall' Antimonio, ch'è questo. Riduce egli in polvere l'Antimonio minerale, mescolandolo con triplicata quantità di sabbia comune, e lo distilla in gran fuoco per una Storta un gran recipiente mezzo pieno d'acqua di Fiume,

qua-

• 11. Decemb. 1700.

• 19. Decemb. 1700.

quale rettifica dipoi con una seconda distillazione: Da questa operazione sovente si ave un liquor acido, e spesso nò. Pretende detto Signore che l'esito di tal operazione dipenda dall' adoperamento del fuoco per gradi convenevoli a tale operazione, la quale nommai l'ha fallato con tal graduata diligenza.

E' questa operazione descritta nel *Trattato dell' Antimonio di Gio: Agricola* impresso in *Leipsick* nel 1639. Ho posto in opera questo Metodo, nè sempre l' ho ritrovato vero in tutte le sue parti: Alle volte egli è vero che dia un acido, questo però non si produce dall' Antimonio, ma sì bene da una terra bianchiccia & argillosa, che nommai quasi li scompagna dall' Antimonio minerale, la quale rende uno spirito acido nella forte distillazione, come per ordinario fa l' argilla: Quando però si scelga l' Antimonio minerale puro e senza mescolanza di detta terra bianchiccia, o che si prenda dell' Antimonio comune il più puro, cioè senza scorie, non si terrà acido alcuno per qualunque grado di fuoco se li dia. Non può dunque ritrarsi tal acido come un aceto di Antimonio.

Quanto a me, son persuaso che l'acido dell' Antimonio non differisca punto dallo spirito di solfo comune. E poicche l' Antimonio abbonda di solfo ardente simile al solfo comune, io credo che detto acido sia lo spirito del solfo ardente, o del solfo comune che stà nell' Antimonio, e che la parte del regolo dell' Antimonio, qual'è il vero Antimonio, non vi contribuisca in cosa alcuna.

Non dico ciò senza ragione, poicche io ho fatto l' acido dell' Antimonio senza giunta alcuna, & in differenti maniere ancora con infinito travaglio: L' ho impiegato in differenti operazioni, e l' ho ri-

trovato sempre perfettamente simile allo spirito di solfo comune; non avendo fatto di vantaggio da quel che perfettamente lo spirito di solfo suol fare.

Ecco un de' Metodi, di cui mi son servito per estrarre tal acido. Ho pesto l' Antimonio in minuta polvere, e posto in un tegame piano di terra non vernicata del diametro di un piede, ho coperto questo con un pignatto pur di terra senza fondo, adattativi tre altri pignatti sù di questo, avendo coperto l' apertura dell' ultimo con una gran Campana di vetro; i di cui estremi erano sostenuti tre o quattro linee sù d' un vaso d'acqua, ch' era bastantemente calda per far fummare & inumidire la Campana nel di dentro: L' acqua, che scolava da questa, cadeva nel vaso d'acqua.

Aveva io fatta una buca della larghezza di un dito ver la metà del pignatto; per cui io aveva fatto passare il manico d' un cucchiajo di ferro per rivolgere l' Antimonio sotto detta Campana; come appunto e' si fa in calcinando per ridurlo in vetro: In tal guisa ebbi fiori d' Antimonio nel pignatto; un poco d' acido nell' acqua sotto la Campana di vetro, e' l' mio Antimonio calcinato nel tegame sotto il pignatto.

In questa maniera si ricava poco acido; quantunque siasi certo di esser senza mescolanza: Avviene molto spesso ancora che non se ne ritragga affatto; ma ciò dipende primieramente dall' elasticità dell' Artista; per secondo, e principalmente, dalla temperatura dell' aere e del tempo, in cui l' operazione si faccia; quanto più il tempo è freddo & umido; più acido si tiene di quel che in un tempo caldo e secco, quando non se ne ave affatto. Generalmente bisogna osservar quì tutte quelle cose;

Gian.

stanze che si osservano quando si fa lo spirito di solfo per *Campanara*, e far conto che tal operazione è molto più difficile di quella dello spirito di solfo comune senza giunta :

O S S E R V A Z I O N E

S U D I U N A

NUOVA SPECIE D'ERNIA.

DEL SIGNOR DE LITTE :

* **A** Prj a 30. Giugno 1699. il Cadavere d' un Uomo molto carnosso repentinamente morto nell' età di 48 Anni con Ernia nell' Inquinaja sinistra sopravvenutali dopo uno sforzo cinque Anni prima di sua morte, qual' era insensibilmente discesa fino al fondo dello Scrotò . Disaminando le intestina tenai di questo Cadavere un dopo l' altro ; e giunto verso il fine dell' ileo , conobbi che questi in una delle sue parti era imbricato nel sacco dell' Ernia : Durai fatica a ritrarlo ; quantunque e non fusse ritenuto da alcuno attaccamento .

La circonferenza intiera del corpo dell' intestino non formava quest' Ernia ; come per ordinario avviene ; ma la parte solamente opposta a quella, qual' è attaccata immediatamente al Mesenterio . Questa porzion dell' intestino s' era introdotta tosto negli Anelli dell' Inquinaja con l' occasione del rilasciamento ; che lo sforzo già detto avea cagionato al Peritoneo in questa parte : Lodi insensibilmente

fa

* 18. Agosto 1700.

fu ella spinta sola lungo l'appendice del Peritoneo dalla contrazione scambievolmente de' muscoli del ventre e del Diafragma, dal pendio del luogo, dal moto vermicolare delle intestina, e dal peso della materia contenuta nella cavità di esse; perciocchè i pareti degli anelli di quest' Uomo molto carnosio, col fortemente resistere nella lor divisione, avevano impedita l'entrata al rimanente della circonferenza del corpo dell' intestino. Questa resistenza con le altre cagioni cennate non ha impedita la continuazione del doccio intestinale verso l' ano per la parte attaccata immediatamente al Mesenterio, quale stando libera e senza compressione nella capacità del ventre, avea conservata ancora la forma del canale.

Ha dato luogo ella parimente al dilungamento della parte dell' intestino immessa negli anelli, la quale essendo esteriormente premuta da' pareti di essi e spinta giù dalle cagioni già recate, in dilungandosi avea formata una specie d'appendice a quest' intestino.

Et in fine all' accrescimento del Diametro della parte del corpo dell' intestino, ch'è sopra dell' appendice, la quale era più grossa di quella di sotto: E ciò per i spessi ostacoli che la materia (qual ricorreva dall' appendice nel corpo dell' intestino) faceva a quella che discendeva dalla parte dello stomaco per iscorrere verso l' ano.

L' appendice dell' Ileo (che formava l'Ernia) era un canale membranoso di figura conica, la di cui base era nella sua estremità inferiore: La sua lunghezza giugneva a quattro dita, e la larghezza ad un dito e quattro linee nella parte del corpo dell' intestino; e nell' opposta, di due dita. La sua estremità superiore nel luogo degli anelli era piana per

li lati, convessa per d'avanti e per di dietro, & aperta nella cavità dell'Ileo. L'estremità inferiore era grossa, ritonda, e chiusa; vi si avvisavano due rilievi, uno a destra e l'altro a sinistra, ciascuno di circa quattro linee di diametro.

I pareti di quest' Appendice erano sottilissimi, nè vi si osservavano fibre carnose, nè glandole, ma solamente alcuni vasi cotanto delicati che appena erano sensibili: E pure vi si ravvisava un gran numero degli uni e degli altri nel corpo dell'intestino: Struttura intieramente differente da quella dell'Appendice naturale del Cieco; poicche la base del cono, ch'ella forma, è nella sua estremità superiore, e la doppiazza de' suoi pareti, la grossezza, e'l numero delle sue fibre carnose de' suoi vasi e delle sue glandole sono cotanto a proporzione considerabili, quanto quel del corpo dell'intestino Cieco, donde ella sorge.

L'estrema differenza che s'incontra tra l'appendice naturale del Cieco e quella fuor di natura dell'Ileo, mi sembra pruova che l'ultima appendice non sia contemporanea con la prima formazione dell'intestino, ma fatta molto tempo appresso e nella guisa che io ho divisato.

E' allo incontro difficile a concepirsi che un grosso e lungo capo d'intestino molto più libero è ruotante nella vasta capacità del ventre, e men sostenuto dal corpo delle intestina, possa inbrigarfi in una spezie di fessura, chiusa interiormente dal Peritoneo, esteriormente dalla pelle e dalle altre membrane, munita pe' fianchi da buon numero di fibre carnose e tendinose de' muscoli obliqui e trasversali del ventre; perciocche tutte queste parti si drizzano senza rifinare a rispignere non solamente i corpi che si sforzano di entrare negli anelli di detti muscoli, ma a cacciarneli ancora, quando che

al-

alcuna fiata abbian cominciato ad introdurvifi :
 Lecche dovrebbe molto meno avvenire a corpi di
 cui si parla , quanto che questi muscoli sono molto
 più grossi , e forti, di que' che sogliono gli Uomini
 avere .

Questa conghiettura in fine sembrerebbe esser
 confermata da un'altra osservazione fatta da me su
 di un Uomo morto da febre maligna nell' età di
 34. Anni. Aveva questi nell'Inquinaja destra un Er-
 nia senza strangolamento fin da tre Anni , la quale
 similmente erasi fatta da un'appendice dell'intesti-
 no Ileo, che sola si trovava introdotta negli anelli,
 mentre che il rimanente della circonferenza del
 corpo dell' intestino era libero nella cavità del ven-
 tre, conservando la forma del canale . Detta appen-
 dice era liscia, & unita, di figura conica e la sua base
 era nella parte del corpo dell' intestino , piana un
 poco per davanti e per dietro nel di sotto degli anel-
 li, (facilmente per lo brachiere d'acciajo che quest'
 Uomo fin da due Anni portava notte e giorno) : Era
 ella l'appendice lunga tre dita & 8 linee, larga un
 dito e 2 linee nel suo cominciamento , e 'l suo fine
 giungeva a 10 linee .

La simiglianza differente dell' appendice dell'
 Ileo di questi due Uomini , senza dubbio addiveni-
 va dalla facilità che la materia contenuta in dette
 appendici avea avuta maggiore nel dilatare i pareti
 e le membrane dell' Inquinaja e dello Scroto , per
 linea retta in uno, e per fianchi nell'altro : Et i rial-
 ti che io ho avvisati nella prima appendice eran
 prodotti dal lungo soggiorno della materia che con-
 teneva, quale aveva fatti differenti bozzoli nello
 Scroto , come tante forme .

Prima di queste due osservazioni , era io stato
 chiamato con un Cerusico per osservare un Uomo
 che

che aveva un tumore nell' Inguinaja sinistra , per cui se ne morì fra lo spazio di cinque giorni . Per molta attenzione dal Chirurgo e da me fatta a tutti i sintomi di tal malattia, l'uno e l'altro eravamo imbarazzatissimi nel determinare se tal tumore fusse una vera Ernia , se fusse del solo intestino, e se vi si accompagnasse strangolo ; perciocchè detto Infermo in tutto'l corso di sua malattia avea renduto libero il ventre , & a mal pena avea sentito picciolo incentivo a recere .

Tra queste incertezze richiesimo soccorso ; ma per disgrazia non avendo egli lume miglior di noi in tal malattia, non istimò bene che si facesse l'operazione, in tempo almeno che avrebbe potuto esserle profittevole; perciocchè prevenendo la cancrena, che sopraggiunse nel quarto giorno della malattia , sicuramente l'avriamo salvato .

Dopo la morte di questo richiesi i Parenti d'aprire il Cadavere , per accertarmi della natura di detto male . Ma o per cagione della novità del fatto , o per lo disordine , l'annerimento , e'l puzzo delle parti sede del male , mi si rese impossibile di ritrarre da tale apertura tutto quel lume che io m'avea proposto . Confesso ancora che tutto quel che avvisai in questo Cadavere non mi diè per allora, se non nozioni molto oscure e confuse di tal male . Sarei ancora nell'istesso imbarazzo , se non me ne avessero liberato due altre osservazioni che indi feci : Perciocchè riunendo l' idee che avea potuto fare sù di tal male in detto tempo, e mettendole in confronto con le presenti , mi an fatto toccar co' mani che l' Ileo di detto Uomo, e quel di questi due altri, avea un appendice , la quale avendo fatta in quest' ultimo un' Ernia con lo strozzamento era stata la vera cagione della sua morte .

Age.

Agevolmente può comprendersi che possa far-
silo strangolo in tali appendici introdotte negli
anelli de' muscoli del ventre .

1. Qualora la materia contenuta nella cavità di
dette appendici è troppo densa, grossolana, vischio-
sa, molta, &c. perciocchè bisogna ch' ella risalga con-
tro'l suo proprio peso, e per quell' istesso verso per
cui è calata ; tanto più , se l' estremità superiore di
queste appendici sia molto più stretta dell' infé-
riore .

Non essendo allo'ncontro le fibre carnose di esse
più capaci di alcuna contrazione per l'estrema loro
estensione, non possono agevolare la salita nella ca-
vità del corpo dell' Ileo alla materia caduta nelle
appendici. Essendo queste inoltre situate nell'Inqui-
naja e nello Scroto, manca loro l'ajuto che i musco-
li del ventre e del Diafragma recano alle parti com-
prese in questa gran capacità per fare scorrere le
materie che ciascuna contiene verso 'l luogo che l'
è proprio . Quindi è che in queste sorti d'indisposi-
zioni è l' Uomo obbligato di dolcemente premere
con la mano da giù in sù successivamente l' appen-
dice dell'Ileo, qualora è piena, per voltar la materia
nella cavità del corpo dell' intestino .

2. Sopravviene lo strozzamento a dette appen-
dici , quando gli umori arrestati nelle loro mem-
brane son molto fermentati, troppo rarefatti, molto
acri, molto grossolani, &c.; cagionandovi una flussio-
ne, tensione, dolore , infiammazione, apostema, &c.

3. Qualora l' istesso avviene agli anelli dell' In-
quinaja .

4. Quando nelle vicinanze di dette appendici
vi è alcun tumore, o corpo straniero, che venendo a
comprimerle, impedisca, che'l sangue e la linfa non
ritornino, e che la materia caduta nella loro cavità
non

non si scarichi in quella del corpo dell' intestino Iléo.

5. Qualora colpo, o caduta, brachiere troppo duro, o stretto &c. fanno a dette appendici una compressione, schiacciatura, piaga, &c. considerabili.

Per rendere di alcun utile questa nuova osservazione alla pratica medica, aggiungerò alla descrizione pur ora fatta i segni per conoscere questa specie particolare di Ernia cui si unisce lo strangolo, e 'l mezzo da tenersi per guarirla, affinché per lo avvenire si difendano dalla morte coloro che avran la mala ventura di cadere in una simile malattia.

I segni Diagnostici di quest' Ernia particolare accompagnata con lo strangolo possono essere divisi in que' che la fan conoscere prima delle operazioni, & in altri che la dimostrano nell' operazione.

I primi sono.

1. Che l' Infermo si scarica delle sue feccie in tutto 'l corso della Malattia; perciocche, non essendo intercetto il canale intestinale, gli escrementi an la libertà di scorrere da un capo all' altro.

2. Che l' Ammalato, o non ha affatto, o rarissimamente, il Singhiozzo.

3. Che non rece, o infinitamente meno di quello che avviene nell' Ernie ordinarie, e nommai materie fecciose.

4. Che 'l ventre dell' Infermo nè s' ingrossa, nè si distende, nè è pien di flati, come nell' Ernie ordinarie.

5. Che 'l tumor dell' Inquinaja lentamente si forma, nè ingrossa mai cotanto.

6. Che l' infiammazione, il dolore, la febre, e gli altri accidenti, quali si accompagnano con que-

Memor. 1790,

Δ 3

la

sta spezie particolare di Ernia, più tardi si manifestano e con minor violenza.

I segni secondi che nell' operazione la dimostrano, sono.

1. Che nell' Ernie ordinarie la circonferenza intiera del corpo dell' intestino è imbricata nel sacco dell' Ernia; ma in questa, una sola porzione di esso.

2. Che la porzion d' intestino, qual fa l' Ernia ordinaria, si vede addoppiata nel sacco a forma d' arco; quando che nella spezie particolare, di cui si tratta, questa porzione è semplice, posta a perpendicolo, e terminata per un fine distintissimo.

3. Che l' Ernia ordinaria sovente è formata dall' intestino e dall' Epiploon tutt' insieme, e la particolare è sempre fatta dal solo intestino.

Intorno al Prognostico dell' Ernia particolare, ella è sempre funesta, qualora se l' unisce lo srozamento; e più, se dopo di avere inutilmente tentati i rimedj generali e particolari, non si ricorra all' operazione prima che siasi molto avanzata la cancrena.

Questa operazione è per ordinario più facile e men pericolosa in quest' Ernia che nella comune.

La maniera particolare di far l' operazione in questa spezie di Ernia deve esser varia, secondo i varj stati, in cui si ritrova l' appendice dell' intestino nel tempo dell' operazione.

Può detta appendice essere leggermente alterata, o cancrenata. La cancrena può solamente attaccare la parte inferiore dell' appendice, o l' inferiore e la mezzana tutt' insieme, o tutt' intiera l' appendice, con alcuna porzione ancora del corpo dell' intestino. Donde necessariamente siegue che in tal malattia devono praticarsi quattro sorti d' opera-

zioni l'one dall'altre differentissime.

Se l'alterazione dell'appendice è leggiera, bisogna scoprirla, tagliando dolcemente le membrane, che l'avvolgono, con picciolo rasojo; scemar la materia contenuta nella cavità dell'appendice, quando ella fusse molta, con immerterne porzione nel canal dell'intestino; distaccare gli appiccamenti, se ve ne siano; incidere gli anelli dell'Inguinaja, se la loro apertura impedisca il rimettimento di detta appendice; rispignerla dolcemente nella cavità del ventre, & ivi rattenerla con l'ajuto di una tassa, della fasciatura, & di un sito convenevole.

Rammarginata una volta bene la piaga del ventre, non vi è luogo a temere che detta appendice ricada e produca Ernia simile alla prima: Locche non può dirsi con sicurezza, se l'Ernia sia prodotta da una porzione d'intestino.

Allora che l'appendice è cangrenata solamente nella sua estremità inferiore, e che vi rimanga nel di sopra un duto traverso di sano, bisogna fare una ligatura su di questo di là dalla parte cangrenata; tagliar l'appendice un pò sotto della ligatura, e rimettere il rimanente nella cavità del ventre, lasciando il filo che la stringe spenzolone esteriormente dalla piaga, fintantoche la parte ligata si separi dal rimanente dell'appendice, quale per mezzo di detto filo si tirerà fuori del ventre.

Fatta questa separazione, deve il Cerusico attendere a curar la piaga, osservando nel corso della malattia che 'l Malato sia sempre coricato con le natiche un pò alte, che prevenga l'Infermo a schivar tutto ciò che può scuotere, comprimere, e distendere con violenza le parti contenute nel ventre, come farebbero la tosse, lo starnuto, il singhiozzo, il vomito, &c. che prenda pochissimi alimenti, ma mol-

to nutrichevoli, sù 'l dubbio che per molta ampiezza, o troppo pelo non facciano dividere la porzion ligata dell' appendice, prima che i pareti della parte siano bastantemente incollati & uniti tra loro, lo che cagionerebbe inevitabil morte all' Infermo per lo sboccamento delle feccie nella cavità del ventre, quali necessariamente scapperebbero per l' apertura di questo capo dell' appendice; poicche sua cavità è contiua con quella del Canale intestinale.

L' Infermo allo'ncontro non ha che temere per questo verso del capo dell' appendice ligato; perciocche non essendo il canale del corpo proprio degl' intestini imbricato in alcuna delle sue parti, rimane ancora agli escrementi & alla materia nutrimetosa libero il passaggio dal Piloro sino all' Ano; allo'ncontro nell' Ernie ordinarie seguirebbe sicurara la morte, se il capo del corpo dell' intestino si ligasse, come quello ch' è continuo con lo stomaco.

Quando la cancrena dell' appendice si distende sin quasi al corpo dell' intestino, deve il Cerusico tagliar tutto ciò che è mortificato; dando prima a tenere le parti dell' intestino, che devon fare due capi dopo il mozzamento, sù 'l timore che non rientrano nella cavità del ventre: Indi il Cerusico con diligenza disaminerà l' uno e l' altro capo, per distinguere quello che si appartiene al Duodeno dall' altro ch' è continuo col Retto.

Si ravvisa il capo dell' intestino continuo col Duodeno.

1. Dal moto vermiculare che vi si osserva dopo il trencamento.
2. Da qualche materia che di volta in volta vien fuori da detto capo d' intestino.
3. Dal non infierire intieramente i suoi pareti, o

Se mai cadono, poco appresso son rialzati dallo sforzo che la materia fa per uscire da detto capo.

Si conosce quello ch'è continuo col Retto.

1. Perche non vi si osserva alcun moto peristaltico.

2. Perche da questo non iscappa materia alcuna, precise quando si è una volta spremuta quella che nel tempo dell'operazione vi era, se pure, per un moto contrario al peristaltico, una porzione della materia calata giù non risalga per uscire da questo capo d'intestino. In questo caso mi opporranno che l'ultimo segno da me recato per far conoscere il capo dell'intestino continuo col retto sia affatto inutile: Questa obiezione però svanisce, se si faccia riflessione che 'l moto peristaltico delle intestina è un movimento moderato, uguale, e regolare; e che 'l contrario è violento, ineguale, & irregolare; che la materia, qual esce dall'intestino per lo moto peristaltico, si rende dolcemente, e con maniera uniforme, quandocche la materia, che vien fuori col moto contrario, esce con empito, e quasi a scosse a scosse che non serbano tra di loro proporzione.

Divisati bene questi due capi d'intestino l'uno dall'altro, bisogna ligare il capo che continua col retto, indi rispignerlo nella cavità del ventre, rimanendo il filo fuori della ferita, sin attanto, che la parte ligata sia separata dal rimanente.

Si liga il capo dell'intestino che continua col retto.

1. Perche non deve più ricever cosa alcuna dagli altri intestini che continuano con lo stomaco; essendone affatto separato.

2. Perche poi non possa dalla cavità di questo intestino versarsi nella capacità del ventre cosa alcuna, come potrebbe avvenire, qualora detta por-

zion d' intestino si ritrovasse in una situazione molto inclinata, o che ella venisse a soffrire alcuna forte compessione, o li sopravvenissero moti convulsivi.

Per quel che riguarda al capo dell' intestino continuo con lo stomaco, con un ago si passeran tre fili separatamente tre linee sotto il suo orlo, i quali divideranno la sua circonferenza in tre parti uguali: Si farà un nodo de' due capi di ciascun filo separatamente, & indi di tutti si farà un appiccagnolo, che terrà sospesa l'estremità di detto intestino all' orlo interno della piaga del ventre fin attanto che a quella si attachi & incolli; locche avviene per mezzo delle parti vischiose della linfa e del sugo nutritivevole, che gemono dalle membrane dell' intestino tagliato e dalle labbra della piaga aperta nelle parti contingenti del ventre.

Studiandosi il Cerusico a far rammarginare detta piaga, deve tener cura di conservare un' apertura proporzionata all' imboccatura del capo dell' intestino aderente alla sua circonferenza, perche la materia fecciosa, la quale non ave allora altra via per uscir dal corpo che questa, non ritrovi mai nell' uscita ostacolo alcuno in detto luogo.

Ho io conosciuto tre Uomini, & una Donna, che si scaricavano delle loro feccie per queste parti; perciocche la natura, o l' Cerusico, con l' occasione di un' Ernia ordinaria unita a strozzamento, avean fatto attaccare nell' orlo della piaga il capo dell' intestino che continua con lo stomaco.

Questa ultima operazione invero ha de' fastidiosi incomodi; ma la vita, quantunque infelice e misera ch' ella sia, sempre è a preferirsi alla orribile e spaventevol morte. *Miserum remedium tolerabile redditur austerius malum. Celsus*

DESCRIZIONE DELL' URETRA DELL' UOMO

*Dimostrata all' Accademia a 3. di Luglio
1700.*

DAL SIGNOR DE LITTRÉ.

L'Uretra dell'Uomo è un canale ritondo, incavato ver la parte del ventre dopo il collo della Vescica, donde ella comincia, sino alla parte inferiore dell'osso della pube, e da quest'osso sino all'estremità della Glande, in cui termina. E' detto canale lungo da 12. sino a 13. dita; Egli è posto sotto i due corpi cavernosi dalla parte della loro unione sino al fin della Verga; è coperto dalla stessa pelle che cuopre i corpi cavernosi, e forma tre tumori, l'uno è nel suo principio, e diceli la *Glandola Prostata*; il secondo è un dito più in quà del primo, e chiamasi *Bulbo dell'Uretra*; & al terzo, in cui finisce detto canale, si dà il nome di *Glande*.

L'Uretra è composta di membrane, di glandole, d'una sostanza spugnosa, di muscoli, e di vasi.

L'Uretra ha due membrane delicate e molto strette nella lor tessitura. L'esteriore cuopre il di fuori dell'Uretra e'l di dentro del Prepuzio, e l'interiore veste la parte interna di detto canale. Queste due membrane lasciano tra di esse uno spazio, che vien riempito da glandole e da una sostanza spugnosa.

Aa 4

La

La prima glandola compresa tra le membrane dell'Uretra dalla parte della Vescica, è la *Prostata*. Questa non è doppia, come diceasi, poichè ella è continua in tutte le sue parti: E' situata nella radice dell'Uretra; la sua figura è conica, e rassomiglia ad un picciolo Cuore; ella è lunga un dito e tre linee, & involge questo canale in tutta la sua lunghezza, & ha sette linee di grossezza; la sua base, che riguarda la Vescica, è larga un dito e quattro linee; e la punta, ch'è rivolta alla *Glande*, è larga nove linee; ella è cinta da fibre muscolose, e composta da circa 12 sacchi, le di cui cavià non comunicano tra di loro, ma imboccano nel canale dell'Uretra intorno al *Verumontanum* con altrettanti docci grossi quanto una fetola di porco. In ciascuno di questi Sacchi vi è quantità di piccioli granelli glandolosi, i di cui docci escretori (ciascun de' quali ha uno sfintere nella sua estremità) sgorgano nella cavità di questi sacchi quel liquore che essi filtrano, come in tante conserve. Questo liquore può tenere alcun uso per la generazione, mischiandosi col seme nel bacin dell'Uretra nel tempo del coito; può ancora egli servire ad impaniciar la superficie interiore del canal della stessa, per renderlo più lubrico e più facile al seme & all'urina, e difenderlo dall'acrimonia di questi due liquori.

La seconda glandola tra le membrane dell'Uretra sita immediatamente dopo la Prostata ver la Glande non ha nome, perciocchè non è stata ella ancora descritta. E' questa di un color rosso oscuro, e forma intorno all'Uretra una spezie di fascia unita, larga un dito, e della grossezza di due linee; fora la membrana interiore dell'Uretra in tutta la sua circonferenza con molto nume-

ro di docci escretorj, quali versano in detto canale il liquore che seltra per la glandola, il quale è un pò mucilaginoso, e perciò proprio a spalmarne il canale.

Lo spazio che rimane tra le due membrane dell'Uretra dopo l'ultima glandola, di cui si è parlato, sino al fin del canale, viene occupato da una sostanza spugnosa composta di moltissime fibre muscolose, le quali s'intralciano in differenti maniere, lasciando tra loro quantità di picciole cellette, nelle quali buona parte dell'arterie capillari terminano in un simigliante numero di vene. Questa sostanza spugnosa su' l'cominciare ergeasi in fuori, principalmente per la parte inferiore, formando un tumore o bulbo lungo circa un dito, di figura conica, la di cui base, qual'è verso la vescica, è grossa 8 linee, e la punta ver la Glande, quattro; dopo questo tumore sino alla Glande ella è grossa quanto una linea e mezza ne' due lati e sotto, e mezza linea lungo la parte superiore.

In fine la sostanza spugnosa contenuta tra le due membrane dell'Uretra ha nella Glande 5 linee di grossezza ver la sua base che dicesi *Corona*, e due linee nella punta opposta.

La sostanza spugnosa dell'Uretra, e quella de' corpi cavernosi, riempendosi di sangue e di spiriti animali, fa che la verga s'indurisca e distenda, come si conviene per la generazione.

La membrana che cuopre il di fuori della Glande è sottile estremamente, apparentemente perche si separa su' l' principio della Glande in due parti, l'esterior della quale veste l'interior del Prepuzio. Il freno, che liga fortemente la Glande al Prepuzio per la parte sua inferiore, altra cosa non è, che la membrana esteriore di essa Glande.

de, doppia in questo luogo. La parte dell' Uretra, che fa una porzione della Glande, è riabbracciata dalla parte posteriore sù l'estremità anteriore delli due corpi cavernosi, cuoprendoli esattamente per tutti lati.

Si osservano intorno alla Corona corpi grossi quanto una setola fina di porco, lunghi mezza linea, di figura quasi cilindrica, disposti paralleli sù di detta Corona, secondo la direzione della Glande, e distanti gli uni dagli altri per un terzo di linea. Si travede nell'estremità posteriore di ciascun di detti corpi una picciola buca, donde spesso ho io fatto gemere una materia bianca e densa, che in uscendo foggiasse in figura di fili, come appunto osservasi qualora si spremano le glandole delle palpebre. Prova ciò evidentemente che i piccioli corpi della Corona della Glande sono glandole, come lo sono quelle delle palpebre, e non già tette della pelle gonfiate, come credon alcuni; poicché da queste non vien fuori materia alcuna: Allo 'ncontro sono essi quattro volte più grossi della membrana che cuopre la parte esteriore della Glande, e son sempre molto sensibilij in tutte le glandi degli Uomini intorno alla Corona, nè in altra parte, e sempre a un da presso dell' istesso numero; donde può conchiudersi che questi piccioli corpi nell' Uomo son la vera sorgiva della materia bianca & untuosa, che si osserva tra la Corona della Glande e la radice del Prepuzio, tanto più che col Microscopio stesso non si vede nel Prepuzio cosa alcuna che abbia la minor apparenza di glandola. Allo 'ncontro facendosi tutte le feltrazioni note per mezzo delle Glandole, assolutamente bisogna che sian es-

se o nel Prepuzio o nella Glande per feltrare la materia bianca & untuosa, di cui si è parlato, la quale inollando la Glande e l'Prepuzio, impedisce che queste due parti non si disseccino & incollino l'una con l'altra.

La Superficie interiore del Canal dell'Uretra è liscia & uniforme da per tutto, fuorché ne' confini della sua radice dove ritrovasi un picciolo rialto e due scanalature.

Il picciolo rialto stà verticalmente in mezzo della parte inferiore della radice di detto canale, 6 linee distante dal collo della vescica; simiglia ella ad una picciola cresta di Gallo, e comunemente dicesi *Verumontanum*. In ciascheduno de' due lati di questo rialto si ravvisa una buca di figura un poco ovale, e circa una linea larga. Questi forami son le bocche de' due docci escretori comuni delle vescichette femminali; li quali, dopo di aver traversata la parte superiore della glandola Prostata, metton capo nella cavità dell'Uretra per versarvi il seme nel tempo del coito.

Le due scanalature dell'Uretra sono ancora nella parte inferiore di detto canale, in guisa che il principio di ciascheduna corrisponde ad una delle buche del *Verumontanum*: Son esse divise l'una dall'altra per una semplice linea formata dall'allungamento del *Verumontanum*; la loro profondità è superficiale, & anno 8 linee di lunghezza, & una di larghezza, distendendosi dalla parte della Glande, scemando a poco a poco la loro larghezza e profondità.

Il canal dell'Uretra forma nel suo principio una specie di Bacino, lungo circa un dito, e largo 5 linee, e profondo da due sino a quasi tre linee.

Tra

sta spezie particolare di Ernia, più tardi si manifestano e con minor violenza.

I segni secondi che nell' operazione la dimostrano, sono.

1. Che nell' Ernie ordinarie la circonferenza intiera del corpo dell' intestino è imbricata nel sacco dell' Ernia; ma in questa, una sola porzione di esso.

2. Che la porzion d' intestino, qual fa l' Ernia ordinaria, si vede addoppiata nel sacco a forma d' arco; quando che nella spezie particolare, di cui si tratta, questa porzione è semplice, posta a perpendicolo, e terminata per un fine distintissimo.

3. Che l' Ernia ordinaria sovente è formata dall' intestino e dall' Epiploon tutt' insieme, e la particolare è sempre fatta dal solo intestino.

Intorno al Prognostico dell' Ernia particolare, ella è sempre funesta, qualora se l' unisce lo strozzamento; e più, se dopo di avere inutilmente tentati i rimedj generali e particolari, non si ricorra all' operazione prima che siasi molto avanzata la cancrena.

Questa operazione è per ordinario più facile e men pericolosa in quest' Ernia che nella comune.

La maniera particolare di far l' operazione in questa spezie di Ernia deve esser varia, secondo i varj stati, in cui si ritrova l' appendice dell' intestino nel tempo dell' operazione.

Può detta appendice essere leggermente alterata, o cancrenata. La cancrena può solamente attaccare la parte inferiore dell' appendice, o l' inferiore e la mezzana tutt' insieme, o tutt' intiera l' appendice, con alcuna porzione ancora del corpo dell' intestino. Donde necessariamente siegue che in tal malattia devono praticarsi quattro sorti d' opera-

zioni l' une dall' altre differentissime :

Se l' alterazione dell' appendice è leggiera , bisogna scoprirla , tagliando dolcemente le membrane , che l' avvolgono , con picciolo rasojo ; scemar la materia contenuta nella cavità dell' appendice , quando ella fusse molta , con immerterne porzione nel canal dell' intestino ; distaccare gli appiccamenti , se ve ne siano ; incidere gli anelli dell' Inguinaja , se la loro apertura impedisca il rimettimento di detta appendice ; rispignerla dolcemente nella cavità del ventre , & ivi rattenerla con l' ajuto di una tassa , della fasciatura , & di un sito convenevole .

Rammarginata una volta bene la piaga del ventre , non vi è luogo a temere che detta appendice riscada e produca Ernia simile alla prima : Locche non può dirsi con sicurezza , se l' Ernia sia prodotta da una porzione d' intestino .

Allora che l' appendice è cangrenata solamente nella sua estremità inferiore , e che vi rimanga nel di sopra un doto traverso di sano , bisogna fare una ligatura sù di questo di là dalla parte cangrenata ; tagliar l' appendice un pò sotto della ligatura , e rimettere il rimanente nella cavità del ventre , lasciando il filo che la stringe spenzolone esteriormente dalla piaga , fintantoche la parte ligata si separi dal rimanente dell' appendice , quale per mezzo di detto filo si tirerà fuori del ventre .

Fatta questa separazione , deve il Cerusico attendere a curar la piaga , osservando nel corso della malattia che 'l Malato sia sempre coricato con le natiche un pò alte , che prevenga l' Infermo a schivar tutto ciò che può scuotere , comprimere , e distendere con violenza le parti contenute nel ventre , come farebbero la tosse , lo starnuto , il singhiozzo , il vomito , &c. che prenda pochissimi alimenti , ma mol-

to nutricevoli, sù 'l dubbio che per molta ampiezza, o troppo peso non facciano dividere la porzion ligata dell' appendice, prima che i pareti della parte siano bastantemente incollati & uniti tra loro, locchè cagionerebbe inevitabil morte all' Infermo per lo sboccamento delle feccie nella cavità del ventre, quali necessariamente scapperebbero per l' apertura di questo capo dell' appendice; poichè sua cavità è continua con quella del Canale intestinale.

L' Infermo allo'ncontro non ha che temere per questo verso del capo dell' appendice ligato; perciocchè non essendo il canale del corpo proprio degl' intestini imbrigato in alcuna delle sue parti, rimane ancora agli escrementi & alla materia nutrimentosa libero il passaggio dal Piloro fino all' Ano; allo'ncontro nell' Ernie ordinarie seguirebbe sicura la morte, se il capo del corpo dell' intestino si ligasse, come quello ch' è continuo con lo stomaco.

Quando la cancrena dell' appendice si distende sin quasi al corpo dell' intestino, deve il Cerusico tagliar tutto ciò che è mortificato; dando prima a tenere le parti dell' intestino, che devon fare due capi dopo il mozzamento, sù 'l timore che non rientrano nella cavità del ventre: Indi il Cerusico con diligenza disaminerà l' uno e l' altro capo, per distinguere quello che si appartiene al Duodeno dall' altro ch' è continuo col Retto.

Si ravvisa il capo dell' intestino continuo col Duodeno.

1. Dal moto vermiculare che vi si osserva dopo il troncamento.

2. Da qualche materia che di volta in volta vien fuori da detto capo d' intestino.

3. Dal non cadere intieramente i suoi pareti, o

Se mai cadono, poco appresso son rialzati dallo sforzo che la materia fa per uscire da detto capo.

Si conosce quello ch'è continuo col Retto.

1. Perche non vi si osserva alcun moto peristaltico.

2. Perche da questo non iscappa materia alcuna, precise quando si è una volta spremuta quella che nel tempo dell'operazione vi era, se pure, per un moto contrario al peristaltico, una porzione della materia calata giù non risalga per uscire da questo capo d'intestino. In questo caso mi opporranno che l'ultimo segno da me recato per far conoscere il capo dell'intestino continuo col retto sia affatto inutile: Questa obiezione però svanisce, se si faccia riflessione che 'l moto peristaltico delle intestina è un movimento moderato, uguale, e regolare; e che 'l contrario è violento, ineguale, & irregolare; che la materia, qual esce dall'intestino per lo moto peristaltico, si rende dolcemente, e con maniera uniforme, quandocche la materia, che vien fuori col moto contrario, esce con empito, e quali a scosse a scosse che non serbano tra di loro proporzione.

Divisati bene questi due capi d'intestino l'uno dall'altro, bisogna ligare il capo che continua col retto, indi rispignerlo nella cavità del ventre, rimanendo il filo fuori della ferita, sin attanto, che la parte ligata sia separata dal rimanente.

Si liga il capo dell'intestino che continua col retto.

1. Perche non deve più ricever cosa alcuna dagli altri intestini che continuano con lo stomaco; essendone affatto separato.

2. Perche poi non possa dalla cavità di questo intestino versarsi nella capacità del ventre cosa alcuna, come potrebbe avvenire, qualora detta por-

zion d' intestino si ritroyasse in una lituazione molto inclinata, o che ella venisse a soffrire alcuna forte compressione, o li sopravvenissero moti convulsivi.

Per quel che riguarda al capo dell' intestino continuo con lo stomaco, con un ago si passeran tre fili separatamente tre linee sotto il tuo orlo, i quali divideranno la sua circonferenza in tre parti uguali: Si farà un nodo de' due capi di ciascun filo separatamente, & indi di tutti si farà un appiccagnolo, che terrà sospesa l'estremità di detto intestino all' orlo interno della piaga del ventre fin attanto che a quella si attachi & incolli; locche avviene per mezzo delle parti vischiose della linfa e del sugo nutritivevole, che gemono dalle membrane dell'intestino tagliato e dalle labbra della piaga aperta nelle parti continenti del ventre.

Studiandosi il Cerusico a far rammarginare detta piaga, deve tener cura di conservare un' apertura proporzionata all' imboccatura del capo dell'intestino aderente alla sua circonferenza, perche la materia fecciosa, la quale non ave allora altra via per uscir dal corpo che questa, non ritrovi mai nell'uscita ostacolo alcuno in detto luogo.

Ho io conosciuto tre Uomini, & una Donna, che si scaricavano delle loro feccie per queste parti; perciocche la natura, o 'l Cerusico, con l'occasione di un'Ernia ordinaria unita a stozzamento, avean fatto attaccare nell' orlo della piaga il capo dell'intestino che continua con lo stomaco.

Questa ultima operazione invero ha de' fastidiosi incomodi; ma la vita, quantunque infelice e misera ch'ella sia, sempre è a preferirsi alla orribile e spaventevol morte. *Miserum remedium tolerabile reddit; austerius malum. Celfo*

DE-

DESCRIZIONE DELL' URETRA DELL' UOMO

*Dimostrata all' Accademia a 3. di Luglio
1700.*

DAL SIGNOR DE LITTRÉ.

L'Uretra dell'Uomo è un canale ritondo, in-
tervato ver la parte del ventre dopo il collo della
Vescica, donde ella comincia, sino alla parte infe-
riore dell'osso della pube, e da quest'osso sino all'
estremità della Glande, in cui termina. E' detto
canale, lungo da 12. sino a 13. dita; Egli è posto
sotto i due corpi cavernoli dalla parte della loro
unione sino al fin della Verga; è coperto dalla stes-
sa pelle che cuopre i corpi cavernosi, e forma tre
tumori, l'uno è nel suo principio, e diceli la *Glan-
dola Prostata*; il secondo è un dito più in quà del
primo, e chiamasi *Bulbo dell'Uretra*; & al terzo,
in cui finisce detto canale, si dà il nome di *Glande*.

L'Uretra è composta di membrane, di glan-
dole, d'una sostanza spugnosa, di muscoli, e di
vasi.

L'Uretra ha due membrane delicate e molto
strette nella lor tessitura. L'esteriore cuopre il di
fuori dell'Uretra e'l di dentro del Prepuzio, e l'in-
teriore veste la parte interna di detto canale.
Queste due membrane lasciano tra di esse uno spa-
zio, che vien riempito da glandole e da una sostan-
za spugnosa.

Aa 4

La

La prima glandola compresa tra le membrane dell'Uretra dalla parte della Vescica, è la *Prostata*. Questa non è doppia, come diceh, poichè ella è continua in tutte le sue parti: E' situata nella radice dell'Uretra; la sua figura è conica, e rassomiglia ad un picciolo Cuore; ella è lunga un dito et tre linee, & involge questo canale in tutta la sua lunghezza, & ha sette linee di grossezza; la sua base, che riguarda la Vescica, è larga un dito e quattro linee; e la punta, ch'è rivolta alla *Glande*, è larga nove linee; ella è cinta da fibre muscolose, e composta da circa 12 sacchi, le di cui cavià non comunicano tra di loro, ma imbeccano nel canale dell'Uretra intorno al *Vermontanum* con altrettanti docci grossi quanto una setola di porco. In ciascuno di questi Sacchi vi è quantità di piccioli granelli glandolosi, i di cui docci escretori (ciascun de' quali ha uno sfintere nella sua estremità) sgorgano nella cavità di questi sacchi quel liquore che essi seltrano, come in tante conserve. Questo liquore può tenere alcun uso per la generazione, mischiandosi col seme nel bacin dell'Uretra nel tempo del coito; può ancora egli servire ad impaniciar la superficie interiore del canal della stessa, per renderlo più lubrico e più facile al seme & all'urina, e difenderlo dall'acrimonia di questi due liquori.

La seconda glandola tra le membrane dell'Uretra sita immediatamente dopo la Prostata ver la Glande non ha nome, perciocchè non è stata ella ancora descritta. E' questa di un color rosso oscuro, e forma intorno all'Uretra una spezie di fascia unita, larga un dito, e della grossezza di due linee; fora la membrana interiore dell'Uretra in tutta la sua circonferenza con molto nume-

ro di docci escretorj , quali versano in detto canale il liquore che seltra per la glandola , il quale è un pò mucilaginoso , e perciò proprio a spalmarne il canale .

Lo spazio che rimane tra le due membrane dell'Uretra dopo l'ultima glandola , di cui si è parlato , sino al fin del canale , viene occupato da una sostanza spugnosa composta di moltissime fibre muscolose , le quali s'intralciano in differenti maniere , lasciando tra loro quantità di picciole cellette , nelle quali buona parte dell'arterie capillari terminano in un similgiante numero di vene . Questa sostanza spugnosa sù 'l cominciare ergesi in fuori , principalmente per la parte inferiore , formando un tumore o bulbo lungo circa un dito , di figura conica , la di cui base , qual' è verso la vescica , è grossa 8 linee , e la punta ver la Glande , quattro ; dopo questo tumore sino alla Glande ella è grossa quanto una linea e mezza ne' due lati e sotto , e mezza linea lungo la parte superiore .

In fine la sostanza spugnosa conrenuta tra le due membrane dell'Uretra ha nella Glande 5 linee di grossezza ver la sua base che dicesi *Corona* , e due linee nella punta opposta .

La sostanza spugnosa dell' Uretra , e quella de' corpi cavernosi , riempendosi di sangue e di spiriti animali , fa che la verga s'indurisca e distenda , come si conviene per la generazione .

La membrana che cuopre il di fuori della Glande è sottile estremamente , apparentemente perchè si separa sù 'l principio della Glande in due parti , l'esterior della quale veste l'interior del Prepuzio . Il freno , che liga fortemente la Glande al Prepuzio per la parte sua inferiore , altra cosa non è , che la membrana esteriore di essa Glande .

de, doppia in questo luogo. La parte dell' Uretra, che fa una porzione della Glande, è riabbracciata dalla parte posteriore su l'estremità anteriore delli due corpi cavernosi, cuoprendoli esattamente per tutti lati.

Si osservano intorno alla Corona corpi grossi quanto una setola fina di porco, lunghi mezza linea, di figura quasi cilindrica, disposti paralleli su di detta Corona, secondo la direzione della Glande, e distanti gli uni dagli altri per un terzo di linea. Si travede nell'estremità posteriore di ciascun di detti corpi una picciola buca, donde spesso ho io fatto gemere una materia bianca e densa, che in uscendo foggjavasi in figura di fili, come appunto osservasi qualora si spremiano le glandole delle palpebre. Prova ciò evidentemente che i piccioli corpi della Corona della Glande sono glandole, come lo sono quelle delle palpebre, e non già tette della pelle gonfiate, come credon alcuni; poicche da queste non vien fuori materia alcuna: Allo 'ncontro sono essi quattro volte più grossi della membrana che cuopre la parte esteriore della Glande, e son sempre molto sensibilij in tutte le glandi degli Uomini intorno alla Corona, nè in altra parte, e sempre a un da presso dell'istesso numero; donde può conchiuderli che questi piccioli corpi nell' Uomo son la vera sorgiva della materia bianca & untuosa, che si osserva tra la Corona della Glande e la radice del Prepuzio, tanto più che col Microscopio stesso non si vede nel Prepuzio cosa alcuna che abbia la minor apparenza di glandola. Allo 'ncontro facendosi tutte le feltrazioni note per mezzo delle Glandole, assolutamente bisogna che sian es-

se o nel Prepuzio o nella Glande per filtrare la materia bianca & untuosa, di cui si è parlato, la quale inoliando la Glande e l'Prepuzio, impedisce che queste due parti non si disseccino & incollino l'una con l'altra.

La Superficie interiore del Canal dell'Uretra è liscia & uniforme da per tutto, fuorché ne' confini della sua radice dove ritrovasi un picciolo rialto e due scanalature.

Il picciolo rialto stà verticalmente in mezzo della parte inferiore della radice di detto canale, 6 linee distante dal collo della vescica; simiglia ella ad una picciola cresta di Gallo, e comunemente dicesi *Verumontanum*. In ciascheduno de' due lati di questo rialto si ravvisa una buca di figura un poco ovale; e circa una linea larga. Questi forami son le bocche de' due docci escretori comuni delle vescichette seminali; li quali, dopo di aver traversata la parte superiore della glandola Prostata, metton capo nella cavità dell'Uretra per versarvi il seme nel tempo del coito.

Le due scanalature dell'Uretra sono ancora nella parte inferiore di detto canale; in guisa che il principio di ciascheduna corrisponde ad una delle buche del *Verumontanum*: Son esse divise l'una dall'altra per una semplice linea formata dall'allungamento del *Verumontanum*; la loro profondità è superficiale, & anno 8. linee di lunghezza, & una di larghezza, distendendosi dalla parte della Glande, scemando a poco a poco la loro larghezza e profondità.

Il canal dell'Uretra forma nel suo principio una specie di Bacino, lungo circa un dito, e largo 5 linee, e profondo da due sino a quasi tre linee.

Tra

Tra la membrana esteriore dell' Uretra & i muscoli acceleratori della Verga si ritrovano due glandole, per ciascun lato una, descritte dal Signor Cowper e dimostrate da me prima alla Compagnia. Ciascuna di esse glandole ave un doccio escretorio comune lungo due dita, e mezza linea grosso, che dal loro nascere forano la membrana esteriore dell' Uretra, indi repono nel suo intessimento spugnoso, & in fine penetrano la membrana interiore di detto canale nella sua parte inferiore un deto & 8 linee in quà dal *Verumontanum*, & una linea distante l' uno dall' altro; donde siegue che 'l liquore da queste glandole feltrato non iscorra nella cavità dell' Uretra nel tempo dell' erezion della Verga, perciocche i docci di essa compresi tra 'l corpo spugnoso dell' Uretra sono oppressi dal sangue e da spiriti animali, di cui per allora egli è molto più ripieno di qualche non è prima dell' erezione: Onde è che 'l liquore feltrato per queste glandole non è destinato per la generazione, ma per inumidire, & impanicciare il canal dell' Uretra. Nel libro del Signor Cowper si ritroverà la descrizione d' una terza glandola che parimente si appartiene all' Uretra.

Questo canale vien dilatato da tre muscoli, e chiuso da due. Uno de' muscoli dilatatori dell' Uretra nasce dalla parte inferiore d' avanti del Retto e s' appicca con l' altra sua estremità alla parte inferiore e postica dell' Uretra. Li due altri muscoli dilatatori nascono dalla parte interiore de' rialti dell' osso *Ischio*, ciascun dal suo, e ciascun s' innesta per lo suo lato nella parte laterale e posterior dell' Uretra.

Ella è chiusa da' due muscoli acceleratori, una parte de' quali tien l' origine dallo sfintere dell' Ano, e l' altra

e l'altra, qual'è molto più considerabile, nasce dalla parte inferiore e posteriore dell' Uretra, e ciascun s' inferisce nella parte laterale inferiore de' corpi cavernosi corrispondenti verso la radice della Verga.


Ho io avvisato in molti Cadaveri che dalla parte anteriore di ciascun muscolo acceleratore si distaccano alcune fibre carnose, quali dopo aver ripite sù lati della verga terminano nel Prepuzio. Perciò nel coito, e qualora si orina, contraendosi dette fibre, tirano il Prepuzio ver la radice della Verga, e scuoprono il doccio dell' Uretra, mentre che il rimanente di detti muscoli, contraendosi ancora nell'istesso tempo, pigne l'Orina, o'l seme, per darlo fuori di detto canale.


Riceve l' Uretra i suo' nervi dall' ultimo pajo Sacrato; le sue arterie vengono dalle Ipogastriche, e le Vene metton capo nell' Ipogastriche. Le tuniche delle vene dell' Uretra, e quelle delle vene de' corpi cavernosi nel loro tessuto spugnoso, son forate da quantità di piccioli bucherami, come le tuniche delle vene della milza, e principalmente quelle del Bue, verisimilmente per agevolare il ritorno del sangue nel tempo dell' erezione, perciocchè allora egli è difficile a cagion dell'estrema tension della Verga.

Fine delle Memorie.

645470











Fig. 28.






Mem. 1700. Pag. 75.




Pag. 75.








Pag 196.



Pag. 88.



Pag 197.



Pag 177.



Mars 1700

Fig. 200 & 201



Fig. 201





Fig. 202



W. m. 1795

Fig. 245.








Fig. 325.










Mem. 1700. Pag. 38

di Nettuno







maximum, peltatum,
obtusum Inf. Roi
Herbar.

de Gracis f.



Mem. 1700. Pag. 43.



maximū, cinereum,
Inst. Rei Herbar.

de Grado F.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 6.





Fig. 8.



Fig. 9.





11

Mem. 1700. Pag. 239

P


19

E

de Grado P. Nep

L







Mem. 1700. Pag. 354





*Figura del' Sole, con le macchie nel
mese di Novembre 1700. -*


C. Centro del' Sole. . .
B. Orlo del Sole. . .

de Grado. f.









LEGATIMUS (1821)

Via Legatione 1821

1821

1821

